

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

–

Poruchy vědomí, šok, křečové stavy

Poruchy vědomí

Bdělý stav → spánek → spánek.

Hypersomnií rozumíme zvýšenou

..... je charakterizována krátkými několikaminutovými záchvaty imperativního spánku v jakékoliv situaci, což je velmi nebezpečné.

..... jsou rychle nastupující a krátce trvající bezvědomí způsobené přechodnou nedokrevností mozku v důsledku poklesu krevního tlaku.

..... – pacient se podobá spícímu.

..... – pacient reaguje pouze na silnější bolestivé podněty.

..... – představuje nejtěžší stupeň bezvědomí.

..... (mrákotný stav).

..... značná pohybová aktivita i afektivita pod vlivem rozmanitých halucinací.

..... vypadá podobně jako delirium, avšak trvá delší dobu (týdny či měsíce).

Šok

Pouřazový šok –

Torpidní šok –

Torpidní šok –

5 „T“ při šoku:

1)

2)

3)

4)

5)

Křečové stavy

..... jsou mozková postižení různého původu, charakterizovaná opakujícími se záchvaty.

Některé typy:

.....

Nejčastější výskyt epileptických záchvatů -

5 základních klinických příznaků:

.....

.....

.....

.....

.....

Velmi důležitou integrální součástí léčby je.....

..... se zcela podobají generalizovaným epileptickým záchvatům, přicházejí však v doprovodu horečnatých onemocnění

Pro je příznačný demonstrativní až teatrální charakter.

U a je spouštějícím podnětem obvykle vztek, úlek nebo bolest, navazuje většinou křik a pláč.

..... jsou záchvaty parestézií a bolestivých tonických křečí obvykle pouze na ruku nebo také na nohu, méně často též v obličeji či celotělově.