

Problematika sluchových vad u dospělých a seniorů

Presbyakuzie (presbyakusis)

- ◆ po 30.roku věku se začíná zhoršovat funkce sluchu
- ◆ mezi 55.-60.rokem se začíná projevovat zhoršení funkce sluchového ústrojí i na frekvencích řeči
- ◆ toxické vlivy, hluk, stresové faktory, cévní postižení
- ◆ sensorineurální porucha v oblasti vyšších tónů
- ◆ percepce řeči narušují především hluky/šumy v blízkém okolí
- ◆ civilizační choroba

Následky sluchových ztrát

1. v komunikaci mluvenou řečí

2. v orientaci sluchově postiženého v (akustickém) prostředí

Nejčastější projevy:

Sluchové vady získané v dospělosti

- ◆ **hlavní problém:**

- ◆ **etiologie:**
 - infekce,
 - ototoxické léky,
 - aterosklerotické změny,
 - úraz,

- heredodegenerativní sluchové vady, které se zhoršují
- Meniérova choroba,
- imunologické poruchy,
- roztroušená skleróza, atd.

◆ náhlá x postupná ztráta sluchu

Nejčastější potíže:

- ◆ komunikační bariéra
- ◆ strádání v oblasti vnímání podprahových podnětů
- ◆ obavy ze ztráty zaměstnání, příp. ztráta zaměstnání
- ◆ obranné mechanismy:
- ◆ znalosti a dovednosti v oblasti užívání mluvené i psané řeči nejsou zárukou pro zachování dosavadní kvality života (společenský život,...)
- ◆ malá informovanost:

neslyšící od narození x ohluchlí v dospělosti a ve stáří

Následná péče po ohluchnutí

- ◆ u některých případů dochází ke spontánní úpravě, příp. k výraznému zlepšení
- ◆ u ostatních:
- ◆ často:

Problematika generace seniorů

- ◆ **Kvalita života stárnoucích osob (změna z důvodu příchodu nových stresových situací)**

- zhoršení ekonomické situace
- ztráta kontaktu s rodinou, děti mimo domov, sourozenci po smrti
- ztráta partnera
- kromě SP jiné zdravotní problémy
- omezení či ztráta možnosti rekreačních dovolených
- emocionální stres

Sociální izolace

Presbyakuzie a senioři v domovech důchodců