

Úvod do buněčné biologie 2

(Cytologie II)

Mgr. Robert Vlček, Ph.D.

Nadmolekulární komplexy dříve označované jako tubulární orgány:

1. Centrozóm = 2 centrioly
2. Bičíky a brvy (flagella a cilie)
3. Cytoskelet: mikrotubuly, mikrofilamenta a intermediální fibrily

10. Orgány tubulární


a schéma stavby centriolu; vlevo celkový pohled, vpravo příčný řez v označené rovině; změny centriolů během buněčného cyklu.

V interfázni buňce se vedle každého z obou centriolů tvořících diplozóm vytvoří malý pro-centriol, který během mitózy dosáhne velikosti normálního centriolu; každá dceřiná buňka pak obsahuje opět jeden normální diplozóm;


c stavba brvy v příčném průřezu;

d úloha mikrotubulů při přesunu pigmentu v pigmentových buňkách. Vlevo je znázorněn stav, při němž jsou pigmentová zrna rozptýlena mezi radiálně uspořádanými mikrotubuly v buňce. Uprostřed je zakreslen detail mikrotubulů a pigmentových zrn a vpravo stav, při němž jsou pigmentová zrna koncentrována v centru buňky; mikrotubuly v tomto případě nejsou diferencovány.



Podle Mailleta.




a




b








Obr. 48 Mikrotubuly v buňce PtK2 linie myšice. Mikrotubulární síť vizualizována imunofluorescencí.
J - Jádro bunky.



Obr. 49 Síť mikrofilament spojená do silnějších svazků ve stejné bunce jako na obr. 48. Imunofluorescence.
J - Jádru bunky




Obr. 50 Fibrilární síť intermediálních filament cyokeratinového typu v sekundární buněčné kultuře ledvinových buněk myšice. Imunofluorescenční mikroskopie




Obr. 51 Fluorescenční (A) a elektronová (B) mikrofotografie téže bunky PtK2 linie. V prvním případě bylo použito specifického antiséra proti tubulinu a fluorochromu, poté byl preparát obarven pro potřeby elektronové mikroskopie uranyl acetátem. Fluorescenční fibrily souhlasí s rozmístěním fibril v TEM a mají průměr 55 nm.

Buněčný cyklus



12. Buněčný cyklus

1 profáze; 2 a 3 rané stadium metafáze; 4 konec metafáze; 5 anafáze; 6 telofáze. A_1 a A_2 jsou nově vzniklé dceřiné buňky. Zesilující se křivka znázorňuje stoupající množství DNK během interfáze.
Podle Mailleta.





Obr. 75. Mitotické dělení

a = interfáze, b = profáze, c = metafáze, d = ranná anafáze, e = pozdní anafáze, f = telofáze.

Typ buňky	Profáze	Metafáze	Anafáze	Telofáze	Mitotický čas
Buňky myší sleziny	20 - 35'	6 - 15'	8 - 14'	9 - 26'	43 - 90'
Fibroblasty z jater čolka	18' i. více	17 - 38'	14 - 26'	28'	77 - 100'
Buňky sarkomu MTK-1	10'	44'	5'	18'	77'
Neuroblasty kobylinky	102'	13'	9'	57'	181'

Pozn.: Netřeba se učit! Jde o příklady pro vytvoření si určité představy ...

**A – zneklidnění
povrchové plazmy**





**B – fontánovité
proudění plazmy**


Obr. 76. Cytokinéze

Stavba chromozómů


13. Chromozóm

a obecné schéma chromozómu;
b schéma vícenásobné spiralizace chromatinového vlákna v chromozómu (podle modelu Bahra); ohraničený úsek je vždy v následujícím obrázku silně zvětšen;
c interpretace ultrastruktury chromatinového vlákna v chromozómu;
d změny spiralizace chromatinového vlákna v chromozómu během buněčného cyklu.
Podle různých autorů.






c



d



Obr. 68. Stavba chromozómu
a = chromonema, b = chromatida,
c = chromomery, d = primární
konstrikce, e = sekundární
konstrikce, f = satelit, g =
centromera, h = trakční vlákén-
ko, i = organizátor jadérka.

Tabulka 2
Počet chromozómů v tělních buňkách některých živočichů

Systematické zařazení	Druh	2n
ploštěnci koryši	<i>Fasciola hepatica</i>	12
	<i>Cyclops gracilis</i>	6
	<i>Cyclops fuscus</i>	14
	<i>Cyclops insignis</i>	22
vzdušnicovci	<i>Drosophila melanogaster</i>	8
obratlovci — ryby	<i>Cyprinus carpio</i>	104
obratlovci — obojživelníci	<i>Xenopus laevis</i>	36
obratlovci — ptáci	<i>Gallus domesticus</i>	78
obratlovci — savci	<i>Micromis minutus</i>	68
	<i>Mus musculus</i>	40
	<i>Homo sapiens</i>	46


Pozn.: Netřeba se učit! Jde o příklady pro vytvoření si určité představy ...

Tabulka 6.

Somatické počty chromozómů u významných druhů živočichů

Jméno druhu	Počet chromozómů
Nezmar, <i>Hydra vulgaris</i>	32
Ploštěnka, <i>Planaria gonocephala</i>	16
Žížala, <i>Lumbricus terrestris</i>	36
Hlemýžď, <i>Helix pomatia</i>	24, 48
Škrkavka, <i>Ascaris megalocephala</i>	2, 4
Klíště, <i>Ixodes ricinus</i>	28
Saranče, <i>Locusta migratoria</i>	23
Šváb, <i>Blatta orientalis</i>	48
Mšice, <i>Myzodes persicae</i>	12
Bělásek, <i>Pieris brassicae</i>	30
Včela, <i>Apis mellifica</i>	16, 32
Komár, <i>Culex pipiens</i>	6
Moucha, <i>Musca domestica</i>	12
Štika, <i>Esox lucius</i>	18
Kapr, <i>Cyprinus carpio</i>	104
Skokan, <i>Rana esculenta</i>	26
Ještěrka, <i>Lacerta agilis</i>	38
Kachna, <i>Anas platyrhyncha</i>	80
Holub, <i>Columba livia</i>	80
Králík, <i>Lepus cuniculus</i>	44
Myš, <i>Mus musculus</i>	40
Krysa, <i>Rattus norvegicus</i>	42
Pes, <i>Canis familiaris</i>	78
Kočka, <i>Felis domestica</i>	38
Skot, <i>Bos taurus</i>	60
Koza, <i>Capra hircus</i>	60
Ovce, <i>Ovis aries</i>	54
Vepř, <i>Sus scropha</i>	40

**Pozn.: Netřeba se učit! ...
Jde o příklady pro vytvoření si
určité představy ...**



Obr. 78. Meiotické dělení



a = leptoten, b = zygoten, c = pachyten, d = diploten, e = diakinéze, f = metafáze I. zracího dělení, g = ana-fáze I. zracího dělení, h = telofáze I. zracího dělení, i = II. zrací dělení, j = buket, k = bivalenta, l = re-dukční štěrba, m = ekvační štěrba, n = tetráda, o = crossing-over (výměna chromatinu mezi chromatidami). p = chiasmotypie.

Pozn.: Netřeba se učit jednotlivé fáze 1. zracího dělení! ...

Jde o pochopení principu meiózy jako redukčního dělení ($2n \rightarrow n$), kdy dojde 2x k rozdělení buňky (1. a 2. zrací dělení), ale jen 1x k rozdělení chromozómů (chybí interfáze)!

...

... K meióze dochází v průběhu tvorby gamet (pohlavních buněk) ...



... V průběhu tvorby gamet může docházet k tzv. crossing-overu. ...




Schéma crossing-overu: 1 kombinace alel v gametách bez uplatnění crossing-overu, 2 kombinace alel v gametách s uplatněním crossing-overu

Použité zdroje:

- **Knoz J.: Obecná zoologie. I, Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie. 4. vyd., Praha: SPN, 1990. 328 s.**
- **Paleček J.: Obecná zoologie – Praktická cvičení I., Praha: UK, 1987. 141 s.**
- **Pravda O.: Zoologie. 3, Obecná zoologie. 1. vyd., Praha: SPN, 1982. 323 s.**