

Rodina dítěte/dospělého s postižením Specializace Psychopedie

Dobu sdělení diagnózy lze označit jako krizi rodičovské identity.

Diagnóza měla rodičům sdělit v přijatelných podmínkách, vhodnou osobou a vhodnou, srozumitelnou formou.

Informování by mělo být citlivé a vyvážené, rodiče by neměli být zahlceni množstvím informací. Sdělení diagnózy (pravdivé a ohleduplné) je velmi emočně i profesně náročné i pro odborníky,

Samotná diagnóza, kterou určí lékař nestačí, neboť je příliš obecná.

Proces vyrovnání se s postižením dítěte

Stádia vyrovnávání

iniciální šok,

popření,

smlouvání,

agrese (zlost),

deprese (pocit viny)

rovnováha a přijetí postiženého dítěte.

Typ výchovy

zavrhující výchova,

lhostejná a zanedbávající výchova,

výchova rozmazlující,

úzkostná (hyperprotektivní) výchova,

perfekcionistická výchova,

protekční výchova.

Stresové situace v rodině

Vědecké studie dokazují, že autismus zvyšuje stres v rodině a v mnohých případech se stává chronickým.

Při srovnání PAS s jiným postižením (např. DS), je stres provázející autismus vyšší (dáno specifickými rysy autismu).

Stresové situace mají různý dopad podle role členů rodiny.

Některé rodiny udávají značnou dysfunkci (často rodinu jeden z rodičů opustí) jiné nikoliv.

Jsou i rodiny, které si myslí, že jejich manželský život byl obohacen nutností zajistit jejich dítěti speciální potřeby.

Prevence stresu

Nejdůležitější prevencí stresu je včasná diagnóza a včasná specializovaná pomoc (raná péče).

Sourozenci dětí s MP

Pořadí, ve kterém se postižené dítě narodí, má velký vliv na rodinu i na sourozence.

Může být obtížné porozumět zvláštnímu chování sourozence,

může se cítit ostrčen, strádat pocitem, že mu rodiče věnují méně pozornosti,

může na něj být kladena větší odpovědnost,

velmi často se spolužáci sourozenci MP dítěte posmívají.

Tyto problémy se mohou rozhodujícím způsobem podílet na vytváření rodinných vztahů, vztahů s vrstevníky a mohou ovlivnit sebepojetí dítěte.