

**REPRODUKČNÍ ORGÁNY,
NEZRALOST ŽENSKÝCH
POHLAVNÍCH ORGÁNŮ,
GYNEKOLOGIE U
DOSPÍVAJÍCÍCH**

REPRODUKCE A REPRODUKČNÍ ORGÁNY

- re- produkce
- **GAMETY**
 - mužské (spermie) a ženské (vajíčka) pohlavní buňky
 - dozrávají v pohl. žlázách (**gonádách**) – ve **vaječníku ženy** a ve **varleti muže**
 - zrání spermií začíná s nástupem pohlavní zralosti, začíná probíhá nepřetržitě až do vysokého věku embryonálním období
 - vývoj vajíček už v

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY

POHLAVNÍ ORGÁNY

- **vnitřní** (vaječník, vejcovod, děloha a pochva)
- **vnější** (velké a malé stydké pysky, stydký pahorek, poštěváček, poševní předsíň a Bartholiniho žlázy)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Bartholiniho_%C5%BE%C3%A1za

VNITŘNÍ POHLOVNÍ ORGÁNY ŽENY

VAJEČNÍK (*ovarium*)

- párová ženská pohlavní žláza
- v pubertě zde **dozrávají** vajíčka a produkují se ženské pohlavní hormony
- během jednoho cyklu se jeden z folikulů změní na **Graafův folikul**, ve kterém dozrává **vajíčko**
- vytváří **ESTROGENY** a po přeměně na **žluté tělíska** produkuje **PROGESTERON**



VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

VEJCOVOD

- dvě trychtýřovité trubice vystlané **řasinkovým** povrchem
- zachycují **vajíčko** uvolněné z vaječníku a transportují jej peristaltickými pohyby svalstva a pohybem řasinek **do dělohy**

Obr. 6 VERDOUX, Christiane. Encyklopédie pohlavního života.
[Sv. 3.], Dospívající, 1994

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

DĚLOHA (*uterus*)

- nepárový dutý svalový orgán
- slouží k uhnízdění oplozeného vajíčka a k vývoji zárodku a plodu
- horní část je **tělo** a dolní část je **hrdlo** zakončené **čípkem/krčkem (cervix)**
 - po oplodnění se tu vyvíjí plod
 - středem je čípkový kanál, ve kterém se tvoří výměšek napomáhající průniku spermií
 - aktivují se tu žlázky, které tvoří hlen jako pubertální sekret
 - odtékající
- dutina děložní je pokryta **sliznicí (endometrium)**, na jejímž povrchu je cylindrický epitel
- v dospělosti je čípek kryt mnohovrstev. dláždic. epitemem, stejně jako

DĚLOHA

- vzájemný poměr velikosti těla dělohy a jejího hrdla během vývoje dívky a ženy je výsledkem citlivosti na **estrogeny**
- u dospělé ženy měří na délku cca 6-9 cm a v těhotenství se s růstem plodu zvětšuje objem až 50x
 - při oplození vajíčka, zajišťuje jeho výživu až do vytvoření placenty

VNITŘNÍ POHLOVNÍ ORGÁNY ŽENY

POCHVA (*vagina*)

- pružný trubicový orgán spojující zevní a vnitřní orgány
- dolní konec ústí mezi malými stydkými pysky jako vchod poševní
- sliznice (dlaždicový epitel)
- Döderleinův *lactobacillus* - způsobuje kyselost poševního prostředí
- nízké pH = ochrana před vag. mykózou
- poševní cytologie - diagnostika poruch funkce vaječníků, protože výstelka pochvy prodělává změny v závislosti na sekreci vaječníkových hormonů během ovariálního cyklu

HYMEN

PANENSKÁ BLÁNA (*hymen*)

- slizniční řasa v pochvě s malým většinou kruhovým otvorem
- **deflorace** = roztržení
- buď je jemná a pružná a při průniku nedochází k jejímu poškození, nebo je blána tuhá a průnik je obtížný a provázený bolestí
=> chirurgický zákrok vedoucí k odstranění hymenu
- zbytky hymenu žena definitivně ztrácí až v průběhu prvního porodu

VNĚJŠÍ POHLOVNÍ ORGÁNY

- **VENUŠIN/STYDKÝ PAHOREK** (**č. 1**) - oblast vyčnívající tukové tkáně nad stydkou kostí
- **VELKÉ STYDKÉ PYSKY** – (**č. 7**) kožní řasy vyplněné tukovou tkání
- **MALÉ STYDKÉ PYSKY** – (**č. 5**) překryty velkými stydkými pysky
- **POŠTĚVÁČEK** (*clitoris*) (**č. 2-4**)
- **POŠEVNÍ PŘEDSÍŇ** (**č. 11**) - vyústuje do ní močová trubice

Ve vchodu poševním je ústí dvou **BARTHOLINIHO ŽLÁZ** vylučujících kluzký hlen, který připravuje poševní vchod na hladké proniknutí penisu.

(**č. 6** = zevní ústí trubice močové; **č. 8** = panenská blána;
č. 12 = ústí pochvy)

CLITORIS

POŠTĚVÁČEK (*clitoris*)

- tvarem, typem tkáně i chováním velmi podobný penisu; plný nervových zakončení
 - vrcholek měří 2 cm, společně s vnitřní částí měří až 20 cm

Ženská pohlavní soustava:

<https://www.youtube.com/watch?v=Fe0ED2Oea8Y>

PUSTIT:

<https://www.youtube.com/watch?v=iLukX6bSZWs>

POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE

POHLAVNÍ ORGÁNY

- **vnitřní** (varle, nadvarle, chámovod, semenné váčky, Cowperovy žlázy a předstojná žláza)
- **vnější** (pyj, šourek)

VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY

VARLE (*testis*) č. 1

- párová mužská pohlavní žláza vejčitého tvaru
- po narození by měly sestoupit a být uloženy mimo dutinu břišní v šourku (potřeba teploty o 2°nižší) – jinak VVV mužského genitálu - **kryptorchismus** => chirurgické odstranění vady

NADVARLE (*epididymis*) č. 7 - přiléhá shora a ze zadu na varle

- skladишťe zralých spermíí
- uvnitř množství stočených kanálků, které se spojují do chámovodu (č. 11)
- nejsou-li odtud spermie odvedeny při ejakulaci, stárnou a postupně se rozpadají

č. 2 a 6 = horní a dolní pól varlete

č. 12 = šourkový vaz

Obr. 15 https://is.muni.cz/do/fspse-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomie_II/pages/muzske_organy.html

STAVBA VARLETE

Na povrchu je tenký vazivový obal, ze kterého vystupují do varlete přepážky oddělující jednotlivé lalůčky, které jsou vyplněny **semenotvornými kanálky**.



- prostor mezi nimi vyplňuje řídké vazivo, v němž jsou skupiny **Leydigových buněk** - produkují TESTOSTERON pod vlivem LH adenohypofýzy

K tvorbě spermií je potřebný vitamin A.

VNITŘNÍ POHLOVNÍ ORGÁNY

CHÁMOVOD

- párový orgán
- vystupuje šourkem z nadvarleťe –> spojení s vývodem **SEMENNÝCH VÁČKŮ**, jejichž polotekutý sekret přispívá k pohyblivosti spermíí –> prochází prostatou a zde ústí do moč. trubice –> vstupuje do pyje

Moč. trubice je tak společnou cestou močovou i pohlavní.

PŘEDSTOJNÁ ŽLÁZA (*prostata*)

- nepárový svalově žláznatý orgán
- dodává spermíím zásadité prostředí
- tendence zbytnět –> **adenom** (nádor ze žláz. epitelu) **prostaty**
- zvětšení jejího objemu snižuje schopnost dokonalého vyprázdnění při močení

VNITŘNÍ POHLOVNÍ ORGÁNY

**Tekuté výměšky obou nadvarlat,
semenných váčků a prostaty
spolu se spermiami tvoří semeno
(ejakulát/chám).**

Pod prostatou jsou uloženy párové
COWPEROVY ŽLÁZY (č. 18).



- při pohlavním dráždění vedou do moč.
trubice čirý lepkavý sekret usnadňující
pohyb ejakulátu po stěně trubice, vylučuje
zásaditou tekutinu, kt. neutralizuje zbytky
moči

VNĚJŠÍ POHLOVNÍ ORGÁNY

PYJ (*penis*)

- připojen vazivovými pruhy ke sponě stydké
- pokryt tenkou kůží, která na rozhraní žaludu (č. 1) a těla (č. 10) tvoří zásobní řasu – **předkožku** (č. 3 a 8) – kryje žalud

Ejakulace - řízena z ejakulačního centra v bederní mísce.

Sympatikus – > stahy chámovodu - dopraví spermie z nadvarlete spolu se sekretem sem. váčků do moč. trubice v prostatě – > prostatata a Cowp. žlázy připojují svůj sekret a vzniklý ejakulát - vypuzen rytmickými stahy svalů

(č. 5 = vnější ústí trubice moč.; č. 6 = předkožková žláza;)

VNĚJŠÍ POHLAVNÍ ORGÁNY


Pod pyjem je kožní vak **ŠOUREK** (*scrotum*) s párovou dutinou, kde je v každé uloženo varle, nadvarle a začátek chámovodu.

Pustit:

<https://www.youtube.com/watch?v=FP0KxUdTJh4&sprefload=5>

Muzske pohl. org.

<https://www.youtube.com/watch?v=16L7KGGqPhU>



Obr. 19 http://www.androgeos.cz/cs_CZ/sourek

VÝVOJ POHLOVNÍCH ŽLÁZ

- vaječníky i varlata – zakladání už v **zárodečném** období v dutině břišní
- v době nitroděložního vývoje sestoupí vaječníky do malé pánve
- varlata začínají sestupovat koncem 7. měsíce, procházejí tříselným kanálkem do šourku
- od dětství do puberty – **pohl. žlázy v růstovém i funkčním klidu**
- rychlý růst pohl. žláz a vstup do funkce - v **pubertě**, kdy se začínají tvořit pohl. hormony (pod vlivem **LH, FH**) a posléze i pohl. buňky
- kolem 45. roku - u žen postupné vyhasínání činnosti vaječníků a přestává tvorba pohl. buněk a menstruace (**klimakterium**)
- u mužů dochází s věkem také k pozvolnému snížení hormonální činnosti a tvorby anormií – ale tyto funkce nikdy zcela nezanikají

NEZRALOST ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Předčasný nástup menstruace

- jestliže se menarche **DOSTAVÍ před 10 rokem**
- souvisí s předčasní pubertou, kdy se pubertální změny objevují před 8 rokem

Poruchy puberty mohou být ve smyslu předčasného, opožděného či zcela chybějícího pohlavního vývoje.

Předčasná puberta

- vyvolávána hormonálně aktivními nádory vaječníků, poruchami řídicích center v mozku, cystami vaječníků (znemožňují uvolňování zralého vajíčka)

NEZRALOST ŽENSKÝCH POHLOVNÍCH ORGÁNŮ

Primární amenorea

- jestliže se do 15 let nedostaví menarche
- nutná návštěva lékaře – může jít o poruchy dospívání jako **VVV ženských pohl. orgánů**, nebo **stavy s nadprodukcí mužských pohl. hormonů**

Sekundární amenorea

- **přerušení** menstr. cyklů v různém odstupu od menarche
- cyklus v adolescenci je labilnější - reaguje na zevní vlivy více než u dospělých žen
- závažnou příčinou - **mentální anorexie a PPP obecně** - > dochází k prodloužení cyklu až vymizení menstruace s atrofií genitálů, prsů a rozvojem osteoporózy - léčení velmi náročné
- Syndrom polycystických vaječníků
- https://www.youtube.com/watch?v=INrm_gTPyTQ

NEZRALOST ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

- DOSPÍVÁNÍ - dozrává a mění se imunitní obrana jedince


Při dovršení celkového tělesného vývoje (kolem 18. roku), je žádoucí, aby vývoj pohlavních orgánů do té doby nebyl narušen škodlivými vlivy.

- děložní čípek DOSPĚLÝCH ŽEN - dlaždicový krycí epitel
- hranice mezi odolným mnohovrstevným dlaždicovým epitelem čípku a jednovrstevným cylindrickým epitem děložního kanálu se během života ženy posune

V OBDOBÍ PUBERTY A DOSPÍVÁNÍ SE
CYLINDRICKÝ EPITEL ČASTO DOSTÁVÁ AŽ NA ČÍPEK



- snadnější průnik infekce z pochvy
(kapavka, chlamydiové infekce, lidský papilomavirus ...)



TĚLESNÉ DOSPÍVÁNÍ DÍVEK

TĚLESNÉ DOSPÍVÁNÍ DÍVEK

- rozdělení dle přítomnosti nebo nepřítomnosti ženských pohl. hormonů v organismu:



1. období- NOVOROZENECKÉ

- všechny pohl. orgány již vytvořeny
- počátek správné péče o vnější pohl. org. - prevence přenosu infekce

2. období- KLIDOVÉ

- - až do začátku puberty (8-13 let)
 - organismus není pod vlivem pohl. hormonů
- => tkáně jimi ovlivňované jsou ve **stádiu funkčního klidu**

3. období – POHLAVNÍHO DOSPÍVÁNÍ

- rozvoj všech tkání a orgánů, které jsou citlivé a reagují na ženské pohl. hormony

GYNEKOLOGIE U DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK

Gynekologie = medicínský obor zabývající se prevencí a léčbou poruch ženských pohl. orgánů

- PROČ? -

Pohlavní styk přináší riziko zanesení infekce pohlavními přenosnými chorobami do vnitřních pohlavních orgánů, nemluvě o riziku nežádoucího těhotenství.

- KDY ZAČÍT? -

Nejlépe ve 13. - 15. letech z důvodu z pohledu poučení o antikoncepcii, prevenci pohlavně přenosných chorob včetně možnosti očkování proti infekci lidskými papilomaviry .

GYNEKOLOGIE U DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK

- **PREVENTIVNÍ ONKOGYNEKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ** - cytologické a optické vyšetření děložního hrdla, pohmatové vyšetření malé pánve a případně prsů
- možnost řešení otázek **nepravidelnosti menstr. cyklu** s doktorem
- vyšetření vyžaduje dívka, která krvácí:
 - ČASTO A SILNĚ
 - SLABĚ, ALE DLOUHODOBĚ

V obou případech je ohroženo zdraví - krevní ztráty jsou příliš velké a vedou k nedostatku Fe v organismu.

Otázka **hormonální antikoncepcie** – předepisována i z důvodů gynek. potíží – je potřeba uvážit nedokončený vývoj dělohy a neustálenou funkci vaječníků!

GYNEKOLOGIE U DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK

- **Prevence karcinomu děložního čípku = OČKOVÁNÍ**
 - karcinom způsoben infekcí typy lidských papilomavirů
 - **cytologické vyšetření** = setření buněk z povrchu děložního hrdla a jeho kanálu (1x ročně)
 - v případě karcinomu dochází v těchto místech k nekontrolovatelnému množení buněk změněných **HPV infekcí**
 - **očkování** ideálně před zahájením pohlavního života dívky

-
- **dostupné druhy vakcín** (vždy ve 3 dávkách, vázány na lékařský předpis, nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění):
 - **GARDASIL 9**
 - **SILGARD**
 - **CERVARIX**

KARCINOM DĚLOŽ. ČÍPKU

- zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. **kondylomů**) a za těžké přednádorové změny
- **kondom** snižuje riziko přenosu, **ale k infekci může dojít**, protože HPV se přenáší především pohl. stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány
- i u vakcinovaných žen nutno pokračovat ve **screeningu** tohoto karcinomu
- počáteční fáze onemocnění je víceméně bezpříznaková, výraznější symptomy až v pokročilejších stádiích nemoci (vodnatý až krvavý poševní výtok, kontaktní krvácení, bolesti podbřišku ...)

GYNEKOLOGIE U DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK

- **ZÁKLADNÍ GYNEKOLOGICKO-ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ**
 - **Rakovina děložního čípku**
 - **Rakovina dělohy** - nejčastěji postihuje ženy v postmenopauzálním věku, charakteristickým znakem je děložní krvácení.
 - **Rakovina vaječníků** - většina způsobena HPV infekcí
 - **Rakovina vulvy** - většina způsobena HPV infekcí
 - **Rakovina vagíny** - většina způsobena HPV infekcí
 - **Rakovina prsu**
- **NĚKTERÁ DALŠÍ GYNEKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ**
 - **Zánět zevních rodidel a pochvy** - nutná včasná léčba a zamezení přechodu zánětu na vnitřní pohl. orgány
 - **Zánět děložních přívěsků** - projevuje se bolestí v podbřišku zhoršující se při pohybu, bolestivou menstruací, teplotou, výtokem – nutná včasná léčba

Závažným stavem V KAŽDÉM VĚKU je **náhlá příhoda břišní a bolesti břicha**, zejména opakující se.

POUŽITÉ ZDROJE

- ŠULOVÁ, Lenka, Tomáš FAIT a Petr WEISS. Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha: Maxdorf, 2011. 439 s. ISBN 9788073452384.
- MACHOVÁ, Jitka a Jana HAMANOVÁ. Reprodukční zdraví v dospívání. Vyd. 1. Praha: H & H, 2002. 197 s. ISBN 80-86022-94-3.
- HAJNOVÁ, Růžena, Tomáš NOVÁK a Věra CAPPONI. Sexuologický slovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 1994. 149 s. ISBN 80-7169-115-1.
- VERDOUX, Christiane. Encyklopédie pohlavního života. [Sv. 3.], Dospívající. Bratislava: Slovart, c1994.
- ZVĚŘINA, Jaroslav. *Lékařská sexuologie* [Zvěřina, 2012]. Praha: Schering, 2012.
- LAUDER, Silvie. Tajemství ženské sexuality. *Respekt*. 2016, XXVII(37), 6.

POUŽITÉ ZDROJE

Neumírejme mladí - Ženská pohlavní soustava: <https://www.youtube.com/watch?v=Fe0ED2Oea8Y>
<http://www.forumzdravi.cz/gynekologie/103-poruchy-menstruacniho-cyku>
<http://hpvinfo.cz/cipku-delozniho-ockovani-proti-rakovine>
<http://lekarske.slovniky.cz/>
<http://www.vecverejna-cz.eu/cs/o-rakovine-delozniho-cipku>
<http://www.tribune.cz/clanek/25937-zensky-reprodukci-system>