

Rozlišování savců podle zubních vzorců

Vačnatí 5134-5/4134 (až 52)



Placentálové: 3143-3143 (44)

Řezáky *incisivi* I špičáky *canini* C z. třenové *premolares* P stoličky *molars* M

Zubní vzorce savců podle jednotlivých řádů třídy savců

Hmyzožravci



špičáky menší než řezáky

bělozubka

3 1 1 3 (28)
2 0 1 3

rejsec 30
3123/1113

Stoličky hrbolekaté až hrotité



Obr. 92: Zuby hmyzožravců (a) a šelem (b)

Rejskovití – jařmové oblouky chybí
Krtek – jařmové oblouky tyčinkovité
Ježci – jařmové oblouky normální

Letouni

mezera mezi řezáky v horní čelisti

Vrápenci – nosní část nápadně zvětšená (výduť),
2 páry řezáků v dolní čel.

(1) 1 2 3 (32)
2 1 2 3

Netopýři – 3 páry řezáků v dolní čelisti

Eptesicus, Vespertilio

2 1 1 3 (32)
3 1 2 3



Barbastella, Pipistrellus, Nyctalus 34
2123/3123

Plecotus 36

Miniopterus, Myotis


2 1 3 3 (38)
3 1 3 3

lebka netopýra velkého



Šelmy


špičáky větší než řezáky



rys

3 1 2 1 (28)
3 1 2 1

kočka (30)
3 1 3 1




Obr. 129: Lebka rysa ostrovida

tchoř (34)
3-1-3-1

vydra(36),jezevec(36-38)
3 1 4 1
3 1 3- 2

kuna (38)



Obr. 133: Lebka lišky obecné

pes, liška
3 1 4 2 (42)
3 1 4 3

Stoličky s tupě hrbolkatým povrchem (hřebenité),
první nápadně velká – **trhák** (čtyři trháky tvoří vždy poslední horní třenák
a první dolní stolička na každé straně)

Vydra: plošší lebka s nízkým sagitálním hřebenem
Jezevec: protáhlýší lebka s vysokým sagitálem

Hlodavci

Neúplný chrup – 1 pár řezáků v horní čelisti, velká diastema

(myší a hrabošů: **1003-1003 [16]**). Standard: 22

Odchylky od standardu:

myšivka (18)



1013/1003

bobr, nutrie, plchové (20)


1013/1013

veverka (22)

1023/1013



Hraboši – hypsodontní stoličky
(vysoké korunky, bez kořenů)




(křeček), myši, krysy – brachydontní stoličky
(nízké korunky, kořeny)

Sudokopytníci

v obou čelistech diastema

S. přežvýkaví

Horní čelist bez řezáků




Chrup (stoličky) přežvýkavců: jelenovití (a),

Jelen	daněk	srnec	muflon
<u>0 1 3 3</u> (34)	<u>0 0 3 3</u> (32)	<u>0 0 3 3</u> (32) (někdy u juv M hor. C	<u>0 0 3 3</u>
3 1 3 3	3 1 3 3	3 1 3 3	3 1 3 3

Jelenovití – základy korunek stoliček zvenku viditelné, boční hrany nedosahují k okraji alveol, pučnice pro parohy

Turovití – vysoké korunky stoliček s žebrováním, základy ukryté v alveolách, rohové kosti s rohy



Chrup (stoličky) přežvýkavců: turovití (b)

S. nepřežvýkaví


Horní čelist s řezáky, někdy malá diastema, trojhranné špičáky ven

prase

3 1 4 3 (44)

3 1 4 3

Bunodontní stoličky – hrbolkovité korunky



Obr. 145: Lebka prasete divokého

P1–M3

P1–M3


Zajíci

Horní čelist
se dvěma páry řezáků,
podélná rýha v 1. páru, velká diastema


zajíc, králík

2 0 3 3 (28)
1 0 2 3

Příčně lištovitý povrch M a P



Obr. 144:
Lebka a určovací znaky
zajíce polního (a)
a králíka divokého (b)




Lichokopytníci


Nosorožci 24 – 34



Nálezy



Výsledek



Koně 36 – 44

3 0-1 3-4 3
3 0-1 3-4 3



Tapíři 44

Úkol (samostatná práce):

- rozlišit a poznat typy předložených zubů,
případně jejich nositele

(alespoň rody)

- zaznamenat pro následnou kontrolu

Seznam předložených zubů

1	řezák	prase
2	špičák	prase
3	stolička	prase (bunodontní M)
4	řezák	tur
5	stolička	tur (žebrov. M)
6	řezák	zajíc
7	řezák	potkan
8	stolička	zajíc (lišt. M)
9	stolička	potkan (brachyodont. M)
10	řezák	kočka
11	řezák	pes
12	špičák	kočka
13	špičák	pes
14	stolička	kočka (hřeben. M)
15	stolička	pes (hřeben. M)

Pracovní list

Téma: zuby savců

Pachatel:

Rozlišování zubů

Poznej typy předložených zubů, případně jejich nositele (alespoň rody)

1.
2.
3.
4.
5.

Rozlišování savců podle zubního vzorce

6.
7.
8.
9.
10.