

Pokud se díváme na řádky matice A jako na vektory,

Důležité!  
oznámění

$$\vec{a}_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$$

$$\vec{a}_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$$

$$\vdots$$

$$\vec{a}_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}), \text{ lze determinant } |A| = \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m)$$

chápá jako zobrazení  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , které přiřadí m vektorům v danému pořadí

číslo  $\det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m) = \sum_{(i_1, i_2, \dots, i_m)} (-1)^{N(i_1, i_2, \dots, i_m)} \cdot a_{1i_1} a_{2i_2} \dots a_{mi_m}$

Při tomto označení je zobrazení  $\det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m)$  antisymetrické, tj. rozměřeno 2. řádkových řádků a mění se znaménko determinantu:

(D2)  $\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_l, \dots, \vec{a}_m) = -\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_l, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m)$

[Důkaz: rozměřeno dvou indexů se jedná inverze a permutaci přivádí nebo ubere, tj. před každým součinem m prvků bude k znaménko opačné znaménko i když i před celým determinandem bude opačné znaménko]

Důsledek lemmatu D2: Determinant matice A se dvěma stejnými řádky je roven 0.

[Důkaz: když rozměřeno bylo stejné řádky, a mění se nic nestane, čili platí  $\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$ ; pokud je 0 splňuje buď rovnost, lze sama se rovná čísel, které se tím pouze rozměníkem]

Def. 6: Pokud  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$  jsou vektory, tak vektor  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$  jsou reálná čísla

$$\vec{v} := \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_k \vec{a}_k \quad \text{III lineární kombinace}$$

(lineární kombinace vektorů  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$  je jakýkoli součet násobků těchto vektorů)


Pr. 3 Vektor  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}$  rozpište jako lineární kombinaci vektorů  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

[řešení: hledáme  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix} = \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

zapíšeme tuto rovnost do souřadnic:  $2 = \alpha_1 - 2\alpha_2$   
 $10 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$

sečteme oba rovnice:  $12 = 4\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 3, \alpha_2 = \frac{1}{2}$

tedy  $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$  ... tedy vektor  $\begin{pmatrix} 2 \\ 10 \end{pmatrix}$  je lineární kombinací vektorů  $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$



vektor  $\vec{z}$  je lineární kombinací = součtem  
 +  $\alpha$ - násobku vektoru  $\vec{u}$   
 a  $\beta$ - násobku vektoru  $\vec{v}$

(vektor je roven součtu a násobkem  
 vektorů, které mají stejnou velikost i směr,  
 jsou shodné)

D3.  $\det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m)$  je rovno zemi lineární v každé sloupci, tj.

$$\det(\vec{a}_1, \dots, \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}, \dots, \vec{a}_m) = \alpha \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{u}, \dots, \vec{a}_m) + \beta \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{v}, \dots, \vec{a}_m)$$

$\alpha$  -  $k$ -ty vektor pro první  $k$  - je lineární kombinací vektorů  $\vec{u}, \vec{v}$

$$\begin{aligned} [Dk.: \sum (-1)^{N(j_1, \dots, j_m)} a_{1j_1} \dots (\alpha \cdot u_{kij_k} + \beta \cdot v_{kij_k}) \dots a_{mj_m} &= \\ & \text{PLUS} \\ & \text{výsledkem } \alpha, \beta \text{ a podmíněné na dané součty} \\ = \sum (-1)^{N(j_1, \dots, j_m)} a_{1j_1} \dots u_{kij_k} \dots a_{mj_m} + \beta \cdot \sum (-1)^{N(j_1, \dots, j_m)} a_{1j_1} \dots v_{kij_k} \dots a_{mj_m} &= \\ = \alpha \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{u}, \dots, \vec{a}_m) + \beta \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{v}, \dots, \vec{a}_m) & ] \end{aligned}$$

Poznámka: Vlastnost D3 lze přirozeně rozšířit tak, že  $k$ -ty vektor není lineární kombinací pouze dvou vektorů, ale  $l$  vektorů (el je číslo větší než 2).

Důsledek vlastnosti D3: Vynásobením  $k$ -tého řádku matice  $A$  se stejným číslem vynásobí i celý determinant.

$$(přesně z D3: \alpha \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m) = \det(\vec{a}_1, \dots, \alpha \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m))$$

Další důsledek vlastnosti D3, nebo lze i fakt plyne z definice  $|A|$ :

je-li některý řádek matice  $A$  řádek samých nul,  $|A| = 0$

$$(z D3: \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{0}, \dots, \vec{a}_m) = 0 \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m) = 0)$$

(nebo z definice:  $n$  kladem součinnu  $\times$  determinantu je výsledek jedna  $0 \Rightarrow |A| = 0$ )

Velikost vlastnosti D4: determinant matice A se nezmení, pokud k řádku  $\vec{a}_k$  přičteme nějaký násobek jiného řádku, například řádku  $\vec{a}_2$ :

$$\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m) = \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k + d \cdot \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m)$$

[Důkaz: rozepíšeme si pomocí sloupců jako normální:

$$\det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k + d \cdot \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m) = \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m) + d \cdot \det(\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m)$$

$\uparrow$  D3 = 0 podle D2 důsledkem  
 (determinant matice se dvěma stejnými řádky)

Vlastnost D4 nám poskytuje dobrý nástroj pro výpočet determinantů:

Snadíme se k nějakému řádku přičíst násobek jiného řádku, aby chová v matici k číselným vyjádření nul - čím více nul, tím méně součinnů je vynulových.

Definice 7: Schodový tvar matice A = takové obarvené matice A čísly, kde v každém dalších řádku matice je více nul vlevo než v řádku předchozím, nebo se má jednat o řádek samých nul.

Nyní se má můžeme vrátit k příkladu 2 a pokusit se vypočítat determinanty  $|A|, |A_1|, |A_2|, |A_3|, |A_4|$ : při úpravách využijeme hlavně vlastnost D4

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} -r_1 \\ -r_1 \\ -r_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ +2 \cdot r_2 \\ +r_3 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ +r_3 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-3) \cdot 3 = -9$$

... pokud se má pomoc  
 D1 až D4 pokud upravil matice má schodový tvar, determinant je roven součinu součinnů na hlavní diagonále

(ve všech dalších součinných musíme vybrat odpovídající jedničku nebo pod diagonálou)  
 tj: vyřizujících 23 součinnů je rovnou 0

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ (D2) \\ \\ \end{matrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} -2 \cdot r_1 \\ +r_1 \\ +3 \cdot r_3 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ (D3) \\ \\ \end{matrix} = -(-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 9 & 5 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ -r_2 \\ \\ \end{matrix} =$$

vynulujeme (-3) ze 2. řádku

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 9 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{vytkneme 2}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{-9 \cdot r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -24$$

Vlastnost D5 (Laplaceův rozvoj determinantu podle k-tého řádku nebo l-tého sloupce)

tenho rozvoj převede výpočet determinantu řádku n na n determinantů řádku (n-1):

rozvoj podle k-tého řádku: ↗ mění se sloupcový index j

$$|A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} a_{kj} \cdot |A_{kj}|$$

rozvoj podle l-tého sloupce: ↘ mění se řádkový index i

$$|A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+l} a_{il} \cdot |A_{il}|$$

kde  $A_{kj}$  jsou matice vzniklé z  $A$  vynecháním k-tého řádku a j-tého sloupce  
 kde  $A_{il}$  jsou matice vzniklé z  $A$  vynecháním i-tého řádku a l-tého sloupce

[Důkaz plyne z definice determinantu podle rozvoje:

např. pro řádkový rozvoj:  $a_{kj}$  se vyskytuje v  $(n-1)!$  součinech; když  $(-1)^{k+j} a_{kj}$  v těchto součinech vytkneme, v zátoce se objeví  $|A_{kj}|$  jako součet součinů  $n-1$  prvků, tj. determinant řádku  $n-1$  měřítko]

Ad p. 2: spočítáme  $|A_2|, |A_3|, |A_4|$  kombinací vlastností D1-D5:

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(D5) \text{ rozvineme např. podle řádku 3}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 0 \cdot |A_{31}| + (-1)^{3+2} \cdot (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+4} \cdot 0 \cdot |A_{34}| =$$

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2 + 0 + 0 - 2 - 0 - 0) + (-1 + 0 + 0 - 1 - 0 - 0) = -14$$

tj. mějme na převedení na determinanty nižších řádků, ale vynecháme přitom vždy jakýkoliv řádek nebo sloupec, který obsahuje nula prvek nul

A kováčovi

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{(D4)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{(D5) - \text{rozvoj podle 1. sloupce}} 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 + 0 - 2 - (-6) - 0 - 2 = -1$$

$$|A_4| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{(D4)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{+2 \cdot r_2, -2 \cdot r_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} =$$

D5 - rozvoj podle 2. sloupce

$$= (-1)^{1+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} + 0 + 0 =$$

$$= - \begin{vmatrix} 0 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} = -0 - 9 + 0 + 0 - (-30) - 0 - 0 = 21$$

minimální počet odpovídá:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-24}{-9} = \underline{\underline{\frac{8}{3}}}$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{+14}{+9}$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{+1}{+9}$$

$$x_4 = \frac{|A_4|}{|A|} = \frac{21}{-9} = \underline{\underline{-\frac{7}{3}}}$$

a vektorovým zápisem:  
 řešení je jedinečné

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/3 \\ 14/9 \\ 1/9 \\ -7/3 \end{pmatrix}$$

Vlastnost D6 pokud některý řádek, např.  $l$ -tý, je lineárních kombinací  $k$  jiných řádků, např.  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ ,  
 pak  $|A| = 0$  [ důkaz: rolemi podobný důkazem D4:  $\vec{a}_l = \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_k \vec{a}_k$  ] pak

$$\det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k, \dots, \alpha_1 \vec{a}_1 + \alpha_2 \vec{a}_2 + \dots + \alpha_k \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m) =$$

$$= \alpha_1 \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_1, \dots, \vec{a}_m) + \alpha_2 \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m) + \dots +$$

$$+ \alpha_k \det(\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_k, \dots, \vec{a}_m) = 0,$$

protože každý z těchto determinantů se rovná 0 díky dvojnásobným řádkům  
 (D2 důsledek) ]

Př. 4 otočte, i.e. a)

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 44, \quad b) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6$$