

MA0005 Algebra 2, 10. seminář

7. 12. 2021

1 Lineární zobrazení mezi vektorovými prostory

- Reprezentace lineárního zobrazení
- Jádro a obor hodnot lineárního zobrazení

- Horák, P.: *Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I.* 2. vydání. Masarykova univerzita v Brně, 2002. ISBN 80-210-1853-4.
- Isibalo.com: *Matematika – Lineární algebra*. Dostupné z:
<https://isibalo.com/matematika/linearni-algebra>.
- Čadek, M.: Sbírka úloh z lineární algebry. 2002. Dostupné z:
<http://www.math.muni.cz/~cadek/LA/sbirka.pdf>.
- Sobotíková, V. Řešené úlohy z Úvodu do algebry. Dostupné z:
<http://www.vrstevnice.com/akce/grandaction/vskola/1semestr/lingebra/resPriklady.pdf>.

Lineární zobrazení mezi vektorovými prostory

Jsou dány dva vektorové prostory $(V, +, \cdot)$ dimenze $n \in \mathbb{N}$ a $(V', +, \cdot)$ dimenze $m \in \mathbb{N}$ nad číselným tělesem $(T, +, \cdot)$. Lineárním zobrazením mezi prostory V, V' rozumíme zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ splňující tyto dvě podmínky:

- 1** $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}),$
- 2** $\varphi(\alpha \cdot \vec{u}) = \alpha \cdot \varphi(\vec{u})$

pro $\vec{u}, \vec{v} \in V, \alpha \in T$.

Lineární zobrazení mezi vektorovými prostory

Lineární zobrazení mezi vektorovými prostory

Jsou dány dva vektorové prostory $(V, +, \cdot)$ dimenze $n \in \mathbb{N}$ a $(V', +, \cdot)$ dimenze $m \in \mathbb{N}$ nad číselným tělesem $(T, +, \cdot)$. Lineárním zobrazením mezi prostory V, V' rozumíme zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ splňující tyto dvě podmínky:

- 1 $\varphi(\vec{u} + \vec{v}) = \varphi(\vec{u}) + \varphi(\vec{v}),$
- 2 $\varphi(\alpha \cdot \vec{u}) = \alpha \cdot \varphi(\vec{u})$

pro $\vec{u}, \vec{v} \in V, \alpha \in T$.

Poznámka: Lineární zobrazení lze zadat třemi způsoby:

- pomocí předpisu mezi souřadnicemi vektoru $\vec{u} \in V$ a $\varphi(\vec{u}) \in V'$,
- pomocí matice A typu $m \times n$, tj. $\varphi(\vec{u}) = A \cdot \vec{u},$
- pomocí obrazů $\varphi(\vec{e}_1), \varphi(\vec{e}_2), \dots, \varphi(\vec{e}_n)$ bázových vektorů prostoru V .

Reprezentace lineárního zobrazení

Příklad 1

Lineární zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ je zadáno předpisem pro vektor $\vec{x} \in V$.

- Najděte matici A zobrazení φ a obrazy standardní báze prostoru V .
- Najděte $\varphi(\vec{u}), \varphi(\vec{v})$.

- 1 $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_2, x_2 - x_1), \vec{u} = (2, 3), \vec{v} = (-2, 1).$
- 2 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4, \varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1, x_1),$
 $\vec{u} = (4, -1, 0), \vec{v} = (-3, 0, 5).$
- 3 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3),$
 $\vec{u} = (0, 2, -3), \vec{v} = (-1, 1, 2).$

Výsledky příkladu 1

$$1. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\varphi(1, 0) &= (2, 0, -1), \varphi(0, 1) = (1, 1, 1), \\ \varphi(2, 3) &= (7, 3, 1), \varphi(-2, 1) = (-3, 1, 3).\end{aligned}$$

$$2. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\varphi(1, 0, 0) &= (1, 0, 1, 1), \varphi(0, 1, 0) = (1, 1, 0, 0), \varphi(0, 0, 1) = (0, 1, 1, 0), \\ \varphi(4, -1, 0) &= (3, -1, 4, 4), \varphi(-3, 0, 5) = (-3, 5, 2, -3).\end{aligned}$$

$$3. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\varphi(1, 0, 0) &= (1, 0), \varphi(0, 1, 0) = (1, 1), \varphi(0, 0, 1) = (0, 1), \\ \varphi(0, 2, -3) &= (2, -1), \varphi(-1, 1, 2) = (0, 3).\end{aligned}$$

Reprezentace lineárního zobrazení

Příklad 2

Lineární zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ je zadáno obrazy bázových vektorů V .

- Najděte matici A zobrazení φ .
- Najděte $\varphi(\vec{u}), \varphi(\vec{v})$.

1 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$

$$\varphi(1, 0, 2) = (1, 3), \varphi(-3, 4, -2) = (2, -1), \varphi(0, 2, 1) = (-3, 5),$$
$$\vec{u} = (1, 4, 2), \vec{v} = (-1, 0, 4).$$

2 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2,$

$$\varphi(1, 2, -3) = (-2, 1), \varphi(2, 1, -2) = (1, 1), \varphi(1, -4, 5) = (8, -1),$$
$$\vec{u} = (3, 6, -1), \vec{v} = (0, 3, 2).$$

3 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4,$

$$\varphi(1, 0, 1) = (1, 0, 1, 0), \varphi(1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0), \varphi(0, 1, 1) = (0, 1, 0, 1),$$
$$\vec{u} = (2, 4, 6), \vec{v} = (-4, 0, 2).$$

Výsledky příkladu 2

$$1. A = \begin{pmatrix} -10 & -\frac{17}{4} & \frac{11}{2} \\ 5 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$\varphi(1, 4, 2) = (-16, 15), \varphi(-1, 0, 4) = (32, -9).$$

2. zadané vektory netvoří bázi prostoru $V = \mathbb{R}^3$.

$$3. A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\varphi(2, 4, 6) = (2, 4, 2, 4), \varphi(-4, 0, 2) = (-1, 3, -1, 3).$$

Příklad 3

Je dána přímka p a rovina ϱ :

$$p = \{[1+t, 2-t, 1-t]; t \in \mathbb{R}\}$$

$$\varrho : 2x - 3y + z + 1 = 0$$

Zjistěte, na jakou množinu bodů se přímka p a rovina ϱ zobrazí pomocí lineárního zobrazení:

- $\varphi_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, které je zadáno maticí

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

- $\varphi_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, které je zadáno maticí

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Výsledky příkladu 3

1. $\varphi_1(p) = \{[8, 3 - t, 2 + 2t]; t \in \mathbb{R}\}$

$\varphi_1(\varrho) : x - 2y - z = 0$

2. $\varphi_2(p) = \{[4 + t, 3 - 2t, 2 + t]; t \in \mathbb{R}\}$

$\varphi_2(\varrho) : 8x - 7y - 10z + 3 = 0$

Jádro a obor hodnot lineárního zobrazení

Je dáno lineární zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ mezi vektorovými prostory V (dimenze n) a V' (dimenze m).

- 1 Jádrem $\text{Ker } \varphi$ zobrazení φ rozumíme množinu vektorů $\vec{u} \in V$, které se zobrazí na nulový vektor, tj.

$$\text{Ker } \varphi = \{\vec{u} \in V \mid \varphi(\vec{u}) = \vec{o}_{V'}\}.$$

- 2 Oborem hodnot $\text{Im } \varphi$ zobrazení φ rozumíme množinu vektorů $\vec{v} \in V'$, pro které existuje nějaký vzor, tj.

$$\text{Im } \varphi = \{\vec{v} \in V' \mid \exists \vec{u} \in V : \varphi(\vec{u}) = \vec{v}\}.$$

Jádro a obor hodnot lineárního zobrazení

Je dáno lineární zobrazení $\varphi : V \rightarrow V'$ mezi vektorovými prostory V (dimenze n) a V' (dimenze m).

1 Jadrem $\text{Ker } \varphi$ zobrazení φ rozumíme množinu vektorů $\vec{u} \in V$, které se zobrazí na nulový vektor, tj.

$$\text{Ker } \varphi = \{\vec{u} \in V \mid \varphi(\vec{u}) = \vec{o}_{V'}\}.$$

2 Oborem hodnot $\text{Im } \varphi$ zobrazení φ rozumíme množinu vektorů $\vec{v} \in V'$, pro které existuje nějaký vzor, tj.

$$\text{Im } \varphi = \{\vec{v} \in V' \mid \exists \vec{u} \in V : \varphi(\vec{u}) = \vec{v}\}.$$

Poznámka:

- $\text{Ker } \varphi$ a $\text{Im } \varphi$ jsou vektorové podprostory.
- $\dim(\text{Ker } \varphi) = n - h(A) = \dim V - h(A)$, kde A je matice lineárního zobrazení φ .
- $\dim(\text{Im } \varphi) = h(A)$.
- $\dim V = \dim(\text{Ker } \varphi) + \dim(\text{Im } \varphi)$.

Příklad 4

Nalezněte jádro a obor hodnot lineárního zobrazení φ a určete jejich dimenze.

- 1 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1, x_1)$
- 2 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3)$
- 3 $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\varphi(1, 2, 1) = (-1, 1, 1, 1)$,
 $\varphi(0, 1, 2) = (1, 0, 0, 1)$, $\varphi(1, 0, -1) = (0, 1, 1, 2)$.
- 4 $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, φ je dáno maticí

$$A_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 1 \\ -3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Výsledky příkladu 4

- 1 $\dim(\text{Ker } \varphi) = 0, \text{Ker } \varphi = \{(0, 0, 0)\},$
 $\dim(\text{Im } \varphi) = 3, \text{Im } \varphi = \langle\{(1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\}\rangle.$
- 2 $\dim(\text{Ker } \varphi) = 1, \text{Ker } \varphi = \langle\{(1, -1, 1)\}\rangle,$
 $\dim(\text{Im } \varphi) = 2, \text{Im } \varphi = \langle\{(1, 0), (0, 1)\}\rangle.$
- 3 $\dim(\text{Ker } \varphi) = 1, \text{Ker } \varphi = \langle\{(0, 3, 4)\}\rangle,$
 $\dim(\text{Im } \varphi) = 2, \text{Im } \varphi = \langle\{(-1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 1)\}\rangle.$
- 4 $\dim(\text{Ker } \varphi) = 2, \text{Ker } \varphi = \langle\{(-3, -2, 1, 0), (-1, -1, 0, 1)\}\rangle,$
 $\dim(\text{Im } \varphi) = 2, \text{Im } \varphi = \langle\{(1, 2, -3), (0, -1, 5)\}\rangle.$

Příklady z minulých písemek

Úloha 10.6. Pro lineární zobrazení $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ je

$$\text{Ker } \psi = ((2; 2; 1)^T, (1; 0; 1)^T), \quad \text{Im } \psi = ((1; 0; 1; 1)^T).$$

Sestrojte matici zobrazení ψ .

Úloha 10.8. Pro lineární zobrazení $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ je

$$\text{Ker } \psi = ((2; 0; 2; 1)^T, (0; 1; -1; 1)^T), \quad \text{Im } \psi = ((1; 0; 1)^T, (1; 1; 0)^T).$$

Sestrojte matici zobrazení ψ .