

## Opakování (předmět IMAk02)

### Kartézský součin, binární relace

- **Kartézským součinem** dvou množin  $A, B$  rozumíme množinu  $A \times B = \{[x,y]; x \in A \wedge y \in B\}$ , tj. množinu všech uspořádaných dvojic  $[x,y]$ , kde  $x \in A$  a  $y \in B$ .
- **Binární relací  $R$  z množiny  $A$  do množiny  $B$**  rozumíme libovolnou podmnožinu kartézského součinu  $A \times B$ .
- **Binární relací  $R$  v neprázdné množině  $A$**  rozumíme libovolnou podmnožinu kartézského součinu  $A \times A$ .

*Příklad 1.* Na množině  $A = \{0,1,2,3,4\}$  jsou definovány binární relace  $R, S, T, U, V$ . Zapište je výčtem prvků:

$$R = \{[x,y] \in A \times A; x > y\}$$

$$S = \{[x,y] \in A \times A; x + y = 5\}$$

$$U = \{[x,y] \in A \times A; x = y\}$$

$$V = \{[x,y] \in A \times A; x = y \vee x = 2 \cdot y\}$$

- Necht' v  $A$  je definována relace  $R$ : Relaci  $R'$  v množině  $M$  definovanou předpisem  $R' = (A \times A) - R$  nazýváme **doplňkovou relací** k relaci  $R$  v množině  $A$ .
- Necht' v  $A$  je definována relace  $R$ : Relaci  $R^{-1} = \{[x,y] \in A \times A; [y,x] \in R\}$  nazýváme **relací inverzní** k relaci  $R$  v množině  $A$ .

### Vlastnosti binárních relací v množině $A$

Binární relace  $R$  v množině  $A$  je

- **reflexivní** právě tehdy, když  $(\forall x \in A) ([x,x] \in R)$ ,  
(obsahuje všechny uspořádané dvojice  $[x,x]$ , kde  $x \in A$ , tj. v uzlovém grafu je každý uzel opatřen smyčkou)
- **antireflexivní** právě tehdy, když  $(\forall x \in A) ([x,x] \notin R)$ ,  
(neobsahuje žádnou uspořádanou dvojici typu  $[x,x]$ , kde  $x \in A$ , tj. v uzlovém grafu není žádný uzel opatřen smyčkou)
- **symetrická** právě tehdy, když  $(\forall x,y \in A) ([x,y] \in R \Rightarrow [y,x] \in R)$ ,  
(s každou uspořádanou dvojicí  $[x,y]$  obsahuje i dvojici  $[y,x]$ , tj. v uzlovém grafu jsou mezi dvěma uzly buď dvě šipky nebo žádná)
- **antisymetrická**, právě tehdy, když  $(\forall x,y \in A) [(x \neq y \wedge [x,y] \in R) \Rightarrow [y,x] \notin R]$ ,  
(s žádnou dvojicí  $[x,y]$  různých prvků neobsahuje dvojici  $[y,x]$ , tj. v uzlovém grafu je mezi dvěma různými uzly buď jedna šipka nebo žádná)
- **tranzitivní** právě tehdy, když  $(\forall x,y,z \in A) ([x,y] \in R \wedge [y,z] \in R) \Rightarrow [x,z] \in R$ ,

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

(jestliže se v relaci vyskytnou „na sebe navazující dvojice“, pak musí relace obsahovat i dvojici, jejíž první složkou je 1. složka z první dvojice a druhou složkou je 2. složka z druhé dvojice).

- **souvislá** právě tehdy, když  $(\forall x, y \in A) [x \neq y \Rightarrow ([x, y] \in R \vee [y, x] \in R)]$ , (každé dva různé prvky z množiny A musí být „spolu v relaci“, tj. v uzlovém grafu jsou dva různé uzly spojeny alespoň jednou šipkou)

Binární relaci U v množině A nazýváme **uspořádání** v A, právě když U je **antisymetrická a tranzitivní**.

Binární relaci U v množině A nazýváme **uspořádání**

- **ostré** právě tehdy, když U je **antisymetrická, tranzitivní a antireflexivní**,
- **neostré** právě tehdy, když U je **antisymetrická, tranzitivní a reflexivní**.
- **lineární** právě tehdy, když U je **antisymetrická, tranzitivní a souvislá**.

Binární relaci R v množině M nazýváme **relací ekvivalence** na M, právě když je **reflexivní, symetrická a tranzitivní**.

Každá relace ekvivalence na množině M vytváří **rozklad** této množiny, což je systém neprázdných podmnožin (tzv. tříd rozkladu) množiny M takových, že průnik každých dvou tříd je prázdná množina a sjednocení všech tříd rozkladu tvoří množinu M.

Jinak lze také říci, že říci, že **rozklad** množiny M je systém neprázdných podmnožin (tzv. tříd rozkladu) množiny M takových, že každý prvek množiny M patří právě do jedné z těchto tříd.

*Příklad 2.* V množině  $M = \{1, 2, 3\}$  je definována binární relace

- $R_1 = \{[x, y] \in M \times M; x < 3 \Rightarrow x + y = 3\}$ ,
- $R_2 = \{[x, y] \in M \times M; x = y \Rightarrow x = y\}$ ,
- $R_3 = \{[x, y] \in M \times M; x = y \Rightarrow x + y = 3\}$ ,
- $R_4 = \{[x, y] \in M \times M; x < y \Leftrightarrow x = y\}$ ,
- $R_5 = \{[x, y] \in M \times M; x = 2 \vee y > x + 2\}$ ,
- $R_6 = \{[x, y] \in M \times M; x < y \wedge x | y\}$ .

Zapište tyto relace výčtem prvků, určete jejich kartézské a uzlové grafy, určete jejich vlastnosti.

## Zobrazení z množiny do množiny, typy zobrazení

- Necht' **R** je relace z množiny A do množiny B splňující vlastnosti: Ke každému prvku  $a \in A$  existuje nejvýše jeden prvek  $b \in B$  takový, že  $[a, b] \in R$ . Tato relace se nazývá **zobrazení z množiny A do množiny B**. Značíme  $R: A \rightarrow B$ .

Necht' **R** je zobrazení z množiny A do množiny B.

## IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

- Jestliže  $[a,b] \in \mathbf{R}$ , pak prvek  $a \in A$  nazýváme **vzorem** prvku  $b \in B$  v zobrazení  $\mathbf{R}$ ; prvek  $b \in B$  nazýváme **obrazem** prvku  $a \in A$  v zobrazení  $\mathbf{R}$ .
- Množina  $O_1(\mathbf{R}) = \{a \in A : \text{existuje } b \in B \text{ takové, že } [a,b] \in \mathbf{R}\}$  se nazývá **definiční obor** zobrazení  $\mathbf{R}$ . Platí  $O_1(\mathbf{R}) \subset A$ .
- Množina  $O_2(\mathbf{R}) = \{b \in B : \text{existuje } a \in A \text{ takové, že } [a,b] \in \mathbf{R}\}$  se nazývá **obor hodnot** zobrazení  $\mathbf{R}$ .  $O_2(\mathbf{R}) \subset B$ .

*Příklad 3.* Jsou dány množiny  $A = \{x, y, z\}$ ,  $B = \{a, b\}$ . Rozhodněte, zda dané relace z množiny  $A$  do množiny  $B$  jsou zobrazení z  $A$  do  $B$ , případně určete definiční obor a obor hodnot zobrazení.

- $\mathbf{R}_1 = \{[x,a], [y,b], [z,a], [z,b]\}$ ,
- $\mathbf{R}_2 = \{[x,a], [z,b]\}$ ,
- $\mathbf{R}_3 = \{[x,a], [y,a], [z,a]\}$ .

Rozlišujeme následující typy zobrazení  $\mathbf{R}$ :

I) Je-li  $O_1(\mathbf{R}) = A \wedge O_2(\mathbf{R}) \subset B \wedge O_2(\mathbf{R}) \neq B$ , nazývá se  $\mathbf{R}$  **zobrazení množiny A do množiny B**.

II) Je-li  $O_1(\mathbf{R}) \subset A \wedge O_1(\mathbf{R}) \neq A \wedge O_2(\mathbf{R}) = B$ , nazývá se  $\mathbf{R}$  **zobrazení z množiny A na množinu B**.

III) Je-li  $O_1(\mathbf{R}) = A \wedge O_2(\mathbf{R}) = B$ , nazývá se  $\mathbf{R}$  **zobrazení množiny A na množinu B**.

IV) Je-li  $O_1(\mathbf{R}) \subset A \wedge O_1(\mathbf{R}) \neq A \wedge O_2(\mathbf{R}) \subset B \wedge O_2(\mathbf{R}) \neq B$ , nazývá se  $\mathbf{R}$  **zobrazení z množiny A do množiny B**.

- Zobrazení  $\mathbf{R}$  z množiny  $A$  do množiny  $B$  se nazývá **prosté** právě tehdy, když relace  $\mathbf{R}^{-1}$  je zobrazení z množiny  $B$  do množiny  $A$ .
- Prosté zobrazení množiny  $A$  na množinu  $B$  nazýváme **bijektivní zobrazení** nebo také **vzájemně jednoznačné zobrazení**.

*Příklad 4.* Jsou dány množiny  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$ . Rozhodněte, o jaký typ zobrazení se jedná a zda je toto zobrazení prosté:

- $\mathbf{R}_1 = \{[1,a], [2,c], [3,d]\}$ ,
- $\mathbf{R}_2 = \{[1,a], [2,c], [3,d], [4,a]\}$ ,
- $\mathbf{R}_3 = \{[2,a], [1,c], [3,b], [4,d]\}$ .

## Ekvivalence množin, konečné a nekonečné množiny

- Říkáme, že dvě množiny  $A, B$  jsou **ekvivalentní** právě tehdy, když existuje prosté zobrazení množiny  $A$  na množinu  $B$ . Zapisujeme  $A \sim B$ .

## IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

*Příklad 5.* Jsou dány množiny  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{x, y, z\}$ ,  $C = \{x, y\}$ . Rozhodněte, které dvojice zadaných množin jsou ekvivalentní.

*Poznámka.* Relace  $\sim$  dvou množin definovaná v libovolném systému množin  $\mathcal{M}$  má vlastnosti: reflexivní, symetrická, tranzitivní. Relace  $\sim$  je tedy relací ekvivalence. Relace ekvivalence dvou množin v libovolném systému množin  $\mathcal{M}$  vytváří rozklad systému  $\mathcal{M}$  na třídy ekvivalentních množin.

*Příklad 6.* Je dán systém množin  $\mathcal{M} = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$ , kde  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $C = \{x, y\}$ ,  $D = \{\circ, \circ, \circ, \circ\}$ ,  $E = \{\Delta, \Delta, \Delta\}$ ,  $F = \{*, *\}$ ,  $G = \{\square\}$ ,  $H = \{\odot, \odot, \odot, \odot\}$ . Rozhodněte, které množiny ze systému  $\mathcal{M}$  jsou ekvivalentní.

- Množina A je **konečná** právě tehdy, když žádná vlastní podmnožina množiny A není ekvivalentní s množinou A.
- Množina B je **nekonečná** právě tehdy, když existuje alespoň jedna vlastní podmnožina množiny B, která je ekvivalentní s množinou B.

*Poznámka.* Množina M je **vlastní podmnožinou** množiny N právě tehdy, když  $M \subset N \wedge M \neq N$ .

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

## Binární operace v množině (nová látka)

- Necht'  $M$  je libovolná neprázdná množina. **Binární operací**  $\circ$  v množině  $M$  rozumíme zobrazení z množiny kartézského součinu  $M \times M$  do množiny  $M$ .
- Jestliže v binární operaci je vzoru  $[x,y] \in M \times M$  přiřazen obraz  $z \in M$ , píšeme:  
 $x \circ y = z$ ; prvek  $z \in M$  se nazývá **výsledek operace**  $\circ$ .

*Poznámka.* Označení binárních operací:  $+$ ,  $*$ ,  $\circ$ ,  $\cdot$ ,  $\square$ , ..

Příklady binárních operací ve školské matematice:

- 1) Sčítání ( $+$ ), odčítání ( $-$ ), násobení ( $*$ ), dělení ( $:$ ), umocňování, ... (pracujeme s nimi v číselných množinách).
- 2) Sjednocení ( $\cup$ ), průnik ( $\cap$ ), rozdíl ( $-$ ), symetrický rozdíl ( $\Delta$ ) množin, ... (pracujeme s nimi v systémech množin).

## Vlastnosti binárních operací:

Označení:

- $\mathbb{N}$  -  $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$  - množina všech přirozených čísel
- $\mathbb{N}_0$  -  $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$  - množina všech přirozených čísel s nulou (množina všech nezáporných celých čísel)
- $\mathbb{Z}$  -  $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$  - množina všech celých čísel
- $\mathbb{Q}$  - množina všech racionálních čísel (zlomky)
- $\mathbb{R}$  - množina všech reálných čísel

- 
- Binární operace  $\circ$  v množině  $M$ , která má vlastnost, že je definována pro každou uspořádanou dvojici  $[x,y] \in M \times M$ , se nazývá operace **neomezeně definovaná** v množině  $M$  (zkráceně operace **definovaná na množině  $M$** ). Značíme **ND**.

$$\text{Symbolicky: } (\forall x, y \in M)(\exists z \in M)[x \circ y = z].$$

- 
- Binární operace  $\circ$  definovaná na množině  $M$  (je ND), se nazývá **komutativní** právě tehdy, když platí:

$$(\forall x, y \in M)[x \circ y = y \circ x].$$

Značíme **K**.

- 
- Binární operace  $\circ$  definovaná na množině  $M$ , se nazývá **asociativní** právě tehdy, když platí:

$$(\forall x, y, z \in M)[(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)].$$

Značíme **A**.

- 
- Necht' v množině  $M$  je definována binární operace  $\circ$ . Existuje-li prvek  $e \in M$ , pro který platí:

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

$$(\forall x \in M)[x \circ e = e \circ x = x].$$

Pak se prvek  $e \in M$  nazývá **neutrálním prvkem** množiny  $M$  vzhledem k operaci  $\circ$ .  
Značíme **EN**.

- 
- Necht' v množině  $M$  je definována binární operace  $\circ$  a necht'  $e$  je neutrální prvek množiny  $M$  vzhledem k operaci  $\circ$ . Prvek  $\bar{a} \in M$  nazýváme **inverzním prvkem** k prvku  $a \in M$  v operaci  $\circ$  v množině  $M$  právě tehdy, když platí:

$$\bar{a} \circ a = a \circ \bar{a} = e.$$

Jestliže  $(\forall a \in M)(\exists \bar{a} \in M)[\bar{a} \circ a = a \circ \bar{a} = e]$ , řekneme, že ke každému prvku množiny  $M$  existuje prvek inverzní vzhledem k operaci  $\circ$ . Značíme **EI**.

- 
- Říkáme, že binární operace  $\circ$  definovaná na množině  $M$  má vlastnost **řešitelnost základních rovnic** právě tehdy, když platí:

$$(\forall a, b \in M)(\exists x, y \in M)[a \circ x = b \wedge y \circ a = b].$$

Značíme **ZR**.

## Algebraické struktury s jednou operací

- Uspořádaná dvojice  $(M, \circ)$ , kde  $M$  je neprázdná množina, ve které je definována binární operace  $\circ$ , se nazývá **algebraická struktura s jednou operací**.
- I. Algebraická struktura  $(M, \circ)$  se nazývá **grupoid** právě tehdy, když operace  $\circ$  je neomezeně definovaná v množině  $M$  (ND).
- II. Grupoid  $(M, \circ)$ , jehož operace  $\circ$  je asociativní, se nazývá **podgrupa** (ND, A).
- III. Pologrupa  $(M, \circ)$  taková, že v  $M$  existuje neutrální prvek vzhledem k operaci  $(M, \circ)$  a ke každému prvku  $a \in M$  existuje prvek inverzní  $\bar{a} \in M$ , se nazývá **grupa** (ND, A, EN, EI).

*Poznámka 6.* Jestliže v případech I., II., III. je operace  $\circ$  komutativní, pak hovoříme o

- I. Komutativním grupoidu
- II. Komutativní pologrupě
- III. Komutativní grupě

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

Schéma k Algebraickým strukturám s jednou operací:

	Vlastnost operace $\circ$	Algebraická struktura
(M, $\circ$ )	ND	Grupoid
	ND $\wedge$ K	Komutativní grupoid
	ND $\wedge$ A	Pologrupa
	ND $\wedge$ A $\wedge$ K	Komutativní pologrupa
	ND $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI	Grupa
	ND $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI $\wedge$ K	Komutativní grupa

## Určení vlastností binárních operací podle tvaru operační tabulky

Uvažujme binární operaci  $\circ$  v množině M zapsané pomocí operační tabulky, viz příklad:

*Příklad 1:* Je dána množina  $M = \{a, b, c\}$  a operace  $\circ$  v množině M daná tabulkou. Určete vlastnosti operace  $\circ$ . Pokud existuje neutrální nebo agresivní prvek, určete je. K jednotlivým prvkům stanovte prvky inverzní, pokud existují.

$\circ$	a	b	c
a	b	c	a
b	c	c	b
c	a	b	c

Vysvětlivky k tabulce:  $a \circ a = b$

$b \circ c = b$

$c \circ a = a$

Řešení: ND  $\wedge$  K  $\wedge$  ~~A~~  $\wedge$  EN  $\wedge$  EI  $\wedge$  ~~ZR~~

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

Pravidla pro určování vlastností operace v množině dané tabulkou:

**ND:** Tabulka je celá vyplněná prvky množiny  $M$

**K:** Prvky tabulky, která je celá vyplněná prvky množiny  $M$ , jsou souměrně rozloženy podle hlavní diagonály

**A:** Z tabulky obvykle nepoznáme - určujeme z definice nebo ze vztahu  $\mathbf{A} \Rightarrow (\mathbf{ZR} \Leftrightarrow \mathbf{EI})$

**EN:** Alespoň jeden řádek a jeden sloupec jsou stejné jako záhlaví tabulky

**EI:** Každý řádek i sloupec tabulky obsahuje neutrální prvky tak, že ve všech řádcích a sloupcích existují takové, že jsou souměrně rozloženy podle hlavní diagonály.

**ZR:** Každý řádek i sloupec obsahuje všechny prvky množiny  $M$

**Agresivní prvek**  $g \in M$  poznáme tak, že v celém jemu příslušejícím řádku i sloupci se vyskytuje pouze prvek  $g$ .

## Problém asociativity operace $\circ$

Vydeme ze vztahu  $\mathbf{A} \Rightarrow (\mathbf{ZR} \Leftrightarrow \mathbf{EI})$ :

1. Pokud nastane situace, že  $\mathbf{EI} \wedge \mathbf{ZR}$  nebo  $\mathbf{EI} \wedge \mathbf{ZR}$ , pak platí, že operace  $\circ$  není asociativní, tj.  $\mathbf{A}$
2. Pokud nastane situace, že  $\mathbf{EI} \wedge \mathbf{ZR}$  nebo  $\mathbf{EI} \wedge \mathbf{ZR}$ , pak asociativitu operace  $\circ$  nelze určit přímo, ale je potřeba využít *Definici 4* ověřením všech možných trojic prvků z dané množiny (zdlouhavé)

*Příklad 2:* Je dána množina  $M = \{a, b, c\}$  a operace  $\circ$  v množině  $M$  daná tabulkou. Určete vlastnosti operace  $\circ$ . Pokud existuje neutrální nebo agresivní prvek, určete je. K jednotlivým prvkům stanovte prvky inverzní, pokud existují. Určete typ algebraické struktury  $(M, \circ)$ .

1.

$\circ$	a	b	c
a	b	a	c
b	c	b	a
c	a	c	b

2.

$\circ$	a	b	c
a	c	a	a
b	a	c	b
c	a	b	c



# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

3.

○	a	b	c
a	c	a	a
b		c	b
c	a	b	c

## Algebraické struktury se dvěma operacemi

- Na množině  $M$  jsou definovány dvě binární operace  $\oplus$  a  $\odot$ . Operace  $\odot$  je **distributivní vzhledem k operaci  $\oplus$**  právě tehdy, když platí  
 $(\forall x, y, z \in M)[(x \oplus y) \odot z = (x \odot z) \oplus (y \odot z)]$  ... pravý distributivní zákon (PDZ)  
 $[z \odot (x \oplus y)] = (z \odot x) \oplus (z \odot y)$  ... levý distributivní zákon (LDZ).

Značíme  $\odot \text{ D } \oplus$ .

Nechť  $M$  je neprázdná množina, ve které jsou definovány dvě operace  $\oplus$  a  $\odot$ .

- Algebraická struktura  $(M, \oplus, \odot)$  se nazývá **polookruh** právě tehdy, když:
  - Operace  $\oplus$  je  $\text{ND} \wedge \text{A} \wedge \text{K}$
  - Operace  $\odot$  je  $\text{ND} \wedge \text{A}$
  - Platí  $\odot \text{ D } \oplus$
- Je-li operace  $\oplus$  navíc  $\text{K}$ , pak polookruh  $(M, \oplus, \odot)$  nazýváme **komutativní polookruh**.
- Pologrupu  $(M, \oplus)$  nazýváme **aditivní pologrupa**.
- Pologrupu  $(M, \odot)$  nazýváme **multiplikativní pologrupa**.
- Polookruh  $(M, \oplus, \odot)$ , jehož aditivní pologrupa  $(M, \oplus)$  je komutativní grupou, se nazývá **okruh**.
- Je-li operace  $\odot$  navíc  $\text{K}$ , pak okruh  $(M, \oplus, \odot)$ , nazýváme **komutativní okruh**.
- Nechť  $(M, \oplus, \odot)$  je okruh. Prvky  $a \neq 0, b \neq 0, a, b \in M$ , pro které platí  $a \odot b = 0$ , se nazývají **dělitelé nuly** okruhu  $(M, \oplus, \odot)$ .
- Komutativní okruh  $(M, \oplus, \odot)$ , ve kterém neexistují dělitelé nuly, se nazývá **obor integrity**.
- Okruh  $(M, \oplus, \odot)$ , pro který platí, že  $(M - \{0\}, \odot)$  je grupa, se nazývá **těleso**.
- Je-li operace  $\cdot$  navíc  $\text{K}$ , pak těleso  $(M, \oplus, \odot)$  nazýváme **komutativní těleso**.

*Poznámka:* Uvažujeme polookruh  $(M, \oplus, \odot)$ :

- Operace  $\oplus$  se nazývá **sčítání**. V zápise

$$a \oplus b = c$$

nazýváme prvky  $a, b$  **sčítanci**, prvek  $c$  nazýváme **součet** prvků  $a, b$ .

Neutrální prvek nazýváme **nulový prvek**, značíme  $0$ . Pokud k prvku  $a$  existuje prvek inverzní, nazýváme jej **opačný prvek** k prvku  $a$ , značíme  $-a$ . Existuje-li prvek  $x$ , pro který platí

## IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

$b \oplus x = a$ , nazýváme jej **rozdíl** prvků  $a, b$  a zapisujeme

$$x = a \ominus b.$$

V tomto zápise prvek  $a$  nazýváme **menšeneč**, prvek  $b$  nazýváme **menšitel**. Pokud existuje prvek  $\ominus b$ , pak platí  $x = a \ominus b = a \oplus (\ominus b)$ . Operace  $\ominus$  se nazývá **odčítání**.

- Operace  $\odot$  se nazývá **násobení**. V zápise

$$a \odot b = c$$

nazýváme prvek  $a$ , resp.  $b$  **1. činitel**, resp. **2. činitel**, prvek  $c$  nazýváme **součin** prvků  $a, b$ . Neutrální prvek nazýváme **jednotkový prvek**, značíme 1. Pokud k prvku  $a$  existuje prvek inverzní, nazýváme jej **převrácený prvek** k prvku  $a$ , značíme  $\frac{1}{a}$  nebo též  $a^{-1}$ . Existuje-li pro prvky  $a, b \neq 0$  prvek  $x$ , pro který platí  $b \odot x = a$ , nazýváme jej **podíl** prvků  $a, b$  a zapisujeme

$$x = a \oslash b \text{ nebo taky } x = \frac{a}{b}.$$

V tomto zápise prvek  $a$  nazýváme **dělenec (čítatel)**, prvek  $b$  nazýváme **menšitel (jmenovatel)**. Pokud existuje prvek  $\frac{1}{b}$ , resp.  $b^{-1}$ , pak platí

$$x = a \oslash b = \frac{a}{b} = a \odot \frac{1}{b} = a \odot b^{-1}. \text{ Operace } \oslash \text{ se nazývá } \mathbf{d\acute{e}lení}.$$

Podíl prvků pro  $b = 0$  nedefinujeme, neboť:

- v případě, že  $a = 0$ , je řešením rovnice  $0 \odot x = 0$  každý prvek množiny  $M$ .
- v případě, že  $a \neq 0$ , rovnice  $0 \odot x = a$  nemá řešení v množině  $M$ .

Případ 1. vede k tomu, že by dělení nebylo operací!

# IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

Schéma k Algebraickým strukturám se dvěma operacemi:

	operace a vlastnosti	algebraická struktura
(M, $\oplus$ , $\odot$ )	$\oplus$ ND $\wedge$ K $\wedge$ A	<b>Polookruh (komutativní)</b>
	$\odot$ ND $\wedge$ (K) $\wedge$ A	
	$\odot$ D $\oplus$	
	$\oplus$ ND $\wedge$ K $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI	<b>Okruh (komutativní)</b>
	$\odot$ ND $\wedge$ (K) $\wedge$ A	
	$\odot$ D $\oplus$	
	$\oplus$ ND $\wedge$ K $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI	<b>Komutativní okruh bez dělitelů nuly = Obor integrity</b>
	$\odot$ ND $\wedge$ K $\wedge$ A	
	$\odot$ D $\oplus$	
	Neexistují $a \neq 0, b \neq 0, a, b \in M$ , pro které platí $a \odot b = 0$ .	
	$\oplus$ ND $\wedge$ K $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI	<b>Těleso (komutativní)</b>
	$\odot$ ND $\wedge$ (K) $\wedge$ A	
$\odot$ D $\oplus$		
(M - {0}, $\odot$ ) je grupa, tj. na množině M - {0} je operace		
$\odot$ ND $\wedge$ A $\wedge$ EN $\wedge$ EI		

## Příklady algebraických struktur číselných množin se dvěma operacemi

*Příklad:* Uvažujme binární operace obyčejné sčítání  $+$  a obyčejné násobení  $\cdot$  v číselných množinách:

1.  $(\mathbb{N}, +, \cdot)$  **komutativní polookruh s jednotkovým prvkem**

$$+ \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$\cdot \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 1$$

$$\cdot \text{ D } +$$

-----

## IMAk13 Aritmetika 1 (podzim 2022)

Mgr. Jitka Panáčková, Ph.D.

2.  $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$  **komutativní polookruh s nulovým ( $e = 0$ ) a jednotkovým prvkem ( $e = 1$ )**

$$+ \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 0$$

$$\cdot \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 1$$

$$\cdot D +$$

---

3.  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  **komutativní okruh bez dělitelů nuly = obor integrity**

$$+ \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 0$$

$$\cdot \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 1$$

$$\cdot D +$$

V množině  $\mathbb{C}$  neexistují dělitelé nuly.

---

4.  $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  **komutativní těleso**

$$+ \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 0$$

$$\cdot \quad \dots \underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$$

$$e = 1$$

$$\cdot D +$$

$(\mathbb{Q} - \{0\}, \cdot)$ ,  $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$  komutativní grupa, tzn. na množině  $\mathbb{Q} - \{0\}$  a na množině  $\mathbb{R} - \{0\}$  má operace  $\cdot$  vlastnosti:  $\underline{ND} \wedge \underline{K} \wedge \underline{A} \wedge \underline{EN} \wedge \underline{EI}$