

## Cvičení 10 – příklad 4 (z přednášky)

Nalezněte vlastní čísla a vlastní vektory lineární transformace  $\varphi$  prostoru  $\mathbb{R}^2$  zadané maticí

$$A_S = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

ve standardní bázi. Následně ověřte, že body  $[x, y]$  jednotkové kružnice (tj. vektory  $(x, y)$ ) se pomocí zobrazení  $\varphi$  zobrazí na body elipsy, jejíž délky poloos budou rovny vlastním číslům.

### Řešení

#### Nalezení vlastních čísel a vlastních vektorů

Standardním způsobem najdeme vlastní čísla a vlastní vektory zobrazení  $\varphi$ .

$$|A_S - \lambda \cdot E| = (5 - \lambda)^2 - 9 = 25 - 10 \cdot \lambda + \lambda^2 - 9 = \lambda^2 - 10\lambda + 16 = (\lambda - 2) \cdot (\lambda - 8) = 0$$

Vlastní čísla:  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = 8$ .

Vlastní vektory: Najdeme řešení systému  $A_S - \lambda \cdot E = 0$  dosazením  $\lambda_1 = 2$  a  $\lambda_2 = 8$  místo  $\lambda$ .

1.  $\lambda_1 = 2$ :  $\vec{u}_{\lambda_1} = (-1, 1)$ .

2.  $\lambda_2 = 8$ :  $\vec{u}_{\lambda_2} = (1, 1)$ .

Víme, že násobky vlastních vektorů se zobrazí na násobky sama sebe. Například

$$\varphi(-1, 1) = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot (-1, 1)^T$$

$$\varphi(1, 1) = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix} = \lambda_2 \cdot (1, 1)^T$$


#### Vektory jednotkové kružnice

Podívejme se teď na jednotkovou kružnici a vektory, které ji tvoří. Určitě známe vektory  $\vec{e}_1 = (1, 0)$  a  $\vec{e}_2 = (0, 1)$ , případně vektory k nim opačné:  $\vec{f}_1 = (-1, 0)$ , resp.  $\vec{f}_2 = (0, -1)$ . Ty však nejsou násobky vlastních vektorů, takže se nezobrazí na své násobky. Pomocí matice  $A_S$  je zobrazíme takto:

$$\varphi(1, 0) = (5, 3), \quad \varphi(-1, 0) = (-5, -3), \quad \varphi(0, 1) = (3, 5), \quad \varphi(0, -1) = (-3, -5).$$

Nás zajímají také vektory, které jsou násobky vlastních vektorů. Podívejme se na vektor  $\vec{u}_2$  ležící na přímce  $y = x$ , který je jistě násobkem vlastního vektoru  $\vec{u}_{\lambda_2} = (1, 1)$  (viz Obrázek 1). Jeho souřadnice  $(x_0, y_0)$  lze určit pomocí dvou

Obrázek 1: Jednotková kružnice a vektory  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ , násobky vektorů  $\vec{u}_{\lambda_1}, \vec{u}_{\lambda_2}$



faktů: velikost vektoru  $\vec{u}_2$  je 1, úhel, který svírá s osou x, je  $\alpha = 45^\circ$ . Platí tedy, že

$$\cos 45^\circ = \frac{x_0}{1} \Rightarrow x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\sin 45^\circ = \frac{y_0}{1} \Rightarrow y_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Je zřejmé, že  $\vec{u}_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$  a z toho  $\vec{u}_1 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ .

## Lineární zobrazení jednotkové kružnice

Zobrazíme-li oba vektory pomocí  $\varphi$ , přejdou na své vlastní násobky. Protože  $\vec{u}_2$  je násobkem  $\vec{u}_{\lambda_2}$  a  $\vec{u}_1$  násobkem  $\vec{u}_{\lambda_1}$ , je zřejmé, že

$$\varphi(\vec{u}_1) = \lambda_1 \cdot \vec{u}_1 = 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

$$\varphi(\vec{u}_2) = \lambda_2 \cdot \vec{u}_2 = 8 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}).$$

Uvažujme-li vektory  $\vec{v}_1 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ,  $\vec{v}_2 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$  po řadě opačné k vektorům  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ , tak se také zobrazí na své  $\lambda_i$  násobky ( $i = 1, 2$ ). Tedy

$$\varphi(\vec{v}_1) = \lambda_1 \cdot \vec{v}_1 = 2 \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}),$$

$$\varphi(\vec{v}_2) = \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 = 8 \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}) = (-4\sqrt{2}, -4\sqrt{2}).$$

Podobně jsou na tom i další vektory  $\vec{u} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$  určující jednotkovou kružnici, tj. vektory velikosti 1 vycházející z počátku pod úhlem  $\alpha$ , který svírají s osou  $x$ . Zobrazí se na elipsu  $c$ , jejíž střed je v počátku, hlavní poloosa ležící na přímce  $y = x$  má velikost 8, vedlejší poloosa ležící na přímce  $y = -x$  velikost 2. Hlavní poloosa je totožná s vektorem  $\vec{u}_2 = (4\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$  velikosti 8, vedlejší poloosa odpovídá vektoru  $\vec{u}_1 = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$  velikosti 2. Dále viz Obrázek 2, na němž jsou zobrazeny vektory

$$f\vec{i}u_1 = \varphi(\vec{u}_1) = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

$$f\vec{i}u_2 = \varphi(\vec{u}_2) = (4\sqrt{2}, 4\sqrt{2}),$$

$$f\vec{i}e_1 = \varphi(\vec{e}_1) = (5, 3),$$

$$f\vec{i}e_2 = \varphi(\vec{e}_2) = (3, 5).$$

Obrázek 2: Elipsa  $c$ , výsledek zobrazení jednotkové kružnice

