


PŮDA A BIOTA

Areály rozšíření

Zonální pásmovitost a mořské proudy



Areál organismů

Areál - 1. různá velikost (cirkumpolární, cirkumpacifický, pantropický, kosmopolitní – organismus s globálním rozšířením, který chybí jen na nevelkých nebo relativně oddělených teritoriích (Antarktida, ostrovy). U mořských organismů rozšíření ve všech mořích, u suchozemských organismů na většině kontinentů.


ubikvist – organismus, který se může vyskytovat kdekoliv; je schopen obývat nejrůznější prostředí. Vyznačuje se širokou ekologickou amplitudou – euryekní.

2. Spojitý, nespojitý areál - (disjunktivní, konjunktivní) – překážka, hory, řeka, jezero, úžina apod.


Druhy autochtonní – původní druhy organismů – druh žije v daném místě s optimálními podmínkami pro existenci

Druhy alochtonní – nepůvodní druhy - výskyt mimo oblast původního rozšíření (cizí, zavlečené antropogenními nebo přírodními pochody)

Migrace keporkaka (*Megaptera novaeangliae*)



Oblast rozmnožování a přezimování – rybák dlouhoocasý (*Sterna paradisaea*)




Wintering regions

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa



Oblast alochtonního výskytu a oblast rozmnožování – čáp bílý (*Ciconia ciconia*)



breeding areas



Typy areálů

Endemité – indikátory, jedinečný výskyt – druhy, které se vyskytují jen v dané oblasti, lokalitě, nejvíce ostrovy nebo izolované oblasti hor (Austrálie, Amazonie, Tichomořské ostrovy, Andy, Sardinie, apod.....)

Relikt – svědek dob minulých nebo vymírající druh - organismus, který byl v minulosti mnohočetně rozšířen a zůstal na vhodném stanovišti

refugium – útočiště, prostor kde vymírající druh nachází vhodné podmínky (tzv. živé fosilie)

Glaciální relikt



ostružník moruša



modráček tundrový



bělouš horský

Druhy endemické



tučňák galapážský
(*Spheniscus mendiculus*)



panda velká (*Ailuropoda melanoleuca*)



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

lipnice jesenická (*Poa riphaea*)

Typy areálů

Vikarianti (vikarizace) – zastupování (nahrazování) příbuzných druhů živočichů nebo rostlin na podobných stanovištích v různých zeměpisných oblastech nebo v čase (ježek, vrána, havran, agama, leguán, hroznýšovití)

1) **různé geografické oblasti – geografická vikariace** 2) **různé stanoviště – ekologická vikariace** 3) **časová vikariace** 4) **vikariace analogická**

Invaze – masové migrace živočichů (pravidelné, nepravidelné) – nedostatek potravy, přírodní katastrofa, cyklické přemnožení hlodavců (saranče stěhovavé, ořešník kropenatý, lumík, hraboší)

Erratický výskyt – (důvod přesunu na nové stanoviště zatoulání, zabloudění)

Vikarianti (příklady druhů)

bizon – zubr

ježek západní – ježek východní

vrána obecná – vrána šedá

kuňka žlutobřichá – kuňka obecná

agama – leguán

Vikarianti ježek z. vs. ježek v.



ježek západní (*Erinaceus europaeus*)



ježek východní (*Erinaceus roumanicus*)

autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Změny areálů

Zmenšování areálů


1) Klimatická změna

2) Lidské aktivity: pytláctví, změna životního prostředí a podmínek druhů (deforestrace=odlesnění, urbanizace=nárůst zástavby, intenzivní zemědělství=agrocenózy, chmelnice, sady, ...)

Migrace pasivní

(foresie) – štítovec lodivod, sasanka vs. krab, roztoči vs. hmyz


Zmenšování areálu až vymírání



divoký kůň Tarpan



moa (1500)




pratur (1681)



dronte mauricijský (1662),
blboun nejapný



medvěd atlaský



zebra kwaga (18..)



vakovlk tasmánský (1936)

<http://wildanimals.blog.cz/0709/vyhubení-a-vyhynutí-zivocichové-o>

http://www.volny.cz/richardhorcic/clanky/Blboun/nejenom_blboun.htm

Změny areálů

Změny areálů - dvě možnosti - rozšiřování, zmenšování, vyvoláno několika faktory

Zvětšování areálů – 1) změny klimatu atd., hradička zahradní (1950 většina stř. Evropy) – zvonohlík zahradní – (1840 u nás, 1967 Finsko)

- 2) člověk – a) záměrně pro chov
b) neúmyslné zavlečení při dovozu zboží – mandelinka (*Monomorium pharaonis*), plzák španělský (*Arion vulgaris*)

Zvětšování areálu



zvonohlík zahradní



hrdlička zahradní



mandelinka bramborová

Živé fyto fosílie

Austrálie – 1994 – Wollemie vznešená



Ginkgo biloba – řazen do třídy jehličnany (dvoudomý)
Do druhohor na celé severní polokouli
(Amerika před 7000 lety, Evropa <3000 let)



Metasekvoje čínská – opadavý jehličnan,
čeled' tisovcovití – 1941 popsán (Čína)
(vyhynulý na konci 2H až 3H)



Davidie listenová kapesníkový strom,
strom duchů 19. století (Čína)

Živé zoo fosílie



sliznatky



hoacin chocholatý (kur cikánský – podle Brehma), ptačí přežvýkavci, (živí se převážně listím)



Ježura – ptakořitní (vajíčka, má vak



Haterie novozélandská
(3 oči, struna hřbetní,...)



ptakopysk podivný (1798 popsán) řád ptakořitní, jediný savec > klade vajíčka, jedová žláza (s ježurou teplota 30-32°C)


Zoofosilie - Latimerie podivná

(*Latimeria chalumnae*)



Komory 1938
(lalokoploutvá,
180cm, 90kg,
Komory)

Rozšíření organismů – fyto



Oblasti, podoblasti,
provincie, obvody


**Holarktická,
Eurosibiřská
podobl.,**

**Středoevropská
provincie**

**(ponticko-
panonský),**

4 obvody
**(hercynský,
sudetský,
karpatský,
xerotermní)**

Rozšíření organismů - zoo



Říše, oblasti,
podoblasti,
provincie

Arktogea,
Palearktická
oblast,
Eurosibiřská
podoblast,
provincie: tundry,
tajgy, list.lesů,
stepí.


Rozšíření organismů - zoo

Biogeografické - na Zemi prostředí existence života


(3 základní existenční typy prostředí) - podle něj 3 tzv. geobiocykly

- **1. Mořský** - rozloha 71%, cca 96% objemu všech vod, průměrná salinita 3,5%

1. Mořský



2. Sladkovodní – limnický



0,3% rozlohy, úhrnný objem 7 600x menší než mořský, přechody
bracké vody (euryhalinní druhy – tuleni, krab čínský),
podzemní vody (macarát),
intersticiální vody (však do dna a břehů), polštáře mechů, fytotelmy, periodické tůně

3. Pevninský

Pevninský geobiocyklus vychází ze 2 zákonitostí:

- šířkové pásmovitosti (klimatické pásy)
- výškové stupňovitosti (reliéf)

Celkem vymezeno 10-16 biomů, příklad 10 biomů:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| - polární pustiny | - stepi |
| - tundra | - pouště |
| - bor. jehličnaté lesy (tajga) | - savany |
| - opadavé listnaté mírného pásma | - tropické střídavě vlh. lesy |
| - tvrdolisté lesy | - tropické deštné lesy |

3. Pevninský


Geobiomy (biomy) - vegetační pásy odpovídající svým rozšířením jednotlivým klimatickým pásům na Zemi.

Ekosystém širšího prostoru až regionálního rozsahu


Zonální – makroklima / klimatických klimax

Azonální - edafický klimax, hluboká říční údolí

Zonální (šířková) pásmovitost



Biome | Definition, Map, Types, Examples, & Facts | Britannica



Terrestrial biomes

- Tropical and sub-tropical moist broadleaf forests
- Tropical and sub-tropical dry broadleaf forests
- Tropical and sub-tropical coniferous forests
- Temperate broadleaf and mixed forests
- Temperate coniferous forests
- Boreal forests / Taiga
- Tundra
- Mediterranean forests, woodlands, and scrub


- Tropical and sub-tropical grasslands, savannas, and shrublands
 - Temperate grasslands, savannas, and shrublands
 - Montane grasslands and shrublands
 - Flooded grasslands and savannas
 - Mangroves
 - Deserts and Xeric shrublands
- Rock and ice

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Zonální pásmovitost


- vegetační pásy odpovídající svým rozšířením jednotlivým klimatickým pásmům na Zemi se nazývají biomy.
Ekosystém širšího prostoru až regionálního rozsahu
Zonální = makroklima=klimatických klimax
Azonální=edafický popř. klimatický klimax
- http://www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm

Zonální a vertikální model pásmovitosti



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Tropické deštné lesy, střídavě vlhké lesy a monzunové lesy




Tropické deštné lesy – niva Amazonky



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Tropický deštný les,

vegetační patra



<https://www.google.com/search?q=velik%C3%A1ln%C3%AD+%C5%99ez+de%C5%A1tn%C3%BDm+pralesem>

Tropický deštný les



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa


Queensland – Austrálie,
[wikipedia.org](https://en.wikipedia.org)

Tropický deštný les - primáti




Kahau nosatý, Borneo

Savany



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Savany



Source: adapted from Olson et al., 2001.

Savany

Eukalyptus



Vlhké savany

2 – 4 metry vysoké traviny
(tzv. sloní tráva)
ojedinělé stromy

Suché savany

1 – 2 metry vysoké traviny
Afrika – ojedinělé stromy
(baobab)
Austrálie – ojedinělé stromy
(blahovičníky = eukalypty)



baobab

Savany



Afrika

- akácie (mladé plody stromové akácie obsahují kyanid – rostlina je tak chrání před předčasným spasením býložravci)
- *Miscanthus gigantea* (tzv. sloní tráva)

Akácie (Zdroj: pixabay.com)



sloní tráva

Savany



Afrika

zebra, žirafa, antilopa, pakůň, lev, nosorožec,
slon

Jižní Amerika

mrvanečník, pásovec, puma, jaguár, vlk hřivnatý

Austrálie

klokan, koala, pes Dingo




SAVANY

- Trnové savany (JZ Afrika poblíž Kalahari)
- V případě dostatku vody lze využít pro zemědělství
 - proso, čirok, batáty, bavlník
- Využití pro pastevectví
- **Místní názvy savan:**
 - Llanos – Venezuela, Kolumbie
 - Campos – Brazílie



bavlník

Pouště



tmavě žlutá – teplé pouště
světle žlutá - studené pouště

Pouštní a polopouštní oblasti



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Pouště a polopouště

Rozšíření (21% povrchu pevnin)

Tzv. teplé pouště (hot deserts) – subtropické – 20-30° s. a j.š., temperátní „winter cold deserts“, pobřežní mlžné pouště „fog deserts“

Klimatická charakteristika

Aridní klima, výpar překračuje srážky (10x a více), < 200mm (výpar až 5000 mm), podle výparu a srážek – extrémně aridní, aridní, semiaridní. Teplota 50°C v prachových bouřích i více. Teplota povrchu písku 60-70°C. Vlhkost 10-20%. větrná eroze, anemochorie – pouštní běžci.

Průměrná roční 5-10°C. letní průměr > 20°C. Množství srážek do 300mm.

Půdní typy

Hromadění solí – halisoly,

Georeliéf

Hamada – skalnaté plošiny

Serir nebo reg – kameny se štěrkem

Erg – písky

Jílové pouště

Slané pouště – dna slaných jezer

Okrsky – vádí, oázy, bajada – aluviální pánve - srážková voda z wadi



Fyto

Pokryvnost vegetací polopouště - max. 25 % plochy půdy nebo hornin

Therofyty – přes 60 % rostlin, xerofyty – agave, aloe, chřest, kosmatec,

kapara trnitá, asparagus, Carnegie gigantea – národní rostlina

Arizonky - kaktus, opuncie, yucca, akácie, saxaul

Sahara – cca 3 000 druhů cév. rostlin , Karoo-Namib – 5 000 druhů , Austrálie – 1 200

Zoo

Adaptace na noční aktivity, podzemí, estivace

Koncentrace moči, velbloud schopnost přehřátí,

Opylovači – brouci



saxaul



palma datlová

Sonorská poušť

masdemx.com



Kvetoucí kaktus (*Opuntia basiralis*) Sonorská poušť



ANZA-BORREGO DESERT STATE PARK



moloch
skvrnity



zmije písečná



tarbík



pískomil



štír




přímorožec arabský



fenek

Tvrdošité lesy



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Tvrdolisté lesy

Rozšíření

1.) Východ S. Ameriky 2.) Evropa bez Středozemí, Skandinávie, Vých. Ruska 3.) Vých. Asie
4.) Chile30-50° s. a j.z.š.

Klima

Mírné (temperátní) klima. 4-6 teplejších měsíců, průměrná červencová teplota kolem, nebo nad

20°C. Průměrné roční cca 10°C, kontinentalita zvyšuje extrémy. Srážky 500-1 500 mm.
Klima krajiny se významně změnilo díky odlesňování (zemědělství).

Půda

hnědé lesní půdy, ilimerizované, změna zemědělskou výrobou

Biota

dominance - stromy a keře s opadavými listy a dobře chráněnými obnovovacími orgány,
výskyt jarního a letního aspektu!!!! Vertikální členitost vegetace (obvykle 3 patra -
stromové, keřové, bylinné)

Stromy: lípa, dub, buk, javor, ořechovec

S. Amerika – buk velkolistý, javor cukrový (sever), jih (dubo-kaštanovníkové lesy; *Castanea*),
západ (dubo-ořechovcové lesy; minimálně 10 druhů dubů, 5 – druhů ořechovců *Carya*)

V. Asie – buky, jasany, javory, jerlín japonský, pajasan žlaznatý,

J. Amerika – pabuky (*Nothofagus*)

Tvrdolisté lesy

Rozšíření (1,8%)

Biota

Dominantní producenti – stromy a keře (stromy výška do 20m)-
stálezelené – dub cesmínolistý, korkový, olivovník, žumara nízká,
borovice pinie, cedr, cypřiš vždyzelený, eukalyptus, růže, pistácie,
vavřín, kaštanovník setý, myrta, zimostráz vždyzelený,

Zvířena

Středomoří - muflon, daněk, koza bezoárová, obecně - množství plazů a
teplomilné zvířeny, v minulosti i lev berberský - Středomoří

Sekundární lesy – pařezové mattoral (macchie, garique, tomillares, fynbos....)
– většina lesních porostů ve Středomoří využita na stavbu lodí (antika). Místo nich křovité formace v různých částech středomoří mají místní názvy (fynbos – Jižní Afrika, chaparral – JZ U.S.A., tomillares – Španělsko, garriques – jih Francie, phrygana – Recko, balkán – šibljak).

Užitkové rostliny - citrusy, mandloně, broskve, meruňky, olivovník, vinná réva, fíkovník smokvoň, dub korkový, ořešák, morušovník, líska turecká, koření a aromatické bylinky (levandule, šanta, šalvěj, yzop, bazalka, meduňka, dobromysl -, vavřín, lékořice). Květiny – Afrika – pelargonie, frésie, mečík, pistácie, kaštanovník setý,



olivovník



fíkovník smokvoň



pistácie



granátovník



cedr



dub kermesový



dub korkový



mandloň obecná



AGRUMES / CITRUS FRUITS



citrusy



levandule




cypřše



borovice pinie

Stepi



Step – severoamericana



Endangeredwonders.org



[North American Sagebrush Steppe | Wrangle](#)

Stepi

- Mapa asijských a evropských stepí:
- [The Steppe | Map, Biome, Eurasia, Peoples, & Animals | Britannica](#)

Stepi východoasijské



mongolská step (zdroj:pixabay.com)

Stepi

□ Rozšíření

Severní Amerika – prérie, Jižní Amerika – pampy, Afrika – veldy, Ázie – stepi, Austrálie

□ Klima

Srážky kolem 200 mm, chladné až mrazivé zimy, suchá a horká léta.
Průměrné roční teploty méně 6°C , vláha z tání sněhu

□ Půda

Nejúrodnější půdy černozemě, hnědozemě méně arenozemě...

□ Biota


Rostou především traviny, minimum lesů

□ Zvířata

bizon, zubr, sysel, křeček, kůň Przewalského

Temperátní listnaté lesy mírného pásma – opadavý širokolistý les

(Temperate broadleaved forest)



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Temperátní listnaté lesy mírného pásma

- Lesy u kterých přesahuje 75% listnatých stromů
 - Oblasti - střídání 4 ročních období
 - Do 1 000 m nad mořem
 - Od 18. století obývá
-
- Vznik v dobách ledových ze sprašových ploch
 - Výskyt ve střední Evropě
 - Listnaté lesy vypalovány za účelem pěstování plodin

Temperátní listnaté lesy mírného pásma

- Lesy u kterých přesahuje 75% listnatých stromů
 - Oblasti - střídání 4 ročních období
 - Do 1 000 m nad mořem
 - Od 18. století obývá
-
- Vznik v dobách ledových ze sprašových ploch
 - Výskyt ve střední Evropě
 - Listnaté lesy vypalovány za účelem pěstování plodin

Temperátní listnaté lesy mírného pásma

□ Rozšíření

45s.š -55s.š. Evropa, Amerika – 35-55, Jižní Amerika 30-40j.š., kousínek i N.Zéland

□ Klima

Aridní mírné klima se studenou zimou.

Průměrná roční 5-10°C. letní průměr > 20°C. Množství srážek do 300mm.

□ Půda

Reliéf ovlivněn sedimentárními horninami (spraš) – hnědozem, kambizem. Procesy salinizace.

Podzemní biomasa 10x vyšší než nadzemní. Organická složka stará několik tisíc let.

□ Biota

Trávy (kavyl, lipnice, kostřavy), tulipány, kosatce, pivoňky, šalvěj, hyacinty, pelyňky

Temperátní listnaté lesy mírného pásma

- dub letní,, habr, jasan, jilm, buk, jedle, borovice
méně zastoupeny - vrby, olše, topoly či břízy, líska, hloh - strom/keř z čeledi růžovitých



Temperátní listnytý les

Temperátní listnaté lesy mírného pásma



Temperátní listnaté lesy mírného pásma

■ Zoo

- Sysel, svišť stepní (1 zvíře 60m chodeb), pískomil (léto – estivace), morče, ...
- Šelmy – tchoř, kojot, šakal, liška, vlk, jaguár, vlk hřivnatý,
- Býložravci – sajga tatarská, osel, kůň, gazela, zubr, bizon, vidloroh, lama guanako,

Temperátní listnaté lesy mírného pásma



sajga tatarská



vidloroh



vlk hřivnatý



morče *Cavia aperea*




lama guanako



svišť stepní

Boreální lesy (tajga)



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Boreální lesy (tajga)

- Pouze na severní polokouli
- Velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou
- Průměrná roční teplota -5 až 5 °C
- Málo srážek (roční úhrn srážek 450-600 mm)
- Vegetační období trvá 1-4 měsíce
- Nejrozšířenější – na Sibiři, dále v Kanadě a USA (Aljaška)

Boreální lesy (tajga)

- Permafrost
- Zamokřené plochy, močály
- Stromové patro
 - Jehličnaté lesy: borovice, jedle, modříny, smrky
 - Listnaté lesy: břízy, jeřáby, olše, topol osika
- Keřové a bylinné patro
 - brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný

Boreální lesy (tajga)

- Permafrost
- Zamokřené plochy, močály
- Stromové patro
 - Jehličnaté lesy: borovice, jedle, modříny, smrky
 - Listnaté lesy: břízy, jeřáby, olše, topol osika
- Keřové a bylinné patro
 - brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný

Boreální lesy (tajga)



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa

Tajga - lesy



© Michal Hroneš
autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, takona, adresa




© Josef Dohnal
autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, takona, adresa

Tajga - zoo


- medvěd (medvěd černý)
- los (los evropský)
- vlk obec (*Canis lupus fam.*)
- bobr evropský
- rys ostrovid



Tajga - zoo



Tundra



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa


Tundra

Rozšíření

severní okraje kontinentů s. polokoule, Grónsko, ostrovy, + alpinská tundra (tzv.orobiom). Rozloha max. 10%.

Klima

extrémně krátké vegetační období (6 - 10 týdnů), maximum 4 měsíce
dlouhé chladné, tmavé zimy (6 - 10 měsíců, průměrná teplota -6 až -12°C)
srážky (200 - 300 mm)



Půda

permafrost,
fyzikální zvětrávání, nadbytek vody v létě (jen povrchová vrstva půdy)
pomalá mineralizace humusu



dutohlávka sobí - lišeňníky




vřes



muchomůrka červená



suchopýr



Tundra



lumík



pižmoň



rybák dlouhoocásý
nejdelší migrace
Arktida - Antarktida



zajíc bělák



Photo by Mrs. Marcia Sydor (Aaron's Grandmother)



bělokur - přeperování



Polární pustiny

Arktida – tuleni, mroži, medvědi, velryby

Antarktida – tučňáci, velryby

Povrch bez vegetace, občas mechy a lišejníky

Klima

Goreliéf pokrytý povětšinu roku ledem a sněhem

Teploty pod nulou, teplotní minima méně než 50 stupňů Celsia

Nejnižší teplota určená pozemním měřením, -89.2°C , byla naměřená 21. června 1983 na tehdejší sovětské polární stanici Vostok v Antarktidě (nyní ruská polární stanice)

Děkuji za pozornost



autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa