



Anxiolytika
= ataraktika = „malé tankvilizéry“


Benzodiazepiny

- vazba GABA na $GABA_A$ receptor \Rightarrow nárůst permeability Cl^- kanálu \Rightarrow \uparrow konc. Cl^- uvnitř neuronu \Rightarrow pokles excitability
- benzodiazepiny zvyšují účinnost GABA tím, že snižují její koncentraci potřebnou k otevření kanálu




Benzodiazepinový receptor je součástí chloridového kanálu (ionoforu)






Benzodiazepiny zesilují GABA-ergní inhibici vedení vzniku v CNS



GABA_A-receptor-chloridový kanál s naznačenými vazebnými místy pro různé typy tlumivých léčiv

Benzodiazepiny 1,4-benzodiazepiny




diazepam

Diazepamum ČL 2009

• též prevence febrilních křečí kojenců a batolat


Apaurin®, Diazepam

Slovakofarma®



chlordiazepoxid


- od r. 1960
- N-oxid
- amidinová struktura umožňuje tvorbu solí s kyselinami
- Elenium®



oxazepam


Oxazepam Léčiva®

Benzodiazepiny
1,4-benzodiazepiny




klonazepam

Clonazepamum ČL 2009



bromazepam


Bromazepamum ČL 2009



tetrazepam

Tetrazepamum ČL 2009

Benzodiazepiny
1,4-benzodiazepiny




$\text{R} = \text{H}$

$\text{R} = \text{F}$

(Rohypnol[®])


nitrazepam

flunitrazepam




medazepam

Ansilan[®]



klorazepát draselný


Benzodiazepiny
Orthokondenzované 1,4-benzodiazepiny



R = H
R = Cl

alprazolam
triazolam

Benzodiazepiny
1,5-benzodiazepiny




klobazam

Clobazamum ČL 2009

Frisium®

Benzodiazepiny 2,3-benzodiazepiny



R,S-(\pm): **tofisopam**

Grandaxin®


R-(+): **dextofisopam**

- anxiolytikum, léčivo dráždivého tračníku a Crohnovy choroby

S-(-): **levotofisopam**


- anxiolytikum

Izosterní analoga benzodiazepinů



klotiazepam

Antagonista benzodiazepinového receptoru



flumazenil

Flumazenilum ČL 2009

- léčba intoxikací

Účinky benzodiazepinů

- anxiolytické
- antikonvulzivní
- myorelaxační
- sedativní – hypnotické

M.Ú.

- alosterické efektoru GABA_A -receptoru
- zesilují inhibiční účinek GABA, jenž se realizuje vstupem Cl^- do buňky
- zvýšení intracelulární koncentrace Cl^- vede ke snížení dráždivosti membrány neuronu
- mezi účinností benzodiazepinů a afinitou k receptoru existuje těsná korelace
- endogenní ligandy zatím neznámé


Vztahy mezi strukturou a aktivitou (SAR)

- pro účinek nezbytný diazacykloheptanový kruh přikondenzovaný na arom. systém
- kondenz. benzen může být nahrazen thiofenem
- benzenový kruh v pol. 5 lze nahradit pyridinovým beze ztráty účinku
- aktivitu zvyšuje methyl v pol. 1
- elektronakceptorové subst. v pol. 7 zvyšují aktivitu v pořadí $F < Cl < Br < NO_2$
- akt. zvyšuje i F nebo Cl v *o*-poloze fenylu v pol. 5
- účinnost snižují větší substituenty v pol. 1 nebo jakákoli substituce v pol. 3 nebo v *p*-poloze fenylu v pol. 5
- OH v pol. 3 zkracuje účinek


Biotransformace

- játra: oxidativní dealkylace na N(2), hydroxylace v pol. 3, konjugace s kys. glukuronovou, vyluč. ledvinami
- 7-nitrobenzodiazepiny (flunitrazepam, nitrazepam): $-NO_2 \rightarrow -NH_2$, N-acetylace n. glukuronace

Biotransformace benzodiazepinů




Jiná (nebenzodiazepinová) anxiolytika



mefenoxalon


- slabé anxiolytikum
 - centrální myorelaxans
- Dimexol[®], Dorsiflex[®]



gedokarnil

- β -karbolinový derivát
- připraven jako nekompetitivní antagonista glutamátového receptoru


Jiná (nebenbenzodiazepinová) anxiolytika




etifoxin

- agonista GABA_A
- váže se též na translokátorový protein (TPSO), $M_r \sim 18\ 000$, dříve periferní benzodiazepinový receptor, umístěný na vnější mitochondriální membráně \Rightarrow regenerace poškozených periferních neuronů

Jiná (nebenzodiazepinová) anxiolytika
Deriváty 1,2- nebo 1,3-propandiolu



$R = \text{CH}_3$ **mefenesin**
 $R = \text{OCH}_3$ **guajfenesin**
Guaifenesinum ČL 2009
 Guajacuran®
 •anxiolytika
 •centr. myorelaxancia
 •expektorancia



$R = \text{H}$ **meprobamat**
Meprobamatum ČL 2009
 $R = \text{iso-C}_3\text{H}_7$ **karisoprodol**
Carisoprodolum ČL 2009
 •anxiolytika
 •centr. myorelaxancia