

Historický pohled

Etapa přírodních léčiv

- Léčiva 1. generace - výběr vycházející z **empirie**

Chemická etapa

- Léčiva 2. generace - kvalitativní i kvantitativní **stejnorodost** izolátu a přesné dávkování, anorganická a organická léčiva

Chemicko-biologická etapa

- Léčiva 3. generace - záměrné **obměny** předlohouvých izolátů

Výběr struktur výpočtem, 3D QSAR, molekulové modelování

- Léčiva 4. generace - **enzymové, receptorové cílení aj.**

Historický pohled

Egypt - rostlinné produkty k terapii - opium, aloe, ricin, fenykl, minerální soli a kovy.

Starověké Řecko - opium - potlačování bolesti, blín černý - (*Hyoscyamus niger*) - otravy, vraždy, anestetikum, revmatismus, hechutentství.

V současnosti se využívá jako zdroj tropánových alkaloidů - atropin, skopolamin aj.

Hypokratés (460 př.n.l., Kos - cca 370 př.n.l., Larisa v Thessáliei,
lékař, filosof)

Je nejvýznamnějším představitelem tzv. kóské školy a považován za otce
medicíny

Nemoc: nerovnováha čtyř základních tělesných št'áv:
černé žluče, žluté žluče, krve a slizu.

Corpus Hippocraticum - nejstarší sbírka lékařských textů, které
nahradily primitivní léčitelskou magii - soustavné pozorování, racionální
úvaha, položil základy medicíny jako vědeckého oboru.


Autorství Hippokratovy přísahy - soubor etických pravidel
pro jednání lékaře.

Peri aeron, dydaton, top on
O vzduchu, vodách a místech

„Nechť je jídlo Vaším lékem a ne lék Vaším jídlem.“

Dílo pojednává o vlivu prostředí na zdravého i nemocného člověka.

Hippokratés poukazuje na **souvislosti** způsobu života, výživy, zdravotního stavu, psychiky lidí a snad i charakteru národů s přírodním prostředím.



ΗΙΠΠΟΚΡΑΤΕΣ

Galenos (129-216 n.l., narodil v řecké rodině v Pergamu)

- Za základ lékařských znalostí považoval **anatomii**,
- vykonával odvážné a náročné **operace** - oka a mozku,
- byl dvorním lékařem římských **císařů** (Marka Aurelia a jeho syna Commoda),
- a dosáhl velkého ohlasu - známe je jeho **pouštění žílou**, které přetrvalo až do 19. století.

Čínská medicína

- **Fu-si** (2852 - 2737 př.n.l.)

Za jeho vlády byly údajně uvedeny do života praktiky **akupunktury**, sám vyrobil devět typů jehel, pro různé léčebné účely.

- **Šen-nung** - je považován za otce čínské medicíny (2737 - 2697 př.n.l.)

Byl zakladatelem „**farmakologie**“ a **způsobu používání** léčivých bylin. Připisuje se mu dílo nejstaršího čínského herbáře „**Šen-nungův kánon bylin**“ - testoval účinky bylin.

- **Chuang-ti** - Žlutý císař (2697-2597 př.n.l.)

Od něho **taoisté** odvozují svoje učení a poznání.

Je považován za autora **základního** díla čínské medicíny zvaného „**Vnitřní kniha Žlutého císaře**“.

Arabská medicína

Arabští učenci (např. Hunajn ibn Isháq) překládali spisy Hippokrata, Aristotela, Galéna aj. Tyto poznatky pak z arabštiny byly překládány do latiny, čímž se navracely do Evropy.

Rhazes (865 - 925) byl arabsky píšící perský polyhistor, jedna z významných osobností **Zlatého věku** islámu, lékař, biolog, fyzik a filosof.

Přisuzuje se mu řada lékařských objevů, například rozlišení pravých neštovic od spalniček, a objevení řady nových sloučenin, například petroleje nebo kyseliny sírové.

Arabská medicína

Ibn Síná, na západě známý jako **Avicenna** (asi 980-1037 perský středověký filosof, lékař a polyhistor, který je považován za jednu z nejvýznamnějších postav zlatého věku islámu.

Věnoval se hlavně **studiu medicíny**, teoreticky vycházel z Hipokrata, Aristotela a Galena.

Napsal velmi dlouho platné a užívané knihy - **Kánon medicíny** - dílo bylo **vrcholem** lékařského vědění **10. století** a stalo se vedle spisů Galénových nejdůležitějším lékařským pramenem **středověku**.

Kniha sloužila jako **základní učebnice** muslimských a křesťanských žáků lékařství na všech evropských univerzitách.

Evropa

Starověká a středověká farmacie

- Používání mnohočetných směsí různých přírodnin a poloproduktů - jejich iracionální zdůvodnění, nánosy pověrčivosti a kouzelnictví.

Rozvoj alchymie

- Přinesla lidstvu mnoho poznatků a dala základ mnohým ostatním vědám.
- Nezabývala se pouze chemii, ale např. i fyzikou, magií, mineralogií, metalurgií, spiritizmem i přírodovědou.
- Poskytla nové látky anorganického charakteru i nové postupy v chemické laboratoři.

Empirický přístup v Evropě

- Přetravává až do 16. století - představuje nejdelenší vývojový úsek léčiv.

Období renesance - nové myšlenkové proudy, zvýšený zájem o přírodní vědy.

Paracelsus (1493-1541)

- Látky chemického původu jsou **rovnocenné** přírodním, **zdůrazňoval** význam pozorování a experimentu.
- Položil základy **iatrochemie**, předchůdkyně farmaceutické chemie (příčinou špatné funkce organizmu jsou **změny** v jeho chemickém složení).
- **Paracelsus -alchymie** - **hledání** léků, oddělování nečistých látek od čistých a nalézání užitečných vlastností látek
- Poukázal na účinnost vnitřně podávané **rtuti** v přesně odměřených dávkách - terapie syfilidy
- **Jed od léku odlišuje pouze podávané množství.**



مُثْلِحَارَةٌ اسْتَرْ بَطْلَعَ الْمَا صَافِيَ،



Etapa přírodních léčiv

(léčiva 1. generace - výběr z empirie)

- Počátek v dávnověku - existence života spojena s **výskytem chorob, neznáma funkce lidského těla** - choroby záhadné a **tajemné**.
- **Každodenní styk** s přírodou, s látkami rostlinného, nerostného i živočišního - **objev** toxicických i terapeutických vlastností (např. projímaté, excitační).
- Významné přírodní suroviny - med, česnek, ricin, námel, koka (bolesti hlavy, uklidnění žaludku, léčba cukrovky), chininová kůra, kurare aj.

Chemiatrická etapata (doba Paracelsova, 16. až pol. 17 století)

Iatrochemie (chemie kombinovaná s medicínou) - zavedla do léčebné praxe používaní **anorganických** látek (sloučeniny rtuti, antimonu, arsenu mědi, stříbra, železa aj. - **toxicita** při neznalosti dávkování znemožnila jejich širší využití

Byla rozvíjena v **lékárenských** laboratořích v 17. a 18. století - představovali **první** farmaceutické manufaktury.

Od tohoto období existují již dva zdroje léčiv:

- přírodní suroviny rostlinného, živočišního a minerálního původu
- a jednak produkty **chemické syntézy** (**anorganické** sloučeniny).

Chemická etapa - léčiva 2. generace


(léčiva 2. generace, anorganická i organická léčiva)

- Etapa založena na **exaktním a systematickém výzkumu** – konec 18. a zvláště začátek 19. století (**významané místo představují laboratoře lékáren**)
- **Rozvoj** chemického průmyslu, chemie a lékařských věd.
- **Zdokonalení** laboratorní techniky (postupy drcení, míchání, extrahování, odpařování, destilování, sublimování aj.).
- Vypracování metod na **izolaci účinné složky** z přírodních surovin.
- Rozvoj analytických poznatků, zavádění **nových fyzikálních a fyzikálně chemických pracovních technik**.


Isolace chemických individuí z přírodních surovin

Z organických látek: kyselina vinná (1769), kyselina benzoová (1775), glycerin (1779) a významné alkaloidy.

Sertürner isoloval z opia **morfín** - nositel účinku není droga, ale chemické individuum.




1805 (1827,1952)




Chinin 1820 (izolace Pellegrino, Caventon), **1909** zjištění struktury,
1944 totální syntéza


Atropin 1833 (1898,1901)



Kokain 1860 (1898,1901)



Efedrin 1887 (1909,1925)



Syntetická léčiva organická

- Vitalistická teorie - organické látky **mohou** vznikat pouze na základě činnosti živých organismů.
- Wöhler 1828 - syntéza **močoviny** z kyanatanu amonného.



Toto období je **možné** považovat za charakterizující pro **počátek** jak **farmaceutické chemie**, tak i **syntézy** léčiv.

Chemicko-biologická etapa

(léčiva 3. generace - konec 19. století)

- Rozvoj **analytických** metod
- Zavádění **nových** fyzikálních a fyzikálně chemických pracovních technik (rozdělovací techniky - mnohopatrové kolony, molekulární destilace, vakuová a tlaková technika, různé chromatografické techniky apod.).
- Zaváděná i nová **chemická** činidla, technika radioisotopů apod.


- Pokroky strukturální analýzy - formulace strukturní teorie.
- Nové **analytické** postupy - analýza spektrální, polarografická, chromatografické metody.
- Vypracování vhodných **farmakologických** metod hodnocení, rozvoj experimentální farmakologie

Systematické studium působení léčiv na zvířecím organizmu.


- C. Bernard (1813-1878) definoval specifické místo účinku.
- O. Schmiedeberg, R. Buchenheim, T. Fraser, A.C.Brown - publikovali „Vztahy mezi chemickou konstitucí a fyziologickou aktivitou“ (1869).
- Definice receptoru anebo specifického místa, kde působí biologicky aktivní látka (léčivo) - P.Ehrlich (1854-1915), J.N.Langley (1852-1925).

Modifikace struktur léčiv přírodního původu


Atropin



Homatropin



Oxyfenonium-bromid



Indikace: oftalmologie jako **mydriatikum** k diagnostickým účelům, vnitřně spazmolytika u spazmů a kolik zažívacího traktu a ve vyšších dávkách u kolik žlučníku a ledvin.

Některé významné objevy 20. století

- Dvacátá a třicátá léta - objev dvou skupin léčiv přírodního původu - **vitaminů a hormonů**.
- První skupina antibakteriálních chemoterapeutik - 1935 - **sulfonamidy**.
- Zlaté období ve vývoji léčiv - v průběhu **druhé světové války** a v **poválečné** době vznik terapeutických skupin, která nebyla v dřívější době **farmakoterapeuticky zvládnuta**:
antibiotika, psychofarmaka, antihistaminika, antituberkulotika, antihypertenziva, orální diureтика, kortikoidy, blokátory beta-adrenergních receptorů a další.

Některé významné objevy 20. století

Druhá polovina 20. století


- zvýšená pozornost je věnována výzkumu **biochemických pochodů** (metabolizmu),
- **receptorového účinku** léčiv,
- a **fyzikálně chemickým** vlastnostem léčiv ve vztahu k účinku.

Výzkum v našich podmírkách

Výzkum - ve Frágnerce, v Remedu a v Interpharmě,
později Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii (VUFB).

Významné výsledky

Dr. Semonský: oblast námelových alkaloidů, separace, polosyntetické deriváty, originální látky **tergurid (trans-dihydrolisurid)** a **lisurid** (terapie migrény a Parkinsonové choroby).




Výzkum v našich podmírkách

Dr. Protiva a kol. - 1959


Antihistaminička

embramin



moxastin


(prodaná licence (Smith-Kline & French, India- antih.č.1)




Indikace: antiemetické účinky (proti zvracení) a antivertiginózní účinky (proti závratím, při kinetózách)

Spazmolytika - u spazmu GIT, močových cest a u renálních biliárních kolik.

hexasonium-jodid (1956)




oxysonium-jodid (1956)



Antidepresiva - lehké nebo střední deprese s pocitem strachu a úzkosti


dosulepin

MÚ: blokuje zpětné ukládání dopaminu.




noradrenalinu, serotoninu i

Adefovir - je účinný vůči retrovirum i DNA-virum (chronická hepatitida B).




Tenofovir - se používá k léčbě HIV



Etherovou vazbou je vázaná hydroxymethylfosfonová kyselina. Uvedený typ sloučenin je odolný vůči působení **fosfatas**, neboť v molekule chybí esterová vazba.

Remdesivir



analog fragmentu adenosinu

Účinkuje jako analog **adenosinu**, léčbě infekcí způsobených viry Ebola a Marburg.

Ověřuje se též jeho účinnost proti onemocnění Covid-19

Česká stopa - vědecký tým český rodák Tomáš Cihlář - americká společnost Gilead Sciences

Pováleční období z pohledu bezpečnosti používaných léčiv

Příprava léčiv s vysokou účinností - riziko zvýšení vedlejších účinků.

Zastaralé zákonodárství při registraci léčiv - větší průchodnost nedostatečně prozkoumaných léčiv.

1938 farmaceutická společnost v USA zavedla roztok sulfanilamidu v ethylenglykolu - úmrtí 80 pacientů.


Pováleční období z pohledu bezpečnosti používaných léčiv

1961 thalidomidová aféra - narození mnoha tisíc poškozených dětí.



Preklinické testy jsou druhově specifické a na zvířatech se neprojevila.

R-thalidomid racemizuje na S, který je teratogenní.

(R)- thalidomid




(S)-thalidomid




(S)-N-ftaloylasparagová kyselina (teratogen)

Zpřísnění požadavku na hodnocení léčiv


1938 nová aplikační forma adrenalinu 27 str.



expektorans guaifenesin dokumentace na 73 str.



1968 celkové injekční anestetikum ketamin 72.000 str.
(veter. medicina)



Výběr struktur výpočtem, 3D QSAR, molekulové modelování aj.

(léčiva 4. generace, enzymové, receptorové cílení, konec 20. století)

- Korelace biologické aktivity látek s jejich strukturou - QSAR
(průkopníky byli C. Hansch, S.M. Free a J. Wilson) - vliv sterických, hydrofobních a elektrostatických interakcí na biologickou odezvu.
- Studium prostorové interakce mezi ligandem a receptorem tzv. vícedimenzionální metody-3D-QSAR.

Korelace mezi biologickou aktivitou a prostorovým uspořádáním potenciálních léčiv - lepší predikční schopnost než u korelačních vztahů.

Molekulové modelování - CADD

Z krystalografických měření známa struktura proteinu cílového receptoru, enzymu



Jsou studovány možnosti agonistického nebo antagonistického účinku

Hledání potenciálně aktivních látek - na základě výpočetních metod se sleduje schopnost vazby na aktivní receptor - *molecular docking*

Inhibitory neuroamidasy

Indikace: k léčbě a profylaxi chřipky typu A i B, včetně ptačí chřipky

3D- struktura neuroamidasy - glykoprotein




neuraminová (sialová) kyselina


Neuroamidasy: hydrolytické enzymy štěpící glykosidické vazby. Jsou **glykoproteiny** vyskytující se jako **antigeny** na povrchu proteinového obalu chřipkových virů.

Odštěpují neuroaminovou (sialovou) kyselinu (aminocukr 9 C) ze sacharidů ukotvených na povrchu buněčné membrány hostitelské buňky a tím umožňují uvolnění virů vzniklých v infikované buňce.


Specifické protilátky proti neuraminidáze nejsou schopné **zabránit** infekci, ale snižují **replikační** aktivitu a zabraňují dalšímu šíření viru. Jsou schopny **interakce** s příslušnými enzymy - jsou **alternativní** substráty.



neuraminová (sialová) kyselina



zanamivir



oseltamivir (je proléčivo)

Indikace: profylaxe, ale i terapie chřipky dospělých i mládeže

Kombinatorní chemie

- systematické a **opakování** kovalentní spojování vhodných typů stavebních bloků různé struktury,
- vznik velkých souborů **různých** chemických sloučenin,
- výhoda je rychlá syntéza a **základní screening** biologické aktivity.

Budoucnost farmaceutické chemie (farmakochemie, medicinální chemie)

- Syntetické, strukturálně analytické a technické prostředky jsou v podstatě zvládnuty.
- Významný posun v oblasti predikce léčiv v souvislosti s přímím objasněním interakce léčiva s receptorem.

Výsledky výzkumu lidského genomu

GENOMIKA

- Obor jehož cílem je stanovit **úplnou** dědičnou informaci organismu a interpretovat ji v termínech životních pochodů.
- **Cílená** léčba anebo **náprava** genetického deficitu.
- Je to **nejrychleji** se rozvíjející vědní disciplína - přináší nové možnosti výroby **vysoce** biologicky účinných látek typu hormonů, enzymů, neurotransmiterů a protilátek.
- V **současnosti** používané - diagnostika dědičných chorob a infekcí.

Transkriptomika

- studuje procesy uskutečňující **transkripci** (přepis) genu.

Proteomika

- věda, která studuje **soubor** všech proteinů (proteom),
- základním cílem je poznání **funkce** proteinu **zakódovaných** v genomu organizmu,
- studium 3D (trojrozměrné) struktury proteinů **umožní** vývoj specifitějších léčiv.

Lipidomika

- studuje **soubor** lipidů vytvářených buňkou
- **objasnění** metabolických drah zdravého i nemocného člověka
- pomůže **nalézt** nové a účinnější terapeutické přístupy - obezita, kardiovaskulární poruchy, těžká onemocnění jako rakovina či Alzheimerova choroba.

Biologická léčba - cílená léčba

Využívá obranyschopnost organismu k boji proti rakovině či některým autoimunitním chorobám (jsou známé struktury a pochody na povrchu i uvnitř buňky).

Látky používané v biologické léčbě se nazývají
modifikátory imunitní odpovědi.

Monoklonální protilátky - uměle vyráběné protilátky, které vytváří jeden klon (antigenem může být např. receptor nádorové buňky).

Inhibitory tyrosinkinasy - zabezpečuje předávání informací směrem do buňky prostřednictvím receptorů - terapie nádorových onemocnění.

Antiangiogenní léčba - tlumí celkově tvorbu nových cév vedoucích k nádoru.

Biologická léčba revmatoidní artritidy - cíleně zasáhnou jednotlivé buňky imunitního systému a mediátory účastnící se vzniku a rozvoje revmatoidní artritidy.

Farmaceutická chemie – medicinální chemie, farmakochemie

- Je vyučována na farmaceutických fakultách – profilový předmět, státní zkoušky
- Je vyučována na chemických a chemicko-technologických fakultách – speciální předmět

- IUPAC definovala v r. 1998 Medicinální chemii jako chemickou vědeckou disciplinu, zahrnující **aspekty biologických, lékařských a farmaceutických věd.**
- Poskytuje **ucelený** obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru, studuje jejich **metabolismus** a **mechanismus působení na molekulární úrovni.**
- **Využívá postupů** chemických, fyzikálně-chemických, biochemických, farmakodynamických, výpočetních a dalších.
- Je vědou užitou, aplikovanou, s teoretickým a praktickým zaměřením na **racionální výběr, přípravu a hodnocení nových léčiv**

Výuka Farmaceutické chemie na FaF

- **Teoretická část** - názvosloví, význam a vliv chemické struktury, včetně vlivu na farmakokinetické i farmakodynamické procesy, které probíhají při podání léčiva do organismu
- **Systematická část** - léčiva jsou tříděna podle charakteru a druhu jejich použití dělení podle farmakologických skupin
- Koresponduje s používaným rozdelením léčiv v rámci jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC)
- **Vyžaduje přípravné disciplíny** - organická a bioorganická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie
- Opírá se o mezioborové - biologie, farmaceutická propedeutika
- Úzce souvisí s dalšími profilovými předměty - farmakologie, technologie⁴⁵