




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## 4.Lekce

# MATERIA MEDICA -VÝZNAMNÁ REMEDIA

**Drosera, Ferrum phosphoricum,  
Hepar sulfur, Ignatia amara**



# DROSERA ROTUNDIFOLIA



## Původ:

- Masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá
- Arktické a mírné pásmo severní polokoule
- OL: naftochinony (plumbagin, droserin) - leptají kůži, flavonoidy, silice

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Historie:

- Prastará léčivá rostlina ► schopnost vyléčit každé onemocnění, prodloužit život

## Použití:

- Expektorans, diuretikum, spazmolytikum
- Antitusikum, bronchospazmolytikum
- NÚ: hyperemie, zánět sliznic, zvracení a krvavé průjmy

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Příprava:

- Celé čerstvé rostliny sbírané na začátku květu

## Profil léku (pacienta):

- duševní nepokoj
- nekoncentrovanost
- odpor k jakékoliv práci
- strach
- nervozita
- nedůvěřivost
- křečovitě jednání

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Obecné účinky:

- Dusivý, štěkavý, spastický kašel
- Vlákňité hleny v průduškách
- Záchvatovitý kašel při ležení (v noci)
- Nepřetržité dráždění pohrudnice

## Pocity:

- Pocit šimrání v hrtanu ► kašel
- Pocit bolesti na prsou (drží si hrudník)
- Pocit suchého hrdla, píchání na prsou

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Modality:

**Zlepšení:** tlakem dlaní, pohybem, sednutím si

**Zhoršení:** v noci, jídlem a pitím, teplem lůžka, mluvením, zpěvem

## Doprovodné příznaky:

- Zmodrání
- ↑ teploty kolem 9 ráno
- Noční pocení
- Pacient má při záchvatech velký strach

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Základní klinické indikace:

- DS: laryngitidy 5 gr 3-4x denně **15 CH**  
černý kašel 5 gr 1-2x denně **30 CH**
- Lymfatický systém: mikropolyadenopatie  
adenopatie trachey  
5 gr 1x denně **30 CH**
- Osteoartikulární ústrojí: dlouhé kosti, kyčle  
5 gr 1x denně **15 CH**

# DROSERA ROTUNDIFOLIA

## Základní klinické indikace:

- Suchý, křečovitý, noční kašel s bolestí na prsou
- Kašel v záchvatech
- Černý kašel
- Štěkavý kašel se zvracením
- Bronchiální astma
- Záchvaty kýchání, píchání v uších
- Tuberkulóza plic a kostí

Vždy používat **vyšší ředění 15 - 30 CH**



# FERRUM PHOSPHORICUM



## Původ:

- Fosforečnan železnato-železitý

## Železo

- hemoglobin
- nachází se ve všech buňkách
- účastník enzymatických procesů
- funkce při obraně proti infekci
- potřeba k růstu, během menstruace,
- v těhotenství a v době kojení

# FERRUM PHOSPHORICUM

## Obecné účinky:

- Méně intenzivní akutní a subakutní zánětlivé stavy
- Začínající nachlazení
- Se sklony ke krvácení
- S mírným zvýšením teploty
- S astenií
- Náchylnost k infekcím

## Modality:

**Zlepšení:** klidem a chladem

**Zhoršení:** v noci, horkem, pohybem



# FERRUM PHOSPHORICUM

## Doprovodné příznaky:

- červeň na čele
- postupující ohnivá červeň v obličeji, kromě nosu
- může doprovázet zvýšenou teplotu
- zapadlé oči, zejména na vnitřních koutcích

## Lokální symptomy:

- Bolest ucha
- Suchý kašel s retrosternálními bolestmi
- Pravý kloub ramene a paže



# FERRUM PHOSPHORICUM

## Obraz febrilního stavu:

- Zvýšená teplota nepřesahující 38°C
- Sklony k lokalizovanému krvácení
- Střídání bledosti se zarudlostí obličeje
- Frontálně pobolívá hlava
- Vlhká kůže, ale ne pocení

## Infekční subakutní zánětlivé symptomy:

- Počátky febrilních nebo zánětlivých stavů
- Fáze invaze v eruptivním onemocnění
- Počátky abscesů, furunkulů
- Akutní otitidy, laryngitidy, bronchitidy



# FERRUM PHOSPHORICUM

## Základní klinické indikace:

- Stavy slabosti svalů
- Typická bolest hlavy z nedostatku Fe (nesnáší sebemenší pohyb)
- Krvácení
- Nedostatek kyslíku a únava z nedostatku kyslíku
- Únava a ochabnutí svalů, např. po sportu
- Opožděná, silná, dlouhotrvající menstruace
- Pulzující bolesti na nezvyklých místech (např. konečky prstů, zuby, uši, nohy...)



# FERRUM PHOSPHORICUM

## Základní klinické indikace:

- Mrazení a třesavka v souvislosti s akutním onemocněním a při zánětech kůže
- Letní průjmy s horečkou
- Anémie z nedostatku Fe

**Náhle se vyskytující onemocnění a horečnaté stavy v počátečním stádiu.**

**Podpora hojení zánětů v počátcích, kde není příliš dramatický průběh.**



# HEPAR SULFUR

## Hepar sulfuris calcareum



### Původ:

- Směs sirného květu a vápence z ústřic
- SULPHUR+CALCAREA CARBONICA
- Našedlý prášek, téměř nerozpustný ve vodě

### Etiologické vztahy:

- Bolavé hnisání
- Infekce



# HEPAR SULFUR

## Obecné účinky:

- Zánětlivé projevy + sklony k akutním a chronickým hnisáním  
(kůže, resp. sliznice, lymf. tkáň)
- Přecitlivělost CNS (na bolest, na odporování)
- Průjem u dětí
- Pomalost, ochablost, uzavřenost
- Sebepoškozování
- Pyromanie
- Nic se dobře nehojí



# HEPAR SULFUR

## Pocity:

- Bolestivá přecitlivělost na sebemenší dotek
- Pocit zabodnutého trnu, tamponu v krku
- Bolestivé praskání v uších
- Pocení i přes den

## Modality:

**Zlepšení:** teplem

**Zhoršení:** chladem, dotekem

## Doprovodné příznaky:

- hnisavé exkrece, pocení při sebemenší námaze
- chuť na kyselé, páchnoucí nohy

# HEPAR SULFUR

## Indikace:

### Všechny akutní hnisavé procesy

Je výborným lékem na obtíže, které vznikly zpravidla po působení chladu, jsou charakteristické přecitlivělostí na bolest a zlepšují se teplem.

### **Přísná pravidla pro zvolení ředění !**

#### **nízká ředění (5 CH) podporují hnisání**

- v případě již rozvinutého stavu
- k urychlení průběhu tak, aby chirurgické řešení nebo spontánní „prasknutí“ vedlo k vyléčení obtíží („dozrání“ vřídku na kůži apod.)
- toto ředění je zcela nevhodné u „uzavřených“ zánětů, kde se hnis nemá kam hromadit (zubní záněty, záněty v uších či v dutinách apod.).



# HEPAR SULFUR

**vysoká ředění (15, 30 CH) hnisání brzdí nebo rozhánějí**

- vhodné použít v počátcích obtíží, kdy lék zánětlivé ložisko „vysuší“ a hnis se vstřebá
- **na kůži a v podkoží** – vřídky, nežidy, hnisavé ekzémy, akné se sklony k hnisání  
Dávkování: 2 x denně 5 granulí.
- **záněty spojivek** – výtok z očí je hojný, hnisavý; nemocný nesnáší chlad nebo průvan.  
Dávkování: 15 nebo 30CH, 3-4 x denně.
- **hnisavá rýma, angína, hnisavý zánět dutin**  
Dávkování: 15 nebo 30CH, 3-4 x denně.
- **bolestivé zubní záněty s přecitlivělostí k chladu**  
Dávkování: 15 nebo 30CH, 3-4 x denně



# HEPAR SULFUR

## Chronické hnisavé procesy

Charakteristické nepříjemným **zápachem hnisu**, např. u snadno krvácejících vředů na kůži, u chronických zimních zánětů dutin či chronických zánětech průdušek.

Dávkování: 15 nebo 30 CH, 5 granulí ob den.

## Respirační projevy

Záněty dýchacích cest provázené **suchým, chraplavým, štěkavým kašlem**, který vznikl **prochlazením** nebo průvanem.

Kašel může provázet **intenzivní bolest v krku** zlepšená teplým zábalem krku.

Kašel se zhoršuje chladem, chladným nápojem, v noci a k ránu. Lék podpoří vykašlávání.

Dávkování: 15 nebo 30 CH, 5 granulí 3 x denně.



# IGNATIA AMARA

*Strychnos ignatii* Bergius

## Původ:

- Boby Sv. Ignáce, pochází z Filipín
- OL: alkaloidy (strychnin a brucin), vosky, mastné oleje

## Intoxikace:

- Intoxikace vyvolává tetanizující excitaci bulbo-medulárních center, s prudkými spasmy a konvulzemi, po kterých následuje svalové uvolnění a smrt.



# IGNATIA AMARA

## Experimentace:

- Přecitlivělost všech smyslových orgánů a na emoce
- Sklony ke spasmům
- Obecná nekoordinovanost
- Myšlenková zmatenost
- Ztráta paměti
- Paradoxní a protichůdné poruchy
- Záchvaty smíchu

Smrt nastává zastavením srdeční činnosti při plném vědomí.



# IGNATIA AMARA

## Pocity:

- Přecitlivělost na bolest a pachy
- Pocit celkové slabosti (mdloba)
- Pocit knedlíku v krku
- Citlivost pravé jámy kyčelní
- Náhlé prchavé, putující bolesti
- Migréna s dojmem zatlučeného hřebíku
- Spastické zívání
- Tiky ve tváři



# IGNATIA AMARA

## Etiologické vztahy:

- Následky citových šoků, smutek, zármutek

## Profil pacienta:

- Smutný, melancholický, usoužený, uzavřený do sebe
- Vydává často hluboké vzdechy
- Snadno pláče **X** lehce přechází z pláče do smíchu a naopak
- Rychle zapomíná na své problémy, jestliže je **rozptýlený**
- Proměnlivá nálada je často paradoxní a podobná hysterii: smích může být stejně intenzivní a hlučný jako pláč
- Nářky a mdloby jsou až divadelní





# IGNATIA AMARA

## Paradoxní a protikladné poruchy, prchavé, labilní:

- lépe snáší těžko stravitelné potraviny než lehké potraviny
- bolesti krku, intenzivnější u tekutin než u pevných potravin
- nervózní hlad neutišitelný potravou: čím více jí, tím má větší chuť jíst
- hemoroidy zhoršené měkkou stolicí a naopak méně bolestivé při tvrdé stolici
- nauzea zlepšená jídlem
- spastický nervový kašel: čím více kašle, tím větší potřebu má kašlat. Kašel lze omezit silou vůle



# IGNATIA AMARA

## Modality:

**Zlepšení:** rozptýlením

teplem

hlubokým nádechem

polykáním

**Zhoršení:** kolem 11. hod ráno

nepříjemnými emocemi

utěšováním

přemýšlením o svých obtížích

silnými pachy

zármutkem



# IGNATIA AMARA

## Základní klinické indikace:

- Hyperestezie a přecitlivělost
- Reakční depresivní stavy
- Vzdechy a hysterie
- Bolest hlavy v důsledku kouření
- Děti se sklonem ke křečím
- Poruchy spánku
- Obstipace ze strachu
- Neurodermatitidy

Ignatia nachází své indikace ve všech funkčních, vybočujících, labilních, měnících se, protikladných příznacích, jejichž příčinou jsou potíže nebo stres. Emocionální otřesy nebo jimi vyvolané fyzické příznaky, poruchy chování, změny nálad, křečovitě bolesti.



# Použitá literatura:

## **HOMEOPATIE, Vztahy mezi léky**

François Chefdeville, Maryline Busser, Jean-Marc Cousin, Philippe Desobeau, Joseph Lambert, Jean Merckel, Josette Nouguez  
*2007, 379 stran, ISBN 2-915668-24-8*

## **Poznáváme homeopatii**

K. Formánová, M.Kabelková, I.Ludvíková  
Grada publishing a.s.

## **Homeopatie pro nastávající maminky**

MUDr. Ilona Ludvíková  
Homeopatická lékařská asociace