




EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5. Lekce

MATERIA MEDICA -VÝZNAMNÁ REMEDIA

Ipecacuanha, Lachesis, Lycopodium,

Mercurius solubilis



IPECACUANHA

Ceaphaelis ipecacuanha



Původ:

- Brazílie, Indie, Malajsie
- Připravována z kořene keře Hlavěnky dávivé
- OL: alkaloidy (emetin, cefaelin)

Použití:

- expektorans (reflektoricky), emetikum, při amébové dyzenterii

IPECA

Historie:

- hojně užívaná jako emetikum při otravách a jako diaforetikum
- léčba bronchitidy

Obecné účinky:

- sliznice ► podráždění
- DS a GIT ► spasmy
- GIT: nauzea, zvracení, průjem
- DS: katar, astmatiformní dyspnoe

IPECA

Zažívací symptomy:

- vlhký, **čistý** nebo **málo povleklý jazyk**
- **hypersalivace**
- **vytrvalá nauzea** s vydatným, hlenovitým, slizovitým zvracením ► nepřináší úlevu
- absence žízně
- odpor k jídlu
- krvácení jasně červenou krví s nauzeou
- koliky s křečemi (kolem pupku)
- zpěněná, zelená stolice se stopami krve

IPECA

Respirační symptomy:

- Spastický kašel s dušností, cyanózou a nauzeou
- Každé nadechnutí vyvolá kašel

Modality:

- **Zhoršení:** chladem, pohybem, vlhkem
- **Zlepšení:** venku, když zavře oči

Pocit permanentní nauzey!

IPECA

Základní klinické indikace:

- Poruchy trávení s čistým jazykem
- Těhotenská nauzea s hypersalivací
- Průjem způsobený chladem, nezralým ovocem)

Dávkování: 5 gr. 3-4x denně 9 CH

- Spastický, dávivý kašel (černý kašel)
- Katarální astma s nauzeou a zvracením

Dávkování: 5 gr. každou hodinu 9 CH

LACHESIS

Lachesis mutus



Původ:

- Křovinář němý
- Jedovatý had Jižní Ameriky
- Jeho uštknutí je ale vzhledem k nočnímu životu vzácné

Obsahové látky:

- Hadí jed obsahuje proteinázy, hemolyzin a koagulin

LACHESIS

Toxikologie po uštknutí:

- Stav šoku s masivním edémem a uvolněním **vasokonstrikčních** aminů
- Drobné hemoragie způsobené koagulopatií
- Stav celkové excitovanosti s deliriem
- Závažné postižení svalů s vaskulární trombózou a plynatou snětí
- Septické komplikace způsobené aerobními a anaerobními bakteriemi

LACHESIS

Obecné účinky:

NS: mentální excitace, hyperkomunikativnost, přehnaná upovídánost, paranoidní sklony
▶ deprese a úzkost

Smyslové: kožní, sluchová a vizuální hyperestezie

Periferní: digestivní a respirační spazmy

KVS: porucha koagulace a kongesce

- hlava, pánev, kůže a srdce
- hemoragie černou, špatně koagulovanou krví
- predispozice k infekčním stavům s výraznou sepsí (ORL, kůže, eruptivní onem.)

LACHESIS

Pocity:

- **Extrémní přecitlivělost na sebemenší dotek** a tlak spojený s nesnášenlivostí sevření na úrovni krku, hrudníku a břicha
- Přecitlivělost na světlo
- Pocit tepání a pulzace
- Svíravý pocit, pocit kulového tělesa (krk, srdce)
- Pocit dušení při usínání

LACHESIS

Modality:

Zhoršení: opožděním, nedostatečností nebo vymizením fyziologického či patologického výtoku, dotekem, sluncem, horkem, před menstruací, spánkem (noční můry o hadech a pohřbech)

Zlepšení: s nástupem výtoku
na čerstvém vzduchu

Lateralita: levostranná



LACHESIS

Doprovodné příznaky:

- Tendence k hemoragiím s černou, špatně konjugovanou krví
- Chuť na alkohol (víno), ústřice
- Střídání stavů chorobné upovídanosti s mlčením

Etiologické vztahy:

- Puberta a peri-, menopauza
- Alkoholismus
- Žárlivost
- Zklamání v lásce
- Smutek po zemřelé osobě



LACHESIS

Citlivý typ:

- Překrvený, trudovitý obličej, nafialovělé rty a červenofialový nos
- Živý, jiskrný pohled
- **Upovídanost** ► deprese ► mlčení
- Nedůvěřivá, podezíravá a kverulantská povaha
- Cyklické střídání nálady
- Hluboká úzkost (skryta za extrovertní chování)
- Osoba je schopná hněvu, násilí, agresivity (lakota)



LACHESIS

Základní klinické indikace:

Akutní

- *Stav závažné infekce nebo hnisání*
15 CH 2-4x denně
- *Hemoragie černou krví*
15 CH 5 gr. 2-4x denně
- *Angíny vlevo, purpurové sliznice, bolesti se zhoršují teplými nápoji*
9 CH co 2 hodiny

Chronické

- *Premenstruační sy*
9-30CH 5 gr. denně 20. den MS
vzestupně 9-15-30 CH 20., 21., 22. den cyklu



LACHESIS

ORL infekce:

- Angíny (pocit škrcení, obtížné polykání teplých tekutin)
- Jarní pylové alergie (tekutá rýma a kongestivní bolesti hlavy)
- Otitidy a sinusitidy se sklonem k sepsi, páchnoucí sekret

Gynekologické indikace:

- Premenstruační a intermenstruační sy, dysmenorea a nepravidelná menstruace (levý vaječník, kongesce prsou)



LACHESIS

Kožní indikace:

- Acne rosacea (ženy v menopauze, alkoholici)

Ostatní indikace:

- ↑ činnost štítné žlázy (stresem, šokem)
- Zátěžové astma
- Charakteristické ulcerace

Dávkování: 9 CH 5 gr. 1-2x denně



LACHESIS

Neuropsychické indikace:

- Záchvaty žárlivosti
- Stavy agitovanosti s duševní excitací a upovídaností
- Depresivní stavy v menopauze
- Patologický smutek po zemřelém
- Večerní nespavost (děsivé sny)
- Paranoidní stavy s předváděním, pocitem pronásledování
- Delirium

30 CH jedna dávka 1x týdně



LYCOPODIUM

Lycopodium clavatum



Původ:

- Plavuň vidlačka
- OL: acylglyceroly, nenasycené MK, minerální látky
- Užívají se výtrusy

Vlastnosti a použití:

- Spóry nemají terapeutický význam
- Chybí toxikologické účinky

LYCOPODIUM

Obecné účinky:

- Játra, žlučové cesty a celý GIT
- Ledviny (litiáza)
- Pohlavní ústrojí (deprivace)
- MTB: nutriční, mta kyseliny močové, cholesterolu
- Kůže (psoriáza, kopřivka, ekzém)
- Nervový systém (deprivace)
 - fyz. a psych. astenie
 - sklon k migrénám

LYCOPODIUM

Trávicí symptomy:

- Dyspepsie s nadýmáním
- Zrudnutí obličeje po jídle, hlad i v noci
- Dystenze dolní části těla
- Pyróza

Urogenitální symptomy:

- Načervenalé krystalické usazeniny
- Bolest při močení
- Sexuální astenie



LYCOPODIUM

Citlivý typ:

- Jedinec s živým, inteligentním pohledem
- Vypadá starší na svůj věk
- Nažloutlá pokožka, předčasné vrásky
- Předčasné šedivění a vypadávání vlasů
- Tiky v obličeji prozrazují emoce
- Hubené tělo s úzkým hrudníkem a objemným břichem
- Domácí tyran, chybí sebedůvěra, ale nesnáší odporování
- Poruchy paměti se zapomínáním, záměnou písmen (dyslexie)



LYCOPODIUM

Pocity:

- Rychle uspokojený hlad, pocit plnosti po prvních soustech
- Hlad v noci
- Jedna noha horká, druhá studená
- Výrazná chuť na sladké
- Oblíbenost teplých nápojů a jídla
- Suchá kůže
- Zrudnutí obličeje po jídle
- Averze k chlebu
- Pocit nadmutí v pase



LYCOPodium

Modality:

Zhoršení: teplem, nošením těsných oděvů, přesycením, mezi 16.-20. hodinou, při probuzení, po požití ústřic, česneku a cibule

Zlepšení: po požití horkých nápojů a jídel, zhoršení odporováním

Lateralita: pravostranná

Obecný způsob reakce:

Rodinná anamnéza- atopický terén, migrény, vřed na dvanácterníku, litiáza, urikemie



LYCOPODIUM

Osobní anamnéza- atopický ekzém, kojenecká anorexie, žloutenka, acetonemické zvracení, tiky v obličeji, dyspeptické potíže

GIT indikace:

- Dyspepsie a nafouknutí hned po jídle
- Duodenální vředy
- Acetonemické zvracení a kojenecká anorexie
- Zácpa a postprandiální koliky u kojenců
- Dyskineza žlučových cest

Dávkování: 5-9 CH 2x denně



LYCOPODIUM

Respirační indikace:

- Lék chronických rinitid se suchým ucpaným nosem v noci a tekutou rýmou přes den
- Akutní nebo opakující se angíny

Urologické indikace:

- Urolitiáza (oxaláty, uráty) – usnadňuje vylučování kaménků **9-15-30 CH**
- Chronické a benigní zbytnění prostaty **5 CH**
- Impotence se zachovanou touhou **15-30 CH**



LYCOPODIUM

Osteoartikulární indikace:

- Léčba dny

Kožní indikace:

- Chronická kopřivka
- Atopický ekzém, který při sebemenším dotyku krvácí
- Předčasná ztráta vlasů a šedivění
- Akné

Dávkování: **9-15 CH 5 gr. denně**



LYCOPODIUM

Metabolické indikace, ateromatózní terén, vaskulární poruchy:

- Poruchy metabolismu tuků
- Ateroskleróza
- Sklony k ↑ hladinám močoviny a kys. močové

Dávkování: **15 CH 1 dávka týdně**

Neuropsychické indikace:

- Dyslexie
- Stařecká mrzutost, senilita (zácpa)



MERCURIUS SOLUBILIS



Původ:

- Hahnemannova rozpustná sůl
- Šedý prášek, nerozpustný ve vodě
- Obsahuje kolem 85% rtuti

Příprava:

- Roztok dusičnanu rtuťnatého se zředěnou kyselinou, do kterého se přidá rtuť ► filtrace
► vysrážení amoniakem

MERCURIUS SOLUBILIS

Toxikologie:

Akutní otrava

- Postižení trávicího ústrojí na úrovni žaludku i střev (bolestivý průjem, krev)
- Postižení ledvin (tubulární nefritida ► anurie ► smrt)
- Postižení kůže (rtuťový erytém- horečka, proteinurie, kontaktní ekzém)
- Postižení plic (tracheobronchitida, pneumonie)

MERCURIUS SOLUBILIS

Toxikologie:

Chronická otrava

- Obecné symptomy se slabostí či agitovaností, anorexií a hubnutím, horečkou a profúzním, páchnoucím potem
- Bukofaryngeální symptomy
- Neuropsychické poruchy (třes rukou, pocit slabosti, pomalé myšlení, poruchy paměti, deprese)
- Ledvinové symptomy (záněty glomerulů a ledvin)

MERCURIUS SOLUBILIS

Patogenetický pokus a terapeutické pozorování:

- Záněty sliznic:
ORL, očních, dýchacích cest, trávicího a močového ústrojí
- Supurace kůže a kostí
- Neurologické poruchy:
třes, parézy a paralýzy

MERCURIUS SOLUBILIS

Pocity:

- Kovová pachuť v ústech
- Mrazení na povrchu kůže
- Celková slabost
- Periostální bolesti (lebka, tibie) horší v noci
- Tenezmy a pálení
- Příliš dlouhé, viklající se zuby
- Mravenčení rtů
- Třes povrchu kůže

MERCURIUS SOLUBILIS

Modality:

Zhoršení: v noci, extrémními teplotami, vlhkem, pocením teplem lůžka

Zlepšení: mírné, suché počasí

Doprovodné příznaky:

- Hnisavé, dráždivé a korozivní sekrece a exkrece
- Bukofaryngeální léze
- Viskózní, olejovité, páchnoucí pocení

MERCURIUS SOLUBILIS

Citlivý typ:

- Těžce identifikovatelný
- Dítě: s široce otevřenými fontanelami
s četnými adenopatiemi, olejovité
pocení, které v dospělosti nemizí
- Dospělý jedinec: s měkkou svalovinou
páchne tělo i dech
hodně sliní a při mluvení
prská
citlivý na průvan a vlhko

MERCURIUS SOLUBILIS

Astenický typ:


- Plachý, těžkopádný, apatický, v dětství má problémy s chápáním učiva, neumí počítat.

Stenický typ:

- Šéf bandy, perverzní, zlý, autoritářský, hádavý, krutý a impulzivní.
- Ublíží zvířatům a jiným osobám

Nervózní jedinec:

- Nevydrží ani doma ani ve škole na jednom místě
- Dítě mluví rychle-koktá



MERCURIUS SOLUBILIS

ORL indikace:

- Akutní nebo chronické tonzilitidy s červeným erytémem
- Faryngitidy s pocitem konstriktce, bolesti až do uší
- Hypersalivace (sliny na polštáři)
- Akutní nebo opakované rinitidy a rinofaryngitidy (hnisavé)
- Parotitidy
- Chronické otitidy (nažloutlý výtok z ucha)

MERCURIUS SOLUBILIS

Oční indikace:

- Blefaritidy a konjunktivitidy s dráždivým, hnisavým sekretem, zhoršené teplem a světlem

GI indikace:

- Gingivitidy (oteklé, krvácí při dotyku)
- Parodontóza
- Stomatitidy a afty s erytematózním povrchem a typickým vzhledem jazyka

MERCURIUS SOLUBILIS

Urogenitální indikace:

- Vaginitidy s žlutou, dráždivou, hnisavou leukoreou, které se zhoršují při močení a menstruaci
- Ulcerace děložního hrdla
- Uretritidy a cystitidy (bolestivé)
- Toxické nefropatie (žízeň a lehké otoky)

Dermatologické indikace:

- Kožní supurace, furunkuly (vnější zvukovod)

MERCURIUS SOLUBILIS

Dermatologické indikace:

- Superinfekce, abscesy (hnisání a pocení)
- Pruritus hnisavých, zánětlivých lézí
- Kožní ulcerace

Neurologické indikace:

- Třes (zhoršení emocemi a únavou)
- Cefalea (bolesti lebky v noci)

Použitá literatura:

HOMEOPATIE, Vztahy mezi léky

François Chefdeville, Maryline Busser, Jean-Marc Cousin, Philippe Desobeau, Joseph Lambert, Jean Merckel, Josette Nouguez
2007, 379 stran, ISBN 2-915668-24-8

Poznáváme homeopatii

K. Formánová, M.Kabelková, I.Ludvíková
Grada publishing a.s.

Homeopatie pro nastávající maminky

MUDr. Ilona Ludvíková
Homeopatická lékařská asociace