

KAZUISTIKA – KONTRACEPTIVA

Pacient: Žena, věk 35 let, nekuřačka, BMI 26, má tři děti

Laboratorní hodnoty: TK 118/75

Rodinná anamnéza: nejsou popsány rizikové faktory u matky ani u otce

Osobní anamnéza: deprese

Léková anamnéza: ethinyloestradiol 35 micrograms/norethisterone 1 mg
Citalopram 10mg 1 - 0 - 0

Přichází pro radu. Hormonální antikoncepci (HAK) začala užívat před šesti měsíci. Od té doby trpí vždy v době týdenní pauzy bez antikoncepce silnými bolestmi hlavy - migrénami bez aury.

Úkoly:

1. Proved'te analýzu preskripce léčiv, uveďte účinné látky, zařazení dle ATC klasifikace, stručný mechanismus účinku jednotlivých přípravků, zkontrolujte dávkování a způsob užívání (ráno/večer; před/po jídle atd.)
2. Vyhledejte případné interakce mezi přípravky. Mohou některá antidepresiva interagovat s HAK? Jaký je případný mechanismus této interakce?
3. Existuje souvislost mezi užíváním antikoncepce a bolestmi hlavy? Jaké nežádoucí účinky se u pacientek užívajících HAK nejčastěji vyskytují?
4. Jaké typy perorální HAK existují? Je potřeba zaměnit současnou HAK za jinou, pro tuto pacientku vhodnější, nebo pokračovat v současné?
5. Jaký typ antikoncepce byste této pacientce doporučili užívat? Jaké možnosti (lékové formy, přípravky) antikoncepce, mimo perorální, existují?
6. Který typ antikoncepce byste vybrali pro tuto pacientku jako nejvhodnější s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem a proč?
7. Jaká jsou kritéria pro výběr dlouhodobě působící antikoncepce (implantáty, nitroděložní tělíška)?

(vasutk@vfu.cz)