

KAZUISTIKA – WARFARIN

Pacient: Tibor, 65 let

Osobní anamnéza: užívá bez problémů warfarin již 12 měsíců, hypertenze, osteoartritida (náhrada kyčelního kloubu); při poslední kontrole naměřena hodnota INR 4,6

Léková anamnéza:

Warfarin 5mg	0 – 0 - 1
Atenolol AL 50mg	1 – 0 – 0
Ramil 5mg	1 – 0 - 0

Úkoly:

1. Proved'te analýzu preskripce léčiv, uveďte účinné látky, zařazení dle ATC klasifikace, stručný mechanismus účinku jednotlivých přípravků, zkontrolujte dávkování a způsob užívání (ráno/večer; před/po jídle atd.)
2. Vyhledejte případné interakce mezi léčivy.
3. Co udává hodnota INR a jaké jsou její normální hodnoty? Jak často se doporučuje ji sledovat?
4. Je nezbytné upravit dávkování warfarinu u tohoto pacienta, případně jakým způsobem?
5. Jaké znáte nebezpečné interakce warfarinu s:
 - a) OTC léčivy
 - b) doplňky stravy
 - c) potravinami
6. Jaké příznaky spojené se sníženou koagulací by měl pacient sledovat a při jejich výskytu okamžitě kontaktovat lékaře?
7. Jaká je „první pomoc“ při předávkování warfarinem?
8. Které faktory (kromě interakcí s léčivy či potravou) mohou zvyšovat riziko krvácení u pacientů užívajících warfarin?