

KAZUISTIKA – PSYCHOFARMAKA IV.

Pacient: Žena 70 let, 120 kg, extrémní obezita.

Primární (esenciální) hypertenze, úzkostně depresivní syndrom, artróza kyčelních kloubů, v minulosti plicní embolizace.

Osobní anamnéza:

Pacientka donedávna bez obtíží. Před měsícem začala užívat Monoflam Retard předepsaný ortopedem kvůli artróze kyčlí. Cca před 14 dny se začaly objevovat bolesti břicha, častý pocit plnosti a pálení žáhy. Obvodním lékařem vysloveno podezření na gastritidu.

Léková anamnéza:

<i>Psychiatr:</i>	Escitil 10mg	1x1
	Neurol 0,25mg	1 tbl. při neklidu
	Trittico AC 150mg	0 – 0 – 2/3
<i>Ortoped:</i>	Monoflam Retard 100mg	1x1

Úkoly:

1. Proveďte analýzu preskripce léčiv, uveďte účinné látky, zařazení do farmakoterapeutických skupin, stručný mechanismus účinku jednotlivých přípravků, zkontrolujte dávkování a způsob užívání (ráno/večer; před/po jídle atd.)
2. Mohou pacientčiny zdravotní potíže nějak souviset s již užívanými léčivy, pokud ano, tak jak?
3. Navrhněte možné řešení, které by jste pacientce doporučili.