

Notice du Doliprane 1000 mg, comprimé (paracétamol)

Cette notice est non contractuelle et fournie dans un but purement informatif, elle ne saurait en aucun cas remplacer la notice fournie dans la boîte de votre médicament.

Doliprane 1000 Mg, comprimé

Paracétamol

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 Mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 Mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, povidone K 30, amidon de maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

Titulaire-et exploitant.

Théraplix
46, quai de la Rapée
75590 Paris cedex 12

Fabricant.

Aventis pharma spécialités
Usine de Lisieux
BP 84183
14104 Lisieux cedex

Ou'est-ce que Doliprane 1000 Mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleurs et ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15) :

Lire attentivement la rubrique « posologie ». Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Contre-indications.

Ne pas prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé dans les cas suivants :
- allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

Prendre des précautions particulières avec Doliprane 1000 Mg, comprimé :

Précautions particulières.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.
Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre « posologie »).

Grossesse et allaitement.

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.
Veillez indiquer à votre médecin ou à votre

Notice du Doliprane 1000 mg, comprimé (paracétamol)

Cette notice est non contractuelle et fournie dans un but purement informatif, elle ne saurait en aucun cas remplacer la notice fournie dans la boîte de votre médicament.

Doliprane 1000 Mg, comprimé

Paracétamol

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 Mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 Mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, povidone K 30, amidon de maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

Titulaire-et exploitant.

Théraplix
46, quai de la Rapée
75590 Paris cedex 12

Fabricant.

Aventis pharma spécialités
Usine de Lisieux
BP 84183
14104 Lisieux cedex

Ou'est-ce que Doliprane 1000 Mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleurs et ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15) :

Lire attentivement la rubrique « posologie ». Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Contre-indications.

Ne pas prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé dans les cas suivants :
- allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

Prendre des précautions particulières avec Doliprane 1000 Mg, comprimé :

Précautions particulières.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.
Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre « posologie »).

Grossesse et allaitement.

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.
Veillez indiquer à votre médecin ou à votre

pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Attention !

Cette présentation contient 1000 Mg de paracétamol par comprimé.

Ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

Posologie.

En raison de son dosage, ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans :

- la posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 Mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

- Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 Mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

- Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 Mg par jour, soit 4 comprimés par jour. Les doses supérieures à 3000 Mg de paracétamol par jour nécessitent l'avis médical.

Ne jamais prendre plus de 4000 Mg de paracétamol par jour (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Mode d'administration.

Voie orale.

Le comprimé est à avaler tel quel avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

Si vous avez pris plus de Doliprane 1000 Mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Doliprane 1000 Mg,

comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Doliprane 1000 Mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives.

Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Pas de précautions particulières de conservation. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été

approuvée est :

Juillet 2002.

Théraplix participe à Cyclamed, association chargée de la collecte et l'élimination des déchets issus de médicaments. Nous vous demandons en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

Aventis pharma

pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Attention !

Cette présentation contient 1000 Mg de paracétamol par comprimé.

Ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

Posologie.

En raison de son dosage, ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans :

- la posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 Mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

- Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 Mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

- Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 Mg par jour, soit 4 comprimés par jour. Les doses supérieures à 3000 Mg de paracétamol par jour nécessitent l'avis médical.

Ne jamais prendre plus de 4000 Mg de paracétamol par jour (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Mode d'administration.

Voie orale.

Le comprimé est à avaler tel quel avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

Si vous avez pris plus de Doliprane 1000 Mg, comprimé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Doliprane 1000 Mg,

comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Doliprane 1000 Mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives.

Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver Doliprane 1000 Mg, comprimé ?

Pas de précautions particulières de conservation. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été

approuvée est :

Juillet 2002.

Théraplix participe à Cyclamed, association chargée de la collecte et l'élimination des déchets issus de médicaments. Nous vous demandons en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament, vide ou non.

Aventis pharma