

Poruchy příjmu potravy

PPP

Co jsou PPP?

- ◉ Duševní porucha vedoucí k tomu, že příjem potravy přestává být samozřejmou každodenní potřebou.
- ◉ Není zjištěno žádné závažné tělesné onemocnění, které by k takovému stavu vedlo.

Jak se třídí PPP

- Jako u všech duševních poruch u nás používáme v současnosti platnou klasifikaci nemocí MKN 10, kde jsou duševní poruchy v oddíle F 50.0 a dál....
- Třídění duševních poruch v současnosti není založeno na etiologii, nýbrž na pozorovatelných projevech (symptomech).

Rozdělení PPP

- ◉ Mentální anorexie (MA)
 - ◉ Mentální bulimie (MB)
 - ◉ Atypická MA či MB
-
- ◉ Psychogenní přejídání
 - ◉ Syndrom nočního přejídání

Jsou PPP „moderní“ nemocí?

- **anorexia** = nechutenství, odmítání potravy
- odmítání jídla je známo odnepaměti
- „Svaté ženy“, „zázračné panny“ ve středověku (zdánlivě žily bez příjmu potravy)
- v 17. století je poprvé popsána MA
- nemoc se nazývala „blednička“ - nemoc postihovala mladé dámy z lepší společnosti

Jsou PPP moderní nemocí?

- na poč. 20. stol. považována za poškození podvěsku mozkového (tzv. Simondsova kachexie) - protože při pitvě byly někdy nalézány změny na hypofýze.
 - Dnes tyto změny ale spíše hodnotíme jako sekundární.
- pod vlivem psychoanalýzy ve 40. letech 20. století zařazena mezi duševní poruchy

Jsou PPP moderní nemocí?

- dějiny přejídání jsou stejně dlouhé jako dějiny hladovění
- v 18. století se popisuje několik druhů bulímií
- v současné podobě se diagnostikuje od roku 1979

Obecné poznámky

- ◉ mnoho případů klinicky nerozpoznáno:
 - odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno:
 - 12% pacientů trpících mentální bulimií
 - 45% pacientů trpících mentální anorexií
- ◉ společné znaky:
 - strach z tloušťky
 - nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti

Mentální anorexie

Charakteristika

- porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti

Mentální anorexie



Mentální anorexie - chování

◉ Restriktivní typ MA

- › restrikce stravy: držení diet, zmenšování porcí, období hladovek
- › chuť k jídlu a pocit hladu je zpočátku vědomě potlačován, postupně mizí

◉ Purgativní typ MA

- › příjem jídla následovaný vyvolávaným zvracením, zneužíváním laxativ, anorektik či diuretik
- › střídají se období omezování stravy s obdobím přejídání

Mentální anorexie - chování

◉ Další symptomy

- zvýšená fyzická aktivita
- kontrolování postavy
 - prohlížením se v zrcadle, opakovaným vážením anebo naopak vyhýbání se zrcadlu a vážení
- zvýšené zabývání se jídlem
 - přísná pravidla ohledně příjmu potravy: počítání kalorické hodnoty jídel, jedení v přesných časových intervalech
 - vaření pro členy domácnosti

Mentální anorexie

– specifická psychopatologie

- Strach z tloušťky a z přibývání na váze
 - > i při těžké podvýživě
 - > stanovení si nízké cílové váhy
 - > výčitky po jídle
- Zkreslené vnímání tělesného schématu
 - > přečeňování váhy a tvaru těla
 - > zvl. hýzdí, břicha a stehen

Mentální anorexie – obecná psychopatologie

● Výkyvy nálady

- › omezení sociálních kontaktů
- › narušeno je soustředění

● Osobnostní rysy narcismu a perfekcionismu


- › pacienti popírají závažnost příznaků
- › tendence lhát a manipulovat s okolím

Mentální anorexie – dg.kritéria I

MKN-10

- Tělesná hmotnost
 - 15% pod předpokládanou či BMI pod 17,5

- Snižování hmotnosti
 - restrikcí stravy
(restriktivní typ)
 - zvracení či užívání laxativ, diuretik, anorektik
(purgativní typ)



Mentální anorexie – dg.kritéria II MKN-10

◎ Psychopatologie

- › intenzivní strach z tloušťky
- › porucha vnímání vlastního těla
 - negativní emoční hodnocení vlastního těla
- › stanovení si nízké cílové váhy

Mentální anorexie – dg.kritéria III MKN-10

◉ Endokrinní porucha

- › amenorhea (vyjma užívání HAK) – chybění 3 po sobě jdoucích menstruací
- › ztráta sex. zájmu a potence
- › opoždění či zastavení vývoje sekundárních pohlavních znaků u prepubertálních pac.
- › změny hladin sérových hormonů
 - ↑ kortizol
 - sekundární hypotyreóza

Mentální anorexie - epidemiologie

- Celoživotní prevalence

- › 0,5-2,2% u žen
 - › 0,3% u mužů

- Mnoho případů klinicky nerozpoznáno

- › odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno jen 45% pacientů

- Vývoj

- › rozvoj mezi 12-15 lety
 - › 1. hosp. nejčastěji mezi 15 a 19 lety
 - › někdy hosp. již od 9 let

Mentální anorexie

- osobnostní rizikové faktory

- ◉ Perfekcionismus (aby vše bylo tak jak má být):
 - nízké sebevědomí
 - výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce)
- ◉ Neurotická a introvertní osobnost
 - zvýšená úzkostnost, vnitřní nejistota
- ◉ Nespokojenost s vlastním tělem, kult štíhlosti

Mentální anorexie

- sociální rizikové faktory

- ◉ Opakováno vystavení nepříznivým životním událostem
 - > typická rodinná konstelace
 - dominantní a hyperprotektivní matka
 - emočně vzdálený a pasivní otec
 - > vleklé problémy v rodině
 - > tlak na výkon
 - > rivalita se sourozencem

Mentální anorexie – psychosociální příznaky

- Postupný a nenápadný začátek
 - > omezení sociálních kontaktů
 - > zvýšené zabývání se jídlem
 - vaření pro členy domácnosti
 - počítání kalorických hodnot jídel
 - > výkyvy nálady, podrážděnost
 - > snížená schopnost soustředit se
 - > zpočátku často období stupňujících se diet, zájem o „zdravou výživu“.

Mentální anorexie - průběh

- Průběh variabilní
 - > epizoda s úzdravou
 - úplná remise 19%
 - > epizody opakující se mnoho let
 - parciální remise až 60%
 - > dlouhodobý chronifikovaný průběh
 - nepříznivý invalidizující průběh 21%
- Mortalita
 - 10% (maligní arytmie, dokonané suicidium)
- u některých pacientů se vyvine mentální bulimie

Mentální anorexie - komorbidity

- Depresivní syndrom
 - sekundární příznak podvýživy
- Úzkostné poruchy
- Obsedantně kompulzivní porucha
 - vtíravé a ovládavé myšlenky na udržení podváhy
 - nutkání cvičit s excesivním cvičením

Mentální anorexie - zdravotní komplikace I

- má ze své podstaty nejvíce somatických komplikací ze všech psychiatrických diagnóz
 - > a také má nejvyšší mortalitu
- Nepřítomnost pocitů
 - > sytosti
 - neschopnost rozlišit dávku potravy
 - > hladu
 - > pocitů únavy
 - > snížená citlivost k bolestivým podnětům
- Korová atrofie
 - > porucha kognitivních funkcí („nutriční encefalopatie“) s emoční labilitou

Mentální anorexie - zdravotní komplikace II

◎ Kožní projevy

- akrocyanóza, zimomřivost
 - chladná, fialově zabarvená akra
- padání vlasů, suchá kůže a lámavé nehty
- lanugo (tváře, trup)
- Russelovo znamení
 - okrsky hyperkeratotické kůže na hřbetech prstů a dorzu dominantní ruky
- dolíčkující edémy DKK
 - z hypoproteinémie, až pozdní nález

Mentální anorexie - zdravotní komplikace III

○ Kardiovaskulární systém

- › bradykardie
 - u 94% pac.
 - až 28 tepů/min
 - 50% pod 40 tepů/min
- › snížená odpověď na fyzickou zátěž
 - snížená odpověď katecholaminů
 - snížená exprese adrenergních receptorů na srdci
 - v důsledku sekundární hypotyreózy
 - menší zvýšení tepové frekvence

Mentální anorexie - zdravotní komplikace

● Kardiovaskulární systém II

- › posturální hypotenze
- › snížená hmotnost myokardu
- › riziko maligní arytmie či akutního srdečního selhání
 - zvl. u purgativního typu MA
 - riziko minerálové dysbalance
 - příčina 1/3 úmrtí

Mentální anorexie - zdravotní komplikace V

○ GIT

- hypomotilita se zpomalením pasáže GIT
 - zpomalené vyprazdňování žaludku (pocit tíže)
 - zácpa a nadýmání
 - k úpravě motility dochází do 2 týdnů od navýšení příjmu potravy
- zbytnění slinných žláz ze zvracení či hladu
 - parotitida
- eroze zubů ze zvracení
 - ztráta skloviny a dentinu na povrchu zubů – umocněné čištěním zubů po zvracení

Mentální anorexie - zdravotní komplikace VI

- Hormonální - adaptace organismu
 - > amenorhea
 - > infertilita, ztráta sexuálního zájmu a potence
 - > změny hladin sérových hormonů
 - ↑ kortizol
 - sekundární hypotyreóza
 - snížení bazálního metabolismu

Mentální anorexie - zdravotní komplikace VII

○ Osteoporóza

- › neuroendokrinní útlum osteoblastogeneze v kostní dřeni
- › ↑ kortizolu přispívá k útlumu kostní novotvorby
- › nález u 50% pacientek na denzitometrii
- › léčba
 - spontánní úprava po navýšení hmotnosti
 - suplementace Ca a vit.D bez výraznějšího efektu

Mentální anorexie

- zdravotní komplikace VIII

- ◉ Porucha pohlavního dospívání

- › perzistující infantilní stav
 - infantilismus sexualis
 - pubertas tarda
- › nekompletní forma
 - primární amenorhea
 - menarche tarda

- ◉ Zpomalení či zastavení růstu

- › po navýšení váhy hormonální stimulace růstu

Mentální anorexie - zdravotní komplikace IX

○ Materštví

- › Perinatální komplikace
 - zvýšené riziko perinatální mortality
 - během těhotenství vyšší úzkostnost a deprese
 - častější poporodní deprese
 - vztahové problémy s novorozencí
- › Asistovaná reprodukce
 - 1/3 až 1/2 klientek s PPP
 - často klientky potíže s PPP nepřiznávají
 - před zahájením by měla být vyléčena z PPP
 - někdy neujasnění vztah k těhotenství – chtějí vyhovět partnerovi

Mentální anorexie – dif.dg.

- Onemocnění GIT

- › refluxní ezofagitida, gastritida
- › vředová choroba gastroduodenální
- › choroby pankreatobiliárního systému
- › idiopatické střevní záněty
- › celiakie, potravinové intolerance

- Malignity

- Hypermetabolické stavy

- › hypertyreóza
- › Addinosova choroba
- › DM

Mentální anorexie – léčba I

○ Ambulantní

- › praktický lékař
- › ambulantní psychiatr
- › ambulantní psycholog
- › nutriční poradce

○ Hospitalizace

- › při výrazné podvýživě (BMI až 10)
- › rychlým váhovým úbytkem
- › těžkou depresí
- › selháním ambulantní léčby

Mentální anorexie

JIP - léčba malnutrice

- ◉ Úprava nutričního stavu:

- > léčba iontových a metabolických dysbalancí
 - > léčba dehydratace

- ◉ zvýšení hmotnosti:

- > pozvolná realimentace
 - > přírůstek hmotnosti by se měl pohybovat mezi 0,5-1 kg/týden

Mentální anorexie – hospitalizace

- Režim
 - > strava 5-6x denně
 - > víkendová propustka až po:
 - navýšení váhy (1kg/týden)
 - navýšení příjmu potravy
 - > omezení pohybových aktivit – klidový režim
- Psychoterapie
 - > individuální
 - > rodinná
 - > skupinová
- Farmakoterapie
 - > léčba komorbidních poruch (afektivní, úzkostné)
 - > nutriční podpora, doplnění minerálů a vitamínů
- Rehabilitace + ergoterapie
 - > správné držení těla

Mentální anorexie – farmakoterapie

- Obecně neexistuje lék na MA!!
- Antidepresiva: mirtazapin, trazodon, SSRI
 - › terapie depresivních symptomů, OCD, úzkostných poruch
- Anxiolytika: benzodizepiny
 - › krátkodobě k překonání strachu z tloušťky, výčitek po jídle
- Antipsychotika
 - › u závažnějších těžko ovlivnitelných případů s např. excesivním cvičením, masivní úzkostí
 - › při pocitech plnosti po jídle

Mentální anorexie – psychoterapie I

○ Individuální

- › poukázat a pomoci připustit si potíže, které popírají (náhled)
- › vztah k jídlu a vlastnímu tělu, práce se strachem
- › osobnostní a interpersonální problémy

○ Rodinná

- › separační problematika
- › vztahové potíže

○ Skupinová

○ Psychoedukace

- › poukázat na somatické komplikace
- › vysvětlit růstový graf
- › edukace blízkých osob

Mentální anorexie – psychoterapie II

○ Nemoc udržující faktory

- snaha nemoc zachovat pro
 - pocit jedinečnosti zvyšuje sebevědomí
 - ceněnou hodnotu štíhlosti
 - kontrolu nad jídlem (jsou v tom lepší než ostatní)
 - potřeba poutat pozornost (sourozenecká rivalita, rozvodová situace)
- strach z přibývání na váze
 - popírá hubnoucí chování
 - není schopna připustit svou štíhlost
- formální spolupráce
 - ke změně jsou ambivalentní
 - své postoje rychle a často mění
 - sdělují to, co se od nich očekává

Mentální anorexie – psychoterapie III

- Změna jídelního chování závisí na osobnostní struktuře
 - schopnosti zvládat stres a obtížné emoce
 - zvládnutí nepřiměřených ambicí
 - vyřešení vztahových problémů

Mentální bulimie

Charakteristika

- ◉ opakující se záхватy přejídání, spojené s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti, doprovázené pocitem ztráty kontroly nad příjmem potravy

Mentální bulimie - chování

◉ Bulimické epizody

- záхватovité přejídání
 - ztráta kontroly na příjmem jídla
- následuje vyvolávané zvracení
- příjem potravin s vysokou kalorickou hodnotou (pečivo, sladkosti), konzumované rychle a v tajnosti

◉ Obdobné chování jako pac. s MA

- restrikce stravy, zneužívání laxativ
- zvýšená fyzická aktivita, kontrolovaní postavy

Mentální bulimie – dg. kritéria

- Neustálé zabývání se jídlem
 - › neodolatelná touha po jídle
 - › epizody přejídání velkých dávek jídla
- Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla
 - › období hladovění
 - › vyprovokované zvracení
 - › laxativa, anorektika, diuretika
- Chorobný strach z tloušťky
 - › váhový práh

Mentální bulimie – epidemiologie

- Celoživotní prevalence
 - › 1,1-2,8% u žen
 - › 0,1-0,2% u mužů
- Mnoho případů klinicky nerozpoznáno
 - › odhaduje se, že praktickými lékaři je odhaleno pouze 12% pacientů
- Počátek
 - › mezi 16 a 25 lety (později než u MA)

Mentální bulimie

– obecná psychopatologie

● Impulzivní typ

- Impulzivita - nedostatek rozvahy, jednají bez přemýšlení:
 - pocit snížené sebekontroly, nezdrženlivost
 - snaha redukovat nepříjemné pocity
 - sebeobviňování, stud
- склони k
 - alkoholismu, užívání drog (časté předávkování)
 - sebepoškozování, suicidální pokusy
 - sexuální nezdrženlivost, drobné krádeže
- v anamnéze
 - větší deprese, afektivní labilita, hraniční porucha osobnosti
 - sexuální zneužívání

Mentální bulimie – psychopatologie

- ◉ Kompulzivní typ: časté předchorobí MA
 - Perfekcionismus (aby vše bylo tak jak má být):
 - nízké sebevědomí
 - výkonové zaměření - být nejlepší (zhubly nejvíce)
 - Obsedantně-kompulzivní osobnost (zvýšeně úzkostná, vnitřní nejistota):
 - myšlenky na jídlo
 - excesivní cvičení
 - Nespokojenost s vlastním tělem, kult štíhlosti

Specifické typy MB

- v DSM-IV rozlišení 2 základních typů:
 - purgativní (zvrací)
 - nepurgativní (nezvrací) – přísné diety, hladovky, cvičení
- diferenciální diagnóza oproti mentální anorexii:
 - nepřítomnost závažnějšího úbytku tělesné hmotnosti u mentální bulimie
 - nepřítomnost trvalé amenorhey u mentální bulimie
- častá komorbidita:
 - závislost na alkoholu (impulzivní chování)
 - hraniční porucha osobnosti

Mentální bulimie – zdravotní komplikace

○ Minerálový rozvrat

- › excesivním zvracením, užíváním diuretik, přepíjením
- › tetanie, epileptoformní záchvaty
- › arytmie, náhlá srdeční smrt

○ Zvracení

- › eroze zubů
- › esofagitida

Průběh a prognóza

- průběh variabilní:
 - > jediná epizoda s úplnou remisí
 - > dlouhodobý chronický průběh
 - > epizody opakující se mnoho let
- průběh choroby je dlouhodobý, abnormalní stravovací návyky přetrvávají často několik let, avšak vyjádřeny s různou intenzitou
- o chronicitě se hovoří při trvání choroby více než 10-15 let
- dlouhodobě příznivější průběh než anorexie, většina pacientů se uzdraví, mortalita není zvýšena

Mentální bulimie – léčba I

- ◉ Velká část nevyhledá odbornou pomoc
 - > hospitalizace až u závažnějších případů
 - > přichází pro depresi, po parasuicidiích
- ◉ Psychoterapie
 - > účinná KBT
- ◉ lepší nosognose, častěji bývají motivovaní ke spolupráci, přejí si uzdravení
- ◉ většinou chybí kachexie, není tedy nutnost zvyšování hmotnosti

Mentální bulimie – farmakoterapie

○ Antidepresiva

- › ve vyšších dávkách než u léčby samotné deprese (Fluoxetin, Fluvoxamin)

○ Účinek

- › snížení četnosti přejídání a zvracení
- › účinný na komorbidity (deprese, úzkostné poruchy)

PPP – zneužívání laxativ

- zneužívána k
 - › léčbě chronické zácpys
 - › snížení hmotnosti
- výskyt
 - › přiznává 10% pacientů
 - › odhadováno u 50% pacientů
- při delším abusu akcentace zácpys
- léčba
 - › nevysadit naráz
 - zhoršení zácpys, nadýmání, bolesti břicha
 - náhlý přírůstek hmotnosti z retence tekutin a solí s otoky
 - › postupné snižování dávky

PPP u DM

- 2,3x vyšší riziko rozvoje PPP zvl. u DM I
- projevem noncompliance v léčebném režimu DM
 - mentální anorexie
 - omezování dávek inzulinu i jídla
 - „diabulimie“ (až u 30% DM I)
 - omezování dávky inzulinu s epizodami přejídání
 - váhový úbytek i přes větší příjem potravy
 - nevysvětlitelné hyperglykémie
 - polyurie, frekventní močení
 - psychogenní přejídání: 10-20x častější u DM
- prevence
 - zaměřovat se na výběr potravin, ne jen omezování
 - ověřit že jídelníček obsahuje oblíbené potraviny
 - vyhnout se negativnímu emočnímu hodnocení
 - na „špatné“ potraviny a jídelní chování
 - používat pozitivní motivaci

Psychogenní přejídání

- Opakování epizody přejídání bez hladovek nebo zvracení.
- Během jednoho záchvatu člověk zkonzumuje velké množství potravin (i ty jež mu běžně nechutnají), přestože nemá hlad ani chuť.
- Záchvat bývá vyprovokován přítomností jídla, situací, pocitem napětí, stresu, úzkosti.
- Pocit ztráty kontroly nad jídlem.
- Rychlosť polykání, pocit že nemohou ovlivnit množství snězeného jídla, nemohou přestat jíst, ani když jsou nepříjemně sytí.
- Po přejezení pocit viny, zahanbení ze ztráty sebekontroly, nezvládání vlastního života.
- Více postihuje ženy, často začíná ve vyšším věku.

Atypické a nespecifické poruchy příjmu potravy

- ◉ forma, kdy pacienti nesplňují všechny příznaky (resp. subklinická forma):
 - chybí jeden nebo více základních příznaků poruchy
 - vykazují však téměř typický klinický obraz
- ◉ častý rozvoj kompletních příznaků choroby
- ◉ Atypická mentální anorexie F50.1
- ◉ Atypická mentální bulimie F50.3

Jiné poruchy příjmu potravy

- ◉ **pika** (=pojídání nestravitelných předmětů) neorganického původu v dospělém věku
- ◉ **psychogenní** ztráta chuti k jídlu

Závěry – epidemiologie

Krch et al...

- Většina děvčat neví, jaká je jejich přiměřená tělesná hmotnost, jen obtížně se smířují s tím, že tělesná hmotnost vzrůstá v závislosti na věku a výšce.
- Už ve starším školním věku velká část děvčat pokládá některá dietní omezení za samozřejmá a neví jak by měl vypadat přiměřený jídelní režim bez dietních omezení a strachu z tloušťky.


Závěry – epidemiologie


Krch et al....




- Velkou částí dospívajících je zvracení akceptováno jako možný prostředek kontroly tělesné hmotnosti, mnoho dívek užívá kouření (42% snažících se zhubnout a 26% ostatních) jako způsob kontroly těl. hmotnosti.
- Přibývá nemocných napříč sociálním spektrem (věk, místo, bydliště, typ studia a soc. status).
- V hubnutí celkem umírnění chlapci jsou schopni stále více obětovat a riskovat pro dosažení atraktivního těla.

Internet - nebezpečí

- Existují stránky jako „StarvingForPerfection“ nebo „BeautifulByBones“, ve kterých se „čtenáři“ navzájem podporují a vytváří určitý druh komunity oslavující „tělesnou image, vyhublost, hladovění, sebekontrolu a různé dietní způsoby“.
- Podle S. Bloomfielda (EDA) jsou tyto stránky nesmírně nebezpečné, protože mají nemocné utvrdit ve víře, že nejsou nemocní a nabízí jím smrtonosné návody.
- „Nehezké tělo znamená nehezkého člověka.“
 - demagogická hesla








	Většinou ano	někdy	Většinou ne
Mám hrůzu z nadváhy, i když objektivně nejsem tlustý/á, mohu se tak ale cítit.	2	1	0
Vyhýbám se jídlu, když mám hlad.	2	1	0
Před jídlem se mne často zmocňuje úzkost.	2	1	0
Vynechávám některé hlavní jídlo, nebo kategorie potravin.	2	1	0
Po jídle se cítím provinile.	2	1	0
Cítím, že ostatní mě nutí do jídla.	2	1	0
Usilovně cvičím, abych spálil/la energii.	2	1	0
Mám rád/a prázdný žaludek.	2	1	0
Snadno se cítím přejedený/ná.	2	1	0
Cítím, že jídlo ovládá můj život.	2	1	0

Orientační test jídelních zvyklostí – do 5 bodů norma, + doplňující otázky


VI

PŘÍČINY VZNIKU PORUCH PRÍJMU POTRAVY



PORUŠENÉ TĚLESNÉ SCHÉMA

nemocná dívka svoji postavu vidí jako číslo 5 až 6, i když ostatní ji vidí jako 2 nebo 3



B

MÝTY A OMYLY anorexie

takto může argumentovat nemocná dívka

Argument: Nesmím jíst, byla bych tlustá.

Odpověď: Nedá se nic dělat, bez jídla žít nelze, jídlo k životu nutně potřebujeme.

Argument: Lidé mě posuzují podle toho, jak vypadám.

Odpověď: Ano, je to možné, že se ti to stává, ale vzhled není nejdůležitější. Posuzuješ také ostatní své kamarády podle toho, jak vypadají? Přestala by ses bavit s nějakou kamarádkou jen proto, že přibrala jeden nebo dva kilogramy?

Argument: Chci mít aspoň nad něčím ve svém životě kontrolu a v jídle ji mám.

Odpověď: Společně s rodiči, s odborníky, s kamarádkou ... dokážeš najít sílu kontrolovat svůj život ne skrz jídlo, ale skrz své myšlenky, nápady, radosti, koníčky, záliby apod. Pojd', vyhledáme odbornou pomoc.

Argument: Mužům se líbí jenom hubené ženy.

Odpověď: Každý muž si vybírájinou ženu, a muži si nevybírají ženy zdaleka jen podle postavy. Zeptej se svého otce, bratra, kamaráda ..., jaké se právě jemu líbí ženy. Udělej si vlastní anketu ...

Argument: Nepotřebuji jídlo k životu.

Odpověď: Každý z nás potřebuje jídlo k životu, nejsi v tomto jiná. Jídlo obsahuje látky nutné k fungování organismu, bez nich se neobejdeme, nedá se nic dělat.

Argument: Neumím normálně jíst, nevím, co je normální porce, nezvládnu to.

Odpověď: Můžeš se naučit jíst 5x denně, pravidelně, normální porce, po kterých nepřiberes, udržíš si stálou váhu pro tvůj organismus nezbytnou. Pojd'me si to vyzkoušet spolu.

C

MÝTY A OMYLY bulimie

takto může argumentovat nemocná dívka

Argument: Jsem odporná, když se přejídám a pak zvracím.

Odpověď: Není na tom nic odporného, jde o projev nemoci, kterou je potřeba léčit. Neodsuzuj se, jen to zvyšuje tvůj pocit viny a negativní myšlenky vůči sobě samé.

Argument: Nemůžu to nikomu říct, nepochopil by mě a hnusila bych se mu...

Odpověď: Jedině tehdy, když se někomu svěříš, když vyhledáš pomoc u svých blízkých nebo u odborníka, může se stav zlepšovat. Z nemoci se nelze probudit do druhého dne bez problémů zdravá jako rybička, aniž bys pro to nic neudělala.

Argument: Nesmím to jíst, je to sladké, tučné, příliš kalorické, přibrala bych, tak raději zvracím.

Odpověď: Lidé kolem tebe ti pomohou, když se o tvých potížích dozvědí, když se jim svěříš, když budeš mít v jejich pomoc důvěru a budeš se snažit jíst společně s nimi.

Argument: To, co sním, ve mně zůstává, budu tlustá.

Odpověď: Existuje zákon o příjmu a výdeji. Tvé tělo spotřebuje energii z jídla k životu.

Argument: Nemohu jíst před ostatními.

Odpověď: Přítomnost druhých je pomáhající. Pomohou ti nepropadnout záchravu přejedení nebo zvracení.

Argument: Když zvracím, tak nepřibírám, mohu klidně jíst to, co chci a na co mám chuť. Zůstanu přitom štíhlá a všichni mne budou obdivovat.

Odpověď: Zpočátku nepřibíráš, máš pravdu, ale později se tělo začne bát, že bude stále hladovět a stále zvracet a začne si vytvářet zásoby. Navíc zvracením se nezbavíme všeho, co jsme snědli.

Argument: Neumím normálně jíst, nevím, co je normální porce, nezvládám to, myslím jen na to pitomé jídlo.

Odpověď: Normální je jíst pětkrát denně, tři hlavní jídla a dvě menší svačinky mezi nimi. Vůbec nic se nestane, když se naučíš jíst i druhou večeři. Tvá váha se ustálí na takové hodnotě, která je zdravá a přirozená pro tvé tělo, tvoji tělesnou výšku a věk.

- Anabell, o.s. – sociální poradenství pro nemocné anorexií a bulimií. www.anabell.cz
- Poradny a kliniky: Poradna podpory zdraví. Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Stará 25; Psychiatrické kliniky Brno, Praha.
 - › Jednotka specializované péče pro poruchy příjmu potravy. Psychiatrická klinika 1. LFUK Ke Karlovu 11, Praha 2; Dětská psychiatrická klinika FN Motol V Úvalu 84, Praha 5; dospělí i děti PK Brno, Jihlavská 20.
- Krizové centrum - Psychiatrické kliniky Brno, Praha.
- Linka naděje - Psychiatrické kliniky Brno, Praha.

Kde doporučit pomoc?

Děkuji za pozornost.

Literatura:

- Krch FD et al.: Poruchy příjmu potravy, Grada, 1999
- Smolík P: Duševní a behaviorální poruchy, Maxdorf, 2002
- Papežová H et al.: Spektrum poruch příjmu potravy, Grada 2010
- Treasure J et al.: Eating disorders, Lancet 2010; 375:583-93
- WHO: Duševní poruchy a poruchy chování, Psychiatrické centrum Praha 2000
- VOMASTEK.P. Z deníku anorektika. Praha: Tomáš Hruška, 2000.
- SLADKÁ, ŠEVČÍKOVÁ. Z deníku bulimičky. Praha: Portál, 2003.