

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Phemiton 200 mg tablete metilfenobarbital

Što je Phemiton i za što se koristi?

Phemiton sadrži djelatnu tvar metilfenobarbital te pripada skupini lijekova koji se nazivaju barbiturati. Barbiturati spadaju u skupinu lijekova koji se nazivaju antiepileptici (lijekovi koji se koriste u liječenju epilepsije). Phemiton se koristi u liječenju epileptičkih napadaja: toničko-kloničkih napadaja (tzv. grand mal) i apsans napadaja (tzv. petit mal).

Što morate znati prije nego počnete uzimati Phemiton?

Nemojte uzimati Phemiton:

- ako ste alergični na metilfenobarbital, druge barbiturate ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate porfiriju (poremećaj sinteze hemoglobina)
- ako imate znatno narušenu funkciju jetre ili bubrega
- u stanjima senilnosti, alkoholiziranosti i pri drugim zlouporabama lijekova ili s poviješću takve zlouporabe
- u hiperaktivne djece.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Najčešće zabilježene nuspojave su omaglica, pospanost i depresija središnjeg živčanog sustava. Pri visokim dozama mogu se javiti nistagmus (nevoljni pokreti očiju), ataksija (smetnje ravnoteže) i prestanak disanja. Mogu se javiti mialgija (bol u mišićima), neuralgija (vrlo jaka bol u području nekog živca) i artralgija (bol u zglobovima). Ponekad se mogu javiti promjene raspoloženja u smislu depresije i poremećaj cirkulacije sa smanjenjem krvnoga tlaka, usporenjem rada srca i gubitkom svijesti. Teže reakcije preosjetljivosti poput angioedema (lokaliziranog otoka, najčešće u području lica), ekfolijativnog dermatitisa (upala i ljuštenje kože), Stevens-Johnson sindroma (teški, potencijalno po život opasni osip kože s ranama na sluznici probavnog sustava i spolnih organa) i toksične epidermalne nekrolize (potencijalno po život opasno ljuštenje velikih dijelova kože) su vrlo rijetke.