

Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory

|

Vojtěch Kovář

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Botanická 68a, 602 00 Brno, Czech Republic
xkovar3@fi.muni.cz

část 2

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

1 / 22

Obsah přednášky

Obsah přednášky

Matematická logika

Výroková logika

Něco z predikátové logiky

Matematická indukce

Matematická logika – motivace

► Jazyk matematiky

- přirozený jazyk je víceznačný
- „k jednání X na úřadě YZ potřebujete pas a řidičský průkaz nebo občanský průkaz“
- matematická fakta potřebujeme zapisovat přesně

► Formalizace pojmu důkaz

- důkaz = posloupnost elementárních kroků
- to, co je „elementární“ je individuální
- logika zavádí přesnou definici elementárního kroku

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

3 / 22

Výroková logika Výroková logika

Výroková logika

► Výrok

- základní jednotka
- tvrzení, jemuž lze přiřadit pravdivostní hodnotu
- např. „a = 1“, „4 je prvočíslo“

► Pravdivost

- přiřazení hodnoty 0 nebo 1 každému výroku
- zapisujeme $v(A) = 1$ („výrok A platí“)
- $v(A) = 0$ („výrok A neplatí“)

► Logické funkce

- konstrukce složitějších výroků z výroků jednodušších

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

5 / 22

Výroková logika Logické funkce

Logické funkce (2)

► Odvozené logické funkce

- konjunkce $A \wedge B$ (logické „a“)
- $v(A \wedge B) = 1$, je-li $v(A) = 1$ a $v(B) = 1$
- $v(A \wedge B) = 0$ v ostatních případech
- disjunkce $A \vee B$ (logické „nebo“)
- $v(A \vee B) = 0$, je-li $v(A) = 0$ a $v(B) = 0$
- $v(A \vee B) = 1$ v ostatních případech
- ekvivalence $A \Leftrightarrow B$
- $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

Obsah přednášky

Obsah přednášky

Matematická logika

Výroková logika

Něco z predikátové logiky

Matematická indukce

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

7 / 22

Obsah přednášky

Typy logik

► Výroková logika

- výroky, logické funkce, pravidlo modus ponens

► Predikátová logika

- predikáty, kvantifikátory

► Další typy logik

- modální, temporální, fuzzy, intenzionální, ...
- nebude se jimi zabývat

► Naším cílem je naučit se logiku prakticky používat

- → číst a psát
- nikoli zkoumat její temná zákoutí (viz předmět „Matematická logika“ na FI)

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

4 / 22

Výroková logika Logické funkce

Logické funkce (1)

► Základní logické funkce

- nechť A, B jsou výroky
- negace $\neg A$
- $v(\neg A) = 0$, je-li $v(A) = 1$
- $v(\neg A) = 1$, je-li $v(A) = 0$
- implikace $A \Rightarrow B$
- $v(A \Rightarrow B) = 0$, je-li $v(A) = 1$ a $v(B) = 0$
- $v(A \Rightarrow B) = 1$ v ostatních případech
- kombinací těchto funkcí lze vyjádřit všechny ostatní logické funkce

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

6 / 22

Výroková logika Odvozování

Odvozování

► Schémata axiomů

- pro libovolné výroky A, B, C platí
- $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
- $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$
- $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$
- dosazením konkrétních výroků vzniknou **axiomy**

► Odvozovací pravidlo modus ponens

- pokud platí A a platí $A \Rightarrow B$, pak platí B

► Formální definice důkazu

- posloupnost výroků, z nichž každý je buď axiom nebo výsledek aplikace odvozovacího pravidla na předchozí výroky

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

8 / 22

Příklad důkazu: $X \Rightarrow X$

► Schémata axiomů

- ▶ $A \Rightarrow (B \Rightarrow A)$
- ▶ $(A \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow (A \Rightarrow C))$
- ▶ $(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

► Dokazujeme, že pro libovolný výrok X platí $X \Rightarrow X$

1. $(X \Rightarrow ((X \Rightarrow X) \Rightarrow X)) \Rightarrow ((X \Rightarrow (X \Rightarrow X)) \Rightarrow (X \Rightarrow X))$ / axiom 2
2. $X \Rightarrow ((X \Rightarrow X) \Rightarrow X)$ / axiom 1
3. $(X \Rightarrow (X \Rightarrow X)) \Rightarrow (X \Rightarrow X)$ / aplikace modus ponens na 2. a 1.
4. $X \Rightarrow (X \Rightarrow X)$ / axiom 1
5. $X \Rightarrow X$ / aplikace modus ponens na 4. a 3.

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

9 / 22

Něco z predikátové logiky

► Ohodnocení proměnných

- ▶ formule („výroky“) mohou obsahovat proměnné ($x = 1$)
- ▶ pravdivost pak závisí na ohodnocení, tj. přiřazení hodnot proměnným

► Kvantifikátory

- ▶ \exists – existuje alespoň jedno ohodnocení, při kterém formule platí
- ▶ \forall – výrok platí pro všechna možná ohodnocení
- ▶ např.: $\exists x(x = 0 \wedge x = 1)$

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

9 / 22

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

10 / 22

Něco z predikátové logiky (2)

► Funkční symboly

- ▶ kombinují objekty, se kterými zacházíme (množiny, čísla)
- ▶ výsledkem je další objekt
- ▶ např. plus, množinové sjednocení
- ▶ např. $+(x, y)$, resp. $x + y$

► Predikáty

- ▶ vyjadřují fakta o konstantách a proměnných
- ▶ výstupem je pravdivostní hodnota
- ▶ např. $\text{Prime}(x)$ – „ x je prvočíslo“
- ▶ např. $\in(x, Y)$, resp. $x \in Y$ – „prvek x patří do množiny Y “

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

11 / 22

Matematická indukce

► Obecný matematický princip

- ▶ použitelný pro definice, důkazy
- ▶ napřed vyrábíme/dokážeme něco jednoduchého
- ▶ → **báze indukce**
- ▶ pak vyrábíme z obecného jednoduchého objektu o krok složitější objekt
- ▶ případně dokážeme, že z platnosti pro jednoduchý objekt vyplývá platnost pro složitější objekt
- ▶ → **indukční krok**
- ▶ tím dostaneme nekonečnou řadu definic/důkazů

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

13 / 22

Induktivní definice (2)

► Bází může být víc

- ▶ Fibonacciho posloupnost: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
- ▶ báze indukce: $a_1 = 0$
- ▶ báze indukce: $a_2 = 1$
- ▶ indukční krok: $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

► Indukčních kroků může být víc

- ▶ definice toho, jak vypadá správná výroková formule
- ▶ báze indukce: libovolný jednoduchý výrok A je výroková formule
- ▶ indukční krok: pokud A je výroková formule, pak $\neg(A)$ je výroková formule
- ▶ indukční krok: pokud A a B jsou výrokové formule, pak $(A \Rightarrow B)$ je výroková formule

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

15 / 22

Něco z predikátové logiky (3)

► Příklady složitějších formulí

- ▶ $\exists x(\exists k(x = 2k + 1) \wedge \exists m(x = 2m))$
- ▶ $\forall x(\text{Prime}(x) \Rightarrow \exists k(x = 2k))$
- ▶ $\exists x(\text{Prime}(x) \wedge \exists k(x = 2k))$
- ▶ dokážete je přečíst?

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

11 / 22

Induktivní definice

► Báze indukce

- ▶ definujeme nejjednodušší prvky

► Indukční krok

- ▶ popíšeme, jak se z jednodušších prvků vyrobí složitější

► Příklad: induktivně definované posloupnosti

- ▶ definujeme nekonečnou posloupnost 3, 5, 7, 9, ...
- ▶ báze indukce: $a_1 = 3$
- ▶ indukční krok: $a_{n+1} = a_n + 2$

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

14 / 22

Důkaz matematickou indukcí

► Princip

- ▶ potřebujeme dokázat, že pro všechny prvky nějaké posloupnosti x_0, \dots, x_n, \dots platí nějaký výrok A
- ▶ $\forall n(A(x_n))$
- ▶ dokážeme výrok pro x_0
- ▶ → **báze indukce**
- ▶ dokážeme, že pokud výrok platí pro x_{i-1} , pak platí i pro x_i pro libovolné i
- ▶ $A(x_{i-1}) \Rightarrow A(x_i)$
- ▶ → **indukční krok**
- ▶ levá strana implikace výše se nazývá **indukční předpoklad**

Vojtěch Kovář (FI MU Brno)

PLIN004

část 2

16 / 22

Příklad indukce

► Dokážeme, že pro všechna přirozená $n \geq 1$ platí:

$$\blacktriangleright 1 + 2 + \dots + n = n/2 * (1 + n)$$

► Báze

$$\blacktriangleright 1 = 1/2 * (1 + 1)$$

► Indukční krok

$$\blacktriangleright \text{předpokládáme: } 1 + 2 + \dots + k = k/2 * (1 + k)$$

$$\blacktriangleright \text{dokážeme: } 1 + 2 + \dots + k + (k+1) = (k+1)/2 * (1 + (k+1))$$

Příklad indukce (2)

► Indukční krok

- předpokládáme: $1 + 2 + \dots + k = k/2 * (1 + k)$
- dokážeme: $1 + 2 + \dots + k + (k+1) = (k+1)/2 * (1 + (k+1))$
- $1 + 2 + \dots + k + (k+1)$
- $k/2 * (1 + k) + (k+1)$
- $(k + k^2)/2 + (k+1)$
- $(k + k^2 + 2k + 2)/2$
- $(k^2 + 3k + 2)/2$
- $(k + 2) * (k + 1)/2$
- $(k + 1)/2 * (k + 2)$
- $(k + 1)/2 * (1 + (k + 1))$

Proč to funguje?

► Intuitivní ověření korektnosti

- báze \rightarrow platí $A(x_0)$
- indukční krok \rightarrow platí $(A(x_0) \Rightarrow A(x_1))$
- modus ponens \rightarrow platí i $A(x_1)$
- indukční krok \rightarrow platí $(A(x_1) \Rightarrow A(x_2))$
- modus ponens \rightarrow platí i $A(x_2)$
- atd. ad infinitum

► Formální důkaz korektnosti matematické indukce

- existuje, ale nad rámec předmětu

Složitější typy indukce (1)

► Složitější indukční předpoklad

- např. platí $A(x_{i-1})$ i $A(x_{i-2})$
- musíme dokázat odpovídající bázi
- tj. $A(x_0)$ i $A(x_1)$

Složitější typy indukce (2)

► Strukturální indukce

- aplikujeme na induktivně definované objekty (např. výrokové formule)
- báze indukce: věta platí pro jednoduché výroky
- indukční krok 1: věta platí pro formuli A
 \Rightarrow platí i pro $\neg(A)$
- indukční krok 2: věta platí pro formule A a B
 \Rightarrow platí i pro $(A \Rightarrow B)$

► Princip zůstává stejný, pouze vedení důkazu je komplikovanější

► Důkaz, že každá formule podle definice výše má sudý počet závorek?

Všichni koně mají stejnou barvu

► **Věta:** V každém stádě mají všichni koně stejnou barvu.

► **Důkaz:** indukci vzhledem k velikosti stáda

- **báze:** Ve stádě o 1 koni mají všichni stejnou barvu.
- **indukční krok:** Předp., že věta platí pro dvě stáda o n koních; dokážeme, že platí pro stádo o velikosti $n + 1$
- $S_1 = \{K_1, \dots, K_n\}$, $S_2 = \{K_2, \dots, K_{n+1}\}$
- podle předpokladu mají v S_1 i v S_2 všichni koně stejnou barvu
- koně K_2, \dots, K_{n+1} jsou v obou stádech \Rightarrow i barva obou stád je stejná
- tedy i ve stádě $S = \{K_1, \dots, K_{n+1}\}$ mají všichni koně stejnou barvu

► **Kde je problém?** (zřejmě existují různí koně :))