

## **GEOSTATISTIKA - cvičení č. 3: Statistický popis prostorového uspořádání bodů**

### **Zadání:**

Charakterizujte prostorové uspořádání 20-ti sídel s nejvyšším počtem obyvatel ve vám zvoleném okrese. Otestujte, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi vámi zjištěným uspořádáním a uspořádáním náhodným.

Pomocí vhodné charakteristiky popište, k jakému z teoretických rozložení (shlukové či pravidelné) se vámi zjištěné uspořádání blíží (udejte statistickou významnost). Stručně interpretujte hodnoty vypočtených charakteristik.

K hodnocení prostorového uspořádání sídel použijte těchto metod

- Kvadrátová analýza (ArcView 3.2)
- Analýza nejbližšího souseda (ArcView 3.2 nebo ArcMap)

### **Poznámky:**

- Využijte datových souborů vytvořených v cvičení 1.
- K vypracování v prostředí ArcView využijte projektu Ch3.apr, který naleznete na disku E: ([DATA](#)) ve složce [Geostatistika\Cviceni\\_3](#))
- Výše uvedené prostorové statistiky naleznete v nabídce **Point patterns**.
- **Quadrat analysis** – nejprve je nadefinována síť kvadrátů (čtverců). Tato síť se přeloží přes studovanou oblast. Pro nadefinování síť musíte určit počet buněk v síti. **První varianta:** vyzkoušejte výpočet, kdy počet buněk je roven přibližně polovině počtu bodů. **Druhá varianta:** vyzkoušejte postup, kdy velikost jedné buňky a počet buněk jsou odvozeny z následujících vztahů: Optimální velikost kvadrátů (QS) lze získat ze vztahu:

$$QS = \frac{2 \cdot A}{n}$$

kde  $A$  je plocha studované oblasti a  $n$  počet analyzovaných bodů.

Velikost strany jedné buňky je potom

$$\sqrt{2A/n}$$

- Dále vypočtené statistiky mají následující význam: **Length** – délka strany buňky, dále počet řádků a sloupců sítě. **Lambda** – průměrný počet bodů ve čtverci. Následně **četnosti** bodů v buňkách (frequency), hodnota **rozptylu** (variance), hodnota **poměru** (rozptyl/průměr), **testovací kritérium K-S testu**. Poté následuje volba hladiny významnosti (volte 0,05) a nakonec **kritická hodnota K-S testu** pro zvolenou hladinu významnosti.
- Interpretace: Stejně jako v obecném postupu testování porovnáváte vypočtené a kritické hodnoty testovacího kritéria. Je-li vypočtená hodnota vyšší než kritická, potom se dané uspořádání bodů statisticky významně liší (na zvolené hladině) od uspořádání náhodného.

- **Ordered Neighbour Statistics** – analýza nejbližšího souseda. Metoda je založena na porovnání pozorované průměrné vzdálenosti mezi nejbližšími sousedy ( $r_{obs}$ ) a průměrné vzdálenosti u známého vzorku (pattern) – tedy očekávané ( $r_{exp}$ ). Pozorovaná průměrná vzdálenost mezi nejbližšími sousedy může být větší či menší než vzdálenost při náhodném rozmístění bodů. Používaná statistika je poměrem výše uvedených vzdáleností:

$$R = \frac{r_{obs}}{r_{exp}}$$

#### Interpretace R-statistiky:


Čím je hodnota  $R < 1$ , tím více se prostorové rozložení bodů blíží rozložení shlukovému ( $r_{obs} < r_{exp}$ ).

Čím je hodnota  $R > 1$ , tím více se prostorové rozložení bodů blíží rozložení pravidelnému ( $r_{obs} > r_{exp}$ ).

- **K významu vypočtených parametrů:** Program poskytuje hodnoty vypočtené a očekávané nejbližší vzdálenosti, dále R-statistiku. Standardizovaná hodnota ( $Z_R$  z-score) slouží k testování statistické významnosti:

Je-li  $Z_R < -1,96$  či  $Z_R > 1,96$  potom vypočtený rozdíl mezi pozorovaným a náhodným uspořádáním je statisticky významný – tedy není náhodný a naopak.

Zadaný úkol vyřešte metodou nejbližšího souseda také v prostředí ArcMap. Metodu lze spustit pomocí ArcToolbox – Spatial Statistics Tools – Analyzing Patterns – Average Nearest Neighbour (viz. obr.).



V jakých situacích by bylo vhodné využít různých metod výpočtu vzdálenosti (Distance Method)? Jakým způsobem ovlivňuje výsledky nastavení parametrů prostředí (Environment settings)? **Výsledkem cvičení** je mapa obsahující vstupní datové vrstvy, vypočtenou prostorovou statistiku, veškeré náležitosti mapové kompozice (název, měřítko, legenda, ...) a dále slovní vyhodnocení úkolu.