




Tvary bakteriálních buněk



Morfologie kolonií

Barvení buněk

Interpretace Gramova barvení




Elizabeth Morales
 illustration/art development for the life sciences



Tvary bakteriálních buněk optimální hydrodynamické vlastnosti využití přístupných živin



Bacterial Morphology



poměr povrch/ objem

- ♦ nejmenší – kulaté buňky
- ♦ dlouhé tenké buňky nejvyšší

- *Chlamydia* 0,3 x 0,3 μm
- *Bdellovibrio* 0,8 x 0,3
- *Rickettsia* 1 x 0,3
- *S. aureus* 0,8-1 x 0,8-1
- *E. coli* 2-3 x 0,4-0,6
- *B. subtilis* 1,8-4,8 x 0,9-1,1
- *Streptomyces* vlákno x 0,7-1,6
- *Chromatium* 25 x 10
- Spirochety 500



Velikost bakterií a) nejmenší

Nejmenší rody: *rickettsie* a *mykoplasmata*, *Nanobacterium*

• *Mycoplasma*:

Schopny samostatného růstu!


= nejmenší volně žijící bakterie

Nebezpečí: prochází
protibakteriálními
filtry!

0,2-0,8 μm

- bez buněčné stěny

(= amorfní a nebarvitelné na



Mycoplasma pneumoniae

• *Rickettsie*

Nerostou mimo hostitelskou buňku!

0,3-0,8 μm G- koky až tyčinky


Barví se červeně dle Giemsy,
podlouhlé b. polárně.

- b.s. podobná bakteriální



Rickettsia rickettsii v



buňkách endotelu cév




Rickettsia rickettsii

Velikost bakterií b) největší

Epulopiscium spp. - symbionti mořských ryb *Acanthuridae*



Acanthurus lineatus, the striped surgeonfish



Bakterie monomorfní

existence jedné morfologické formy nezávisle na podmínkách růstu

Bakterie pleomorfní (mnohotvaré, pleiomorfní)

existence odlišných morfologických forem u téhož druhu či kmene (vlivem různých podmínek pro růst, často starší kultury)

příklady: *Corynebacterium diphtheriae*, *Mycoplasma pneumoniae*,
Rickettsia prowazeki, *Rickettsia rickettsia*


1. mykobakterie
2. corynebacterium –plectridium (ztluštění terminálně) či clostridium (ztluštění centrálně), corynebacterium mikroskopie: jednotlivě, dvojice nebo shluk.
3. aktinomycety – mikroskopie: jednotlivě, dvojice nebo shluky. U streptomycet např. čím delší kultivace tím větší pleomorfismus.

Koky

Geneticky kódováno dělení v rovinách a odloučení samostatné buňky.


Spojení buněčnou stěnou – Van Der Waalsovy síly

- **oploštělé**



Neisseria meningitidis - Gram-negative
meningitis, Waterhouse-Friderichson syndrome

- **zašpičatělé**



Streptococcus pneumoniae - Gram-positive
Encapsulated.
Causes (lower respiratory infection) pneumonia
(upper respiratory infections) bronchitis,
laryngitis, sinusitis, and otitis media.

v závislosti na rovině dělení :

- **diplokoky** - jedno dělení v jedné rovině
i shluky (dle náboje buňky a živin), G+ i G-

Neisseria gonorrhoeae, Gram-negative



- **streptokoky** - dělení v jedné rovině (každá b.)
Jednotlivě, dvojice nebo řetízky
(*Streptococcus*, *Lactococcus*)

- **tetrády** dělení ve dvou rovinách,
málo časté, většinou přerůstají v balíčky
(*Micrococcus luteus*)

- **pakety, sarciny**
dělení ve 3 na sebe kolmých rovinách
po dělení zůstávají ve skupinách po 8


- **stafylokoky**

nepravidelné dělení


shluky, hrozníčky

Shluk **druhově charakteristický**

v prostředí bohatém živinami - více shluků



Streptococcus



Micrococcus luteus



Sarcina



Staphylococcus aureus

Charakter shluků závisí na způsobu dělení bakteriálních buněk


- příčiny tvorby jednotlivých typů shluků u jednotlivých skupin bakterií nejsou jasné
- myxobakterie - produkce extracelulárních enzymů a lyze nerozpustných makromolekul
- studium vztahů mezi strukturou a funkcí
- jiná distribuce živin dovnitř shluku buněk



Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.

Salmonella typhi

Tyčinky, tyčky



rovné (většina bakterií, *E. Coli*, r. *Salmonella*...)

krátké (kokobacily)

dlouhé - vlákna (*Erysipelothrix*, *Actinomyces*)

štíhlé (*Mycobacterium tuberculosis*, *Clostridium tetani*)

robustní (r. *Lactobacillus*, *Clostridium perfringens*)

rozštěpené (r. *Bifidobacterium*)

větvící se (rr. *Nocardia*, *Actinomyces*)


zakřivené (vibria-*Vibrio*, *Campylobacter*) *Vibria* – různě prohnuté na jednu stranu, divoké kmeny více než sbírkové. Mikroskopie: vždy jednotlivě, dvojice jen na konci buněčného cyklu.

s rovnými až konkávními konci (*Bacillus anthracis*)

vřetenovité (r. *Fusobacterium*)


kyjovité (r. *Corynebacterium*)

pleomorfní



Copyright © 2007 Dennis Kunkel Microscopy, Inc. / Dennis Kunkel

E. coli



Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.

Mycobacterium paratuberculosis




Bifidobacterium

Copyright © 2006 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.




Vibrio

Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.



Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.




Actinomyces virosus

Copyright © 2006 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.


Kokobacily

kokobacily a kokotyčky dvojice nebo shluky, nikdy řetízky

- *Bordetella pertusis*, *Kingella*, *Acinetobacter*



Bordetella holmesii




Acinetobacter spp.

Tyčinky

Dělí se typicky jen podél své krátké osy a zůstávají většinou odděleně;


- Diplobacily:

tyčky ve dvojicích s kratšími konci u sebe (např. rod *Moraxella*)



- Streptobacily:

Tyčky, které zůstávají v řetízku po dělení (např. *Streptobacillus moniliformis*, *Erysipelothrix rhusiopatiae*, *Bacillus*, *Lactobacillus*,)



Další tvary tyčinek

Mycelium tvořící - aktinomycety, streptomycety

Prostéky tvořící

prostéka - buněčný výběžek

Cytoplazma + CM + BS

(*Filomicrobium*, *Hyphomicrobium*)

Pupeny, pučení

Pupeny na krátké straně.

Pučí většinou tyčky. Pupen vždy opouští mateřskou buňku.

(*Ancalomicrobium*, *Blastobacter*, *Hyphomonas*)

Spirálovité



nepravidelné (rody *Spirillum*, *Helicobacter*)


hrubé (r. *Borrelia*)

jemné (r. *Treponema*)


jemné se zahnutými

konci (r. *Leptospira*)








Prosthecomicrobium




Simonsiella




Cylindrospermum




Rhodomicrobium



Asticacaulis





Thiopedia rosea



Streptomyces


G⁺ vlákna



Streptomyces




Spirilly – určitý a konstantní počet závitů
(– max 5-7.) a vždy stejné stoupání




Pohyb a udržování počtu závitů vždy dle osového vlákna, závity jen v 1 rovině, relativně tenké buňky.

Spirochety – více závitů ve 2 či 3 rovinách,
tlustší buňky.

Bičíky v horním periplazmatickém prostoru, axiální bičíky vidíme až na řezu (jeden až několik desítek).





Undulující membrána – bílkovina + sacharid v 1 rovině, výlučně u vodních.



U spiril i spirochet bičíky vždy na koncích, jednotlivě či ve svazku. Pokud spojení buněk, tak háčkem, ne plochou. Pro pozorování se využívá mikroskopie v zástinu. Mikroskopie: buňky vždy jednotlivě.


Micrococcus


G⁺ sférické buňky, v preparátu jednotlivě, po dvou nebo ve čtveřicích či nepravidelných shlucích



- *Micrococcus luteus* je sírově žlutý (ne zlatý jako *Staphylococcus aureus*)


ASM MicrobeLibrary.org © Hedetniemi and Liao






Kocuria

G⁺ koky, po dvou, 4 nebo shluky



ASM MicrobeLibrary.org © Smith



ASM MicrobeLib




Bacillus cereus

Rovné G⁺ tyčky různé délky, ve dvojicích i řetězcích či jednotlivě





Escherichia coli

Gramnegativní rovné tyčky
Jednotlivé nebo ve dvojicích



Pseudomonas



Gramnegativní rovné nebo mírně zakřivené tyčky



hemolýza

Krevní agar s 10% NaCl

Bílé nazlátlé velké kolonie



Z 10 000x

emu.arsusda.gov/typesof/pages/staph.htm


**Mikroskop:
typické
hrozníčky, shluky**

Bakterie rodu Staphylococcus



Rod *Bacillus* - různá morfologie různých druhů


Bacillus cereus



Centrální oválná spora



Mikroskopie ve vzorku



- mikroskopický preparát sputa, Gramovo b.
- Grampozitivní koky, ve shlucích.

Leukocyty (hl. polymorfonukleáry), svědčí pro bakteriální zánět



- Výjimky při pozorování morfologie buňky barvené Gramovým barvením
 - !!Bakterie bez buněčné stěny (nebarvitelné Gramem)
 - !!Bakterie gramlabilní
 - !!Pozor na acidorezistentní buňky

Pozn: pro přesný tvar či měření buňky lépe užít negativní barvení pozadí

Bakterie bez buněčné stěny


- Sekundární ztráta b.s.
- Mutací tzv. „L-formy“ bakterií (G⁺ i G⁻)
- Primárně sférický tvar, ale i jiný
- Žijí v osmoticky stabilním prostředí (př. parazit *Mycoplasma*)
- Větš. specifická stavba membrány
- Malý genom – nepotřebují enzymy biosyntéz

Bakterie nebarvitelné Gramem

- *Borrelia burgdorferi* (fig [1](#), [2](#))
- *Borrelia recurrentis* (fig [1](#))
- *Bartonella henselae* (fig [1](#), [2](#))
- *Chlamydia trachomatis* (fig [1](#), [images of elementary bodies](#), [images of reticulate bodies](#))
- *Chlamydophila pneumoniae* ([images of elementary bodies](#), [images of reticulate bodies](#))
- *Chlamydophila psittaci* ([images of elementary bodies](#), [images of reticulate bodies](#))
- *Coxiella burnetii* (fig [1](#), [2](#))
- *Ehrlichia chaffeensis* (fig [1](#), [2](#))
- *Anaplasma phagocytophilum* (formerly; *Ehrlichia phagocytophilum* or *E. equi*; Fig. 1)
- *Legionella* sp. (fig [2](#))
- *Leptospira* sp. (fig [1](#), [2](#))
- *Mycobacterium bovis* (fig [1](#))
- *Mycobacterium tuberculosis* (fig [1](#), [2](#) thanks to Anders Olav Lande, [3](#))
- *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium intracellulare* (fig [1](#) thanks to Anders Olav Lande)
- *Mycobacterium kansasii* (fig [1](#))
- *Mycobacterium leprae* (fig [1](#), [for a close up](#) thanks to Anders Olav Lande)
- *Mycobacterium marinum* (fig [1](#))
- *Rickettsia rickettsii* (Fig. [1](#); scroll down to bottom of the page. [2](#))
- *Orientia tsutsugamushi* (formerly; *Rickettsia tsutsugamushi*; Fig. [1](#))
- *Treponema pallidum* (fig [1](#), [2](#), [3](#))


Přehled diagnostiky G+ koků

Gram Positive Cocci Flow Chart




Fázový kontrast

$$n_1 < n_2 < n_3$$



Sporosarcina ureae



tzv. „haló“ efekt
okolo buněk


Bacillus cereus

možnost pozorování živých objektů v nativním stavu bez barvení

- Různé části preparátu - různý index lomu
- ohyb paprsků

Morfologie kolonií


Charakteristická pro daný bakteriální druh




- Kolonie - tvorba a stavba, uspořádání (organizace) a dorozumívání (komunikace).
- Mezikoloniální vztahy a vlivy - komunikace mezi jednotlivými koloniemi.
- Závislost na době kultivace, teplotě a výživě.
- Kolonie bakteriální = společenství buněk vzniklé obvykle na povrchu pevné kultivační půdy z třeba i jediné životaschopné buňky.





Velikost (průměr; mm)
Tvar – kolonie pravidelná kulatá, oválná, nepravidelně laločnatá, vláknitá, rhizoidní, plazící se




Profil – kolonie vyvýšená, plochá, pupkovitá, miskovitá ...
 Okraje – pravidelné, filiformní, laločnaté, okrouhlé ...
 Povrch – hladký, lesklý (S - fáze), matný, drsný (R- fáze)






Transparence
 Vůně, zápach
 Tvorba mycelia
 Změny media
 Barva
 Konzistence





***Streptomyces coelicolor* A3(2)**



Bacillus




Figure 4

Nocardia farcinica




***Pseudomonas*
Mutace- PS**




Streptomyces






Serratia - knoflíkový profil



Chromobacterium violaceum

Kulaté, vypouklý profil,
pravidelné okraje



Průhledné
Azotobacter vinelandii



Klebsiella ozanae
Kulaté kolonie




Enterococcus faecalis
Kulaté, vypouklý profil,
pravidelné okraje
Drobné – neúčinný metabolismus
Kultivace 3-4 dny




Lactobacillus plantarum



Salmonella
Jeden druh tvoří rozdílnou morfologii kolonií



Bacillus cereus
Kolonie velké,
nepravidelné,
plochý profil, okraj vlnitý



Bacillus megaterium

Definice bakteriálního druhu

- **bakteriální druh**

je souborem bakteriálních kmenů sdílející stále shodné vlastnosti (fenotypové i genotypové – sekvence genů pro 16S rRNA, DNA-DNA hybridizace) a lišící se jimi od kmenů jiných validně popsaných druhů

- Druh se od fylogeneticky nejbližšího příbuzného (stanoveno genotypizačními metodami) musí lišit i fenotypově (fyziologické znaky – biochem. testy, chemotaxonomie)
- **Typové kultury** druhu musí být **kultivovatelné a jsou uloženy alespoň ve 2 světových sbírkách**
- Nekultivovatelné mikroorganismy popisovány jako tzv. kandidatus

- Approved List of Bacterial Names (IJSB)
- Bacterial Nomenclature Up-to-Date:
<http://www.dsmz.de/bactnom/bactname.htm>

Zajímavé zdroje a odkazy

- <http://www.microbelibrary.org/asmonly/details.asp?id=2566&Lang=English>
- <http://www.who.edu/oceanus/viewArticle.do?id=2539>
- <http://www.geocities.com/CapeCanaveral/3504/gallery.htm>