


# Obojživelníci a plazi


systém

Tetrapoda




systém

# Amphibia



Gymnophiona - červoři (J a stř. Amerika, tropická Afrika, Indie), 3 čeledi, 34 rodů, 159 druhů



## Urodela - mloci (severní polokoule), 8 čeledí

Hynobiidae (5;31) - pamlokovití (Asie)

Cryptobranchidae (2;2) - velemlokovití (Jap, Čína, sv. S-Ameriky)

Sirenidae (2;3) - surýnovití (jv. USA)

Amphiumidae (1;3) - úhoříkovití (jv. S-Ameriky)

Proteidae (2;6)- macarátovití (sv. S-Ameriky, Slovinsko)

**Salamandridae (14;43) - mlokovití (holarctis)**

Ambystomatidae (4;60)- axolotlovití (S-Amerika, Mexiko)

Plethodontidae (20;168)- mločíkovití (Amerika, Evropa - *Hydromantes*)

**čeleď Salamandridae**

8 druhů

Dříve 7 druhů rodu *Triturus*, 1 *Salamandra*

Nyní nové názvy *Triturus*, *Lissotriton*,  
*Mesotriton*, *Salamandra*

# *Salamandra salamandra*, mlok skvrnity

Popis

Vývoj

Biotop


Páření

Pohlaví




P.-Dubois - 2001

*Salamandra salamandra*



4. Pohlavní rozdíly u mloka skvrnitého.



11. Vývojové fáze čolka velkého:

A — vodní fáze ♂ (Krnov IV. 1983) — čolek velký středoevropský, vodní fáze ♂ (VSN IV. 1982) — čolek velký podunajský, C — suchá skálová fáze (VSN VIII. 1983) — ♂ čolka velkého podunajského, D — fáze (VSN IV. 1982) — ♀ čolka velkého podunajského. Šipka označuje plovací blány ♂ mezi prsty (VSN = Východoslovenská nížina)

## „Velcí čolci“, rod *Triturus*


*T. dobrogicus*, dunajský, soutok M a D

*T. cristatus*, velký, nejhojnější

*T. carnifex*, dravý, Znojemsko, pouze kříženci s *T. cristatus*


*T. cristatus* delší nohy, menší rozdělení lemu  
vs *T. dobrogicus*

Začátek lemu na hlavě



# „malí čolci“, rod *Lissotriton*, *Mesotriton*

*L. vulgaris*, obecný  
spojený lem  
rýhy, chybí volný konec na ocase,  
oblé boční lišty u F, M lemy na zadních  
nohách




13. Dvě základní vývojové fáze čolka obecného:

A — ♂ vodní fáze. Šipka označuje ploutevní lem prstů (Krnov, 1986), B — ♂ suchozemská fáze (Stará Ves — Jeseníky, 1986), C — ♀ vodní fáze v přechodu na suchozemskou (jedinec byl ještě ve vodě — Rýžoviště Jeseníky, 1985), D — průřez těla samice z výše uvedené lokality — znak oblých laterálních lišť (srovnej s obr. 14 D).



*L. montandoni*, č. karpatský  
karpatský endemit,  
vyšší nadm. výšky,  
podélné lišty, mramorování  
volný konec ocasu  
chybí skvrny na břichu  
hybridní



14. Dvě základní fáze čolka karpatského:  
A — ♂ vodní fáze. Šipka označuje ocasní vlákénko (Spišská Magura, 1987 a podle preparátů Moravského muzea v Brně), B — ♂ suchozemská fáze (podle jedinců z Moravského muzea Brno), C — ♀ vodní fáze (podle jedinců z Moravského muzea Brno), D — průřez tělem ♂ ve vodní fázi (podle jedinců z Moravského muzea v Brně).


*L. helveticus*, hranačí  
západoevropský druh, Krušné hory,  
vyšší nadm. výšky,  
dorzolaterální lišty, volný konec ocasu




© Radek Sejkora




*Mesotriton alpestris*, horský  
pruhovaný hřbetní lem



16. Dvě fáze čolka horského (Stará Ves — Jeseníky):  
A — ♂ vodní fáze (1985). Šípka označuje hřbetní ploutevní lem, B — ♂ suchozemská fáze (1987). Šípka označuje hřbetní ploutevní lem, C — ♀ vodní fáze (1985). Šípka označuje vertebrální linku.




20. Popis larvy žáby — pulce: 1 — nosní otvory, 2 — ústní disk (viz obr. 21), 3 — oko; 4 — spiraculum, vnější vyústění vnitřních žaber, 5 prosvítající střevní kličky, 6 — anální otvor, 7 — zadní končetina ve vývoji, 8 — ocas, 9 — ocasní ploutevní lem, 10 — zrna melaninu.




21. Ústní disk: a — vlastní ústní otvor, obklopený dolní a horní čelistí, b — horní řady rohovitých zoubků, c — dolní řady zoubků.


27



23. Uspořádání vajíček u blatnice skvrnité.



I. Uspořádání vajíček u ropuch: A — po nakladení, B — provazec je nataho-ván ve směru šipky, C — těsně před vykulením pulců vystupují vajíčka na povrch provazce.



25. Uspořádání vajíček u rodů: skokan, kuňka a rosnička.

29


# Anura – žáby

13 druhů v ČR


č. Discoglossidae

rod kuňka

plovací blány na z. nohách,  
přirostlý jazyk, malá žabka





28. Rozdíly ve tvaru rohovitých výrůstků na bradavičkách kuněk: A — k žlutobřichá (Koblov u Ostravy, 1987), B — kuňka obecná (Nové C u Kutně Hory, 1987).



29. Pářicí mozoly našich kuněk: A — kuňka obecná, B — kuňka žlutobřic

*Bombina bombina*, k. obecná  
bílé tečky, oddělené skvrny





0. Variabilita tvaru zřítelnic obou druhů našich kuněk: a až c — trojúhelníkovitý tvar (závislost na intenzitě roztažení zřítelnice), d a e — přechod z trojúhelníkovitého na kapkovitý tvar, f a g — tvar kapkovitý, h — přechod z kapkovitého tvaru na srdčitý, i až k — tvar srdčitý, l — zvláštní srdčitý tvar, připomínající vzdáleně trojúhelník.



## Inquinální komplex

*Bombina variegata*, k. žlutobřichá  
neoddělené skvrny, větší skvrny na palcích  
a bříše  
M nemá rezonátor

Hybridní zóna  
Vajíčka po shlucích



č. Pelobathidae,

*Pelobates fuscus*, blatnice skvrnitá

Vyklenuté frontoparietále, vertikální zornice, metatarzální lišta, noční

Přezimující pulci



č. Hylidae

*Hyla arborea*, rosnička zelená


Variabilní zbarvení, proužek přes oko, drobná stromová žabka



# č. Bufonidae

*Bufo bufo*, ropucha obecná

Parotidy šikmo od hlavy, párové subartikulární hrbolinky




33. Tvary hlav a parotid našich ropuch: 1 — rostrum, 2 — parotida. A — ropucha obecná (Mezina — Jeseníky, 1985), B — ropucha krátkonohá (Polská nížina, 1986), C — ropucha zelená (Brno, 1982).



© lubomir hlasek  
www.hlasek.com  
Bufo bufo da1281

Axilární komplex

*Pseudepidalea (Bufo) viridis*,  
ropucha zelená  
Síťování, tarzální lišta, nepárové s. hrbolky



*Epidalea calamita*, ropucha krátkonohá  
Běhá, neskáče, nejmenší, světlý pruh  
Z a J Čechy


2. Ropucha krátkonohá

Subartikulární hrboly  
na chodidle


Hlava s parotidami a oko

## č. Ranidae, skokanovití

Suchozemští vs vodní skokani  
Hnědí vs zelení



53. Základní rozdíly mezi skupinou hnědých a zelených skokanů:  
A — skupina hnědě zbarvených skokanů, B — skupina zeleně zbarvených skokanů [schéma I]: 1 — bříško prstu, 2 — kloub, 3 — plovací blána, 4 — metatarsální hrbolek.




Suchozemští, hrdelní nepárový rezonátor

*Rana temporaria*

skokan hnědý

Tupé rostrum, malý metatarzální hrbol,  
skvrny na břiše  
nejkratší nohy



*Rana arvalis*

skokan ostronosý

Ostré rostrum, největší hrbol, bubínek  
daleko od oka, skvrny na boku





© Martin Šandera

*Rana dalmatina*

skokan štíhlý

Ostré rostrum, střední hrbol, bubínek těsně  
u oka, velký, břicho bez skvrn



## Vodní, M párové rezonátory

*Pelophylax (Rana) ridibunda*

skokan skřehotavý

Veliké tělo, barevně variabilní, malý hrbol,  
nohy dlouhé



Foto: K. Rozínek

*Pelophylax lessonae*

skokan krátkonohý

Největší hrbol, nejkratší nohy



*Pelophylax esculenta*

skokan zelený

Hybrid, klepton, střední hrbov, středně  
dlouhé nohy



© - josef hlasek

[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)

Rana esculenta 6333




© - josef hlasek

[www.hlasek.com](http://www.hlasek.com)

Rana esculenta ah4876




S. skřehotavý




S. ostronosý




S. krátkonohý



S. hnědý



S. zelený



S. štíhlý