


Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?


Jan Hejátko



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů
 - analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů
 - diferenční proteomika
 - analýza posttranslačních modifikací



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?


- PROTEOME = PROTEins expressed by genOME (konference 2-D ELFO, Siena, 1994)
 - DNA: GENOME, HAPLOME, EPIGENOME
 - RNA: TRANSCRIPTOME
 - PROTEIN: ORFEOME, PROTEOME, LOCALISOME, INTERACTOME, METABOLOME, PHENOME, ...
 - PHENOME: kombinace různých dat, zahrnujících fenotyp, expresní data různých (ideálně všech) genů daného organismu a proteinová data (interakce, jednotlivé vlastnosti proteinů, ...)
- Proč vůbec studovat proteiny, když máme tak mnoho genetických dat? (sekvence genomů, expresní profily genů, fenotypy mutantů,...?)



V koncovém výsledku, tedy **fenotypu**, se vždy projeví regulace na všech úrovních, od genu po protein a jeho modifikaci



Na konci je vždy **BIOLOGICKÝ PROBLÉM !!!**



Anotace genů a odhad aminokyselinových sekvencí předpokládaných proteinů

Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst


- dnes k dispozici v databázích více než 700 000 záznamů (nr databáze) různých organizmů
 - Získané informace lze zpracovat pomocí **bioinformatiky**



Predikce funkce genů *in silico*

struktura genů


- struktura genů
 - promotor
 - počátek transkripce
 - 5 UTR
 - počátek translace
 - místa sestřihu
 - stop kodon
 - 3 UTR
 - polyadenylační signál



Anotace genů a odhad aminokyselinových sekvencí předpokládaných proteinů

Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst


- dnes k dispozici v databázích více než 700 000 záznamů (nr databáze) různých organismů
- Získané informace lze zpracovat pomocí **bioinformatiky**



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování





Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování

- Genom vs. Proteom



Danaus plexippus (monarch)



Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování

Možná analogie s textem a jeho interpretací

DNA:

Když adoperbtabijssemdfjfwůcsaknclůsnínjxldalnxckjcnbychcxmasizdciksrnceasnanaazxcnlsdlaň.
Když-----jsem-----snídal---ní---dal-----bych-----si-----srdce-----na-----dlaň.


RNA:

Když jsem s ní, dal bych si srdce na dlaň.

Když jsem s ní, dal ~~bych~~ ~~srdce~~ ~~na~~ dlaň.

Když jsem snídal srdce.


PROTEIN:



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?


- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět



Od genu k proteinu a zpět

Základní mechanismy regulace genové exprese

- regulace transkripce





Základní mechanismy regulace genové exprese

struktura genů

- struktura genů



- promotor
- počátek transkripce
- 5 UTR
- počátek translace
- místa sestřihu
- stop kodon
- 3 UTR
- polyadenylační signál



Základní mechanismy regulace genové exprese

regulace transkripce


- odchylky rozpoznávání míst sestřihu u rostlin v praxi - příklad vývojové plasticity (nejen) rostlin
 - identifikace mutanta s bodovou mutací (tranzice G→A) přesně v místě sestřihu na 5' konci 4. exonu



Základní mechanismy regulace genové exprese přeskupování subgenů při produkci protilátek

Přeskupování subgenů jako specifický mechanismus při produkci protilátek


- protilátky variabilní oblast (V) a konstantní oblast (C) a lehký (L) a těžký (H) řetězec
 - každá z V oblastí L řetězce u myší je kódována 2 subgeny (V a J)
 - každá z V oblastí H řetězce u myší je kódována 3 subgeny (V, J a D)
- v zárodečných liniích myších B-lymfocytů dochází k tzv. **kombinatorické diversifikaci** (přeskupování **subgenů** (místně-specifickou rekombinací)
 - L řetězec (κ): cca 300 V sub-genů a 4 J subgeny (**300 x 4 = 1200** možností)
 - H řetězec: cca 500 V sub-genů, 4 J subgeny a 12 D subgenů (**500 x 4 x 12 = 24000** možností)
- celkové množství kombinací u myší: cca $1200 \times 24000 = 28$ mil. různých V oblastí (protilátek rozpoznávající různé antigeny)
- antigen indukuje tzv. **afinitní dozrávání** mechanismem **somatické hypermutace**
 - po aktivaci B-lymf. pomocnými T-lymf. dochází ke zvýšenému výskytu mutací ve V oblastech (1 mutace/V oblast/generaci, cca 1 mil. X vyšší než je obvyklé (např. u tzv. „house-keeping“ genů) a selekci protilátek se zvýšenou afinitou k antigenu



Od genu k proteinu a zpět


Základní mechanismy regulace genové exprese

- regulace transkripce
- sestřih RNA
- translační represe




Regulace genové exprese mechanismem translační represe




- Funkční význam sestřihu v nepřekládaných oblastech - důležitá regulační součást genů



- V případě CKI1 pokus prokázat tento způsob regulace genové exprese pomocí transgenních linií nesoucích *uidA* pod kontrolou dvou verzí promotoru, zatím nepotvrzeno




Expression of CK1 in Diploid Generative Tissue Inflorescence



Od genu k proteinu a zpět


Základní mechanismy regulace genové exprese

- regulace transkripce
- Sestřih RNA
- translační represe
- posttranskripční umlčování mechanizmem siRNA




Od genu k proteinu a zpět

umlčování genů mechanismem RNA interference (RNAi)



Mello, 2001



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006

"for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA"



Andrew Z. Fire

USA

Stanford University School of Medicine
Stanford, CA, USA

b. 1959




Craig C. Mello

USA

University of Massachusetts
Worcester, MA, USA

b. 1960





Od genu k proteinu a zpět transkripcní umlčování mechanizmem siRNA

Kontrola identity květů u *Arabidopsis* prostřednictvím miRNA


Identifikace orgánů u rostlin

V různých orgánů dochází k určování identity jednotlivých květních orgánů díky homeiotickým genům

Geny mají většinou rostlinné homology MADS-box

Procesem expresiony těmito geny dochází k tzv. katastrálním interakcím, když jedno gen inhibuje expresi dalšího


- např. *AP1* je nejprve aktivní v celém květném meristému, po indukci exprese *AG* pak *AG* inhibuje expresi *AP1* ve vnitřních dvou kruzích
- výjimkou je exprese genu *AP2*, jehož mRNA je vysoká v celém květném meristému, ale exprese *AP2* je regulována díky expresii siRNA prostřednictvím miRNA 172



Od genu k proteinu a zpět

Základní mechanismy regulace genové exprese

- regulace transkripce
- Sestřih RNA
- translační represe
- posttranskripční umlčování mechanizmem siRNA
- směřování proteinů




Od genu k proteinu a zpět



směřování (cílování) proteinů

- Intracelulární lokalizace proteinů

- v rostlinných buňkách dochází k velice dynamickým procesům, zprostředkovávaným zejména tzv. endomembránovým transportem (viz film, GFP směřované do ER)



CV, central vacuole; DV, dictyosomes;
GA, Golgi apparatus; LV, large vesicle;
AC, accumulating compartment; ER,
endoplasmic reticulum; PSV, protein
secretory vesicle; RER, rough endoplasmic
reticulum; ERG, endoplasmic reticulum
golgi; ER-GA, endoplasmic reticulum-Golgi
apparatus; ER-LV, endoplasmic reticulum-
large vesicle; ER-AC, endoplasmic reticulum-
accumulating compartment; ER-PSV, endoplasmic
reticulum-protein secretory vesicle; ER-
ERG, endoplasmic reticulum-endoplasmic
reticulum-golgi; ER-ERG-LV, endoplasmic
reticulum-endoplasmic reticulum-golgi-
large vesicle; ER-ERG-AC, endoplasmic
reticulum-endoplasmic reticulum-golgi-
accumulating compartment; ER-ERG-PSV,
endoplasmic reticulum-endoplasmic
reticulum-golgi-protein secretory vesicle;




Od genu k proteinu a zpět

směřování (cílování) proteinů

■ Cyklování auxinových přenašečů u *Arabidopsis*


- auxin je rostlinný hormon se silným morfogenním účinkem
- proteiny podílející se na transportu proteinů jsou tzv. PIN proteiny, polárně lokalizované v buněkách kořene u *Arabidopsis*
- PIN proteiny cyklují v endomembránovém systému rostlinné buňky
- v přítomnosti inhibitorů enzymů je vysoký obsah těchto proteinů v intracelulární místnosti
-čímž je zároveň narušeno jejich polárné umístění



Od genu k proteinu a zpět

Základní mechanismy regulace genové exprese


- regulace transkripce
- sestřih RNA
- translační represe
- posttranskripční umlčování mechanizmem siRNA
- směřování proteinů
- posttranslační modifikace proteinů



Od genu k proteinu a zpět potranslační modifikace proteinů

Význam posttranslačních modifikací proteinů


- regulace enzymové aktivity
- regulace interakcí proteinu s dalšími proteiny nebo jinými biomolekulami
- lokalizace proteinu v buňce
- změna mechanických vlastností proteinu
- přenos signálu



Od genu k proteinu a zpět postranslační modifikace proteinů

Typy posttranslačních modifikací proteinů


- přidání glykosylfosfatidylinositolové (GPI) kotvy
- fosforylace
- sulfonace
- glykosylace
- N-myristolyace
- N-metylace
- hydroxylace
- karboxylace
- prenylace
-



Od genu k proteinu a zpět potranslační modifikace proteinů

Přenos signálu a regulace genové exprese prostřednictvím fosforylace

- přenos cytokininového signálu u rostlin



Od genu k proteinu a zpět potranslační modifikace proteinů

Přenos signálu a regulace genové exprese prostřednictvím fosforylace


- přenos signálu prostřednictvím TGF β (Transforming Growth Factor) u živočichů



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů




Přístupy současné proteomiky

exprése, purifikace a analýza rekombinantních proteinů

Technologie rekombinantních proteinů


- umožňuje získat velké množství analyzovaného proteinu ve velké čistotě
- využívá technologie rekombinantní DNA
- principem je vložení „přívěsku“ prostřednictvím přípravy rekombinantní DNA, který usnadní purifikaci (afinitní purifikace)
- možnost využití „přívěsku“ i pro lokalizaci a další



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů
 - analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů





Přístupy současné proteomiky

analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů

Analýza vztahu mezi funkcí a strukturou proteinu


- využívá technologie produkce rekombinantních proteinů a místně řízené mutageneze
- umožňuje analyzovat strukturu rekombinantního proteinu pomocí rentgenové krystalografie nebo NMR
- komparativní analýzou lze pak analyzovat strukturu a funkci jak u standardního typu tak i mutantního proteinu



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů
 - analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů
 - diferenční proteomika





Přístupy současné proteomiky

komparativní proteomika


Analýza změn proteomu organismu na různé stimuly

- využívá technologií vícerozměrné separace proteinů (nejčastěji ELFO nebo LC)
- umožňuje analyzovat mnoho proteinů najednou
- pomocí analýzy obrazu lze odhadnout proteiny se změnou vlastností, příp. kvantity za daných sledovaných podmínek (mutace, vývojové stadium, fyziologická odpověď)



Přístupy současné proteomiky


komparativní proteomika



Přístupy současné proteomiky

komparativní proteomika


Spot	% Vol	Relative Abundance	Accession No.	Protein Name	MALDI-MS		LC-MSMS		MM [kDa]	pI
					Score	% Cov	Score	% Cov		
1105		3.55	S47970	14-3-3 protein homolog RCI2	-	-	123	20	28.1	5.0
2203		< 0.01	BAB01146	AP000373 NID (jasmonate inducible, myrosinase-like)	97	725	-	-	48.5	5.0
2310		< 0.01	BAA84393	AP000423 NID (RuBisCO large subunit)	116	26	-	-	52.9	5.9
2402		3.40	Q8LBJ7	50S ribosomal protein L12-C	-	-	130	16	19.7	6.0
2801		2.50	AAG51430	AC008153 NID (2-cys peroxiredoxin BAS1, chloroplast [Precursor])	87	29	92	11	29.1	6.9
4503		> 100	Q9SU19	ATP synthase gamma chain, chloroplast	131	29	393	32	33.3	5.1
5204		< 0.01	E71425	Hypothetical protein (putative epoxide hydrolase)	-	-	40	5	33.4	6.2
7009		< 0.01	T05413	cinnamyl-alcohol dehydrogenase (EC 1.1.1.195) F28A23.10	-	-	86	7	38.7	5.4
7401		< 0.01	Q9LJE4	GloEL protein, chaperonin, 60 kDa	-	-	217	10	63.3	5.6
7606		> 100	F86262	F13K23.15 protein (glyceraldehyde-3-phosphate dh)	81	23	388	33	42.8	8.2
7701		0.37	AAM20572	AY099721 NID (Cysteine synthase, mitochondrial [Precursor])	128	26	236	28	45.8	8.4
8202		> 100	AAL36245	AY063889 NID (50S ribosomal protein L4, chloroplast [Precursor])	-	-	59	4	30.5	8.9
8302		2.69	H84808	probable annexin	-	-	90	9	36.2	6.9
8605		> 100	Q941D3	At5g19940/F28I16_90 (Hypothetical protein)	-	-	142	10	26.5	9.5
8803		0.42	T47470	isovaleryl-CoA dehydrogenase	63	11	213	18	44.7	7.5



Základy proteomiky 2010

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů
 - analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů
 - diferenční proteomika
 - analýza posttranslačních modifikací



Přístupy současné proteomiky

analýza posttranslačních modifikací

Analýza posttranslačních modifikací

- pomocí specifických metod lze identifikovat kotranslační a posttranslační modifikace, buď v gelu nebo po blotování na membránu (barvení spec. barvičkami)
 - identifikace modifikací pomocí MS technik (MALDI TOF, ESI-MS, ...)
 - fosforylace
 - přenos signálu
 - acetylace
 - regulace chromatinových struktur a transkripční aktivity prostřednictvím regulace vazby histonů
 - glykosylace
 - velice heterogenní (aktivátor plasminogenu 3 místa pro glykosylaci na N-konci, až 11. 520 SYPRO Ruby v izoforem)

- mikroheterogenita díky velkému množství různých cukerných zbytků, které se možnou vázat na jednu ak.

- makroheterogenita díky rozdílům v přítomnosti různých cukrů na různých ak. na různém počtu kopolymerického proteinu




Základy proteomiky 2010

shrnutí

Proč právě proteomika?

- Postgenomová éra a co s informacemi, které neumíme číst
- Genotyp vs. fenotyp, aneb co všechno se děje při vyjadřování
- Od genu k proteinu a zpět
- Přístupy současné proteomiky
 - exprese, purifikace a analýza rekombinantních proteinů
 - analýza vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů
 - diferenční proteomika
 - analýza posttranslačních modifikací



Základy proteomiky 2010

zdrojová literatura

- Zdrojová literatura k první přednášce:

Monografie a učebnice

- Plant Functional Genomics, ed. Erich Grotewold, 2003, Humana Press, Totowa, New Jersey
- Proteome Research: New Frontiers in Functional Genomics, ed. Wilkins, M.R., Williams, K.L., Appel, R.D., Hochstrasser, D.F., 1997, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
- Dubová J., Hejátko J., Friml J. (2005) Reproduction of Plants, in Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine (ed. R. A. Meyers), pp. 249 – 295. Wiley-VCH, Weinheim, Germany

Publikace v mezinárodních časopisech

- Wang, L. and Wessler, S.R. (1998) Inefficient reinitiation is responsible for upstream open reading frame-mediated translational repression of the maize R gene. *Plant Cell*, **10**, (1733)
- Friml, J. and Palme, K. (2002) Polar auxin transport. Old questions and new concepts?. *Plant Mol. Biol.*, **49**, 273-284
- Mello, C.C. and Conte Jr., D. (2004) Revealing the world of RNA interference. *Nature*, 431, 338-342
- Surpin, M. and Raikhel, N. (2004) Traffic jams affect plant development and signal transduction. *Nature Reviews/Molecular Cell Biology* 5,100-109

