Jméno:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem

Vstupní písemka ze semináře z matematiky II, únor 2012
Max. počet bodů 40

1a. Napište definici lineární nezávislosti vektorů $v_1, v_2, \ldots, v_k$ ve vektorovém prostoru V. (*1 bod*)

1b. Mějme lineární zobrazení $\varphi : U \to U$ a vektory $u_1, u_2, \ldots, u_k \in U$. Dokažte: Jsou-li vektory $\varphi(u_1)$, $\varphi(u_2)$, $\ldots$,$\varphi(u_k)$ lineárně nezávislé, jsou lineárně nezávislé i vektory $u_1, u_2, \ldots, u_k$. (*3 body*)

2a. Napište definici lineárního zobrazení mezi dvěma vektorovými prostory. (*1 bod*)

2b. Napište jak vypadají všechna lineární zobrazení z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^k$. (*3 body*)

3a. Napište definici jádra lineárního zobrazení a definici podprostoru ve vektorovém prostoru. (*2 body*)

3b. Dokažte: Jádro $\ker\varphi$ lineárního zobrazení $\varphi : U \to V$ je vektorový podprostor ve V. (*2 body*)

4. Dokažte: Lineárního zobrazení $\varphi : U \to V$ je prosté, právě když jeho jádro $\ker\varphi$ obsahuje pouze nulový vektor. (*4 body*)

5a. Napište definici lineárního obalu vektorů $u_1, u_2, \ldots, u_k$ ve vektorovém prostoru U. (*1 body*)

5b. Z definice lineárního obalu dokažte rovnost $[u_1, u_2, u_3] = [u_1, u_2 - u_1, u_1 + u_2 + 2u_3]$. (*3 body*)

6a. Napište definici suprema množiny $M \subseteq \mathbb{R}$. (*2 body*)

6b. Se všemi potřebnými předpoklady zformulujte základní větu, která o supremu platí. (*2 body*)

7a. Napište definici limity posloupnosti reálných čísel. (*1 bod*)

7b. Pomocí věty o supremu z předchozí úlohy dokažte: Každá rostoucí posloupnost záporných reálných čísel má limitu. (*3 body*)

8a. Napište definici limity reálné funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$. (*1 bod*)

8b. Z definice limity dokažte:

$$\lim_{x\to a}(f(x) + g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x),$$

pokud limity vpravo existují. (*3 body*)

9a. Pomocí kvantifikátorů napište negaci definice

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

(*1 bod*)

9b. Dokažte z definice limity (resp. z předchozí úlohy), že limita v bodě 2 funkce $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ takové, že $f(x) = 0$ pro x iracionální a $f(x) = 1$ pro x racionální, není rovna 0. (*3 body*)

10a. Napište definici spojitosti reálné funkce v bodě $a \in \mathbb{R}$. (*1 bod*)

10b. Dokažte z definice spojitosti: Jestliže jsou dvě funkce f a g spojité v bodě $a \in \mathbb{R}$, pak je v tomto bodě spojitý i jejich součin. (*3 bod*)