

Drsná matematika II – 3. přednáška

Vlastnosti spojitých funkcí, derivace

Jan Slovák

Masarykova univerzita

12. 3. 2012

Obsah přednášky

- 1 Literatura
- 2 Vlastnosti limit
- 3 Vlastnosti spojitých funkcí
- 4 Přírůstky do ZOO
- 5 Derivace

Kde je dobré číst?

- vlastní poznámky, texty současného nebo předcházejícího přednášejícího, GOOGLE, atd.
- Zuzana Došlá, Jaromír Kuben, Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, MU Brno, 2003, 215 s., ISBN 80-210-3121-2.
- Riley, K.F., Hobson, M.P., Bence, S.J. Mathematical Methods for Physics and Engineering, second edition, Cambridge University Press, Cambridge 2004, ISBN 0 521 89067 5, xxiii + 1232 pp.

Theorem

Věta o třech limitách. *Bud' te f , g , h reálné funkce (s definičním oborem A) takové, že existuje okolí hromadného bodu $x_0 \in \mathbb{R}$ množiny A , kde platí $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Pokud existují limity $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f_0$ a $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = h_0$ a nastává rovnost $f_0 = h_0$, pak také existuje limita $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g_0$ a platí $g_0 = f_0 = h_0$.*

Důkaz.

Z definice limity, pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje okolí U bodu x_0 , ve kterém je $f(x), h(x) \in (g_0 - \varepsilon, g_0 + \varepsilon)$. z podmínky $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ vyplývá, že i $g(x) \in (g_0 - \varepsilon, g_0 + \varepsilon)$, tedy $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g_0$. □

Theorem

Nechť $A \subset \mathbb{R}$ je definiční obor reálných nebo komplexních funkcí f a g , x_0 nechť je hromadný bod A a existují limity

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \in \mathbb{R}$ a $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b \in \mathbb{R}$. Potom:

- 1 limita a je určena jednoznačně,
- 2 limita součtu $f + g$ existuje a platí

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = a + b$$
- 3 limita součinu $f \cdot g$ existuje a platí $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = a \cdot b$
- 4 pokud navíc $b \neq 0$, pak limita podílu f/g existuje a platí

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}.$$

Důkaz.

(1): Předpokládejme, že a a a' jsou dvě hodnoty $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Pokud $a \neq a'$, pak existují disjunktní $\mathcal{O}(a)$ a $\mathcal{O}(a')$. Pro dostatečně malá okolí x_0 ale mají hodnoty f ležet v obou naráz, což je nesmysl, proto $a = a'$.

I ostatní vlastnosti vyplývají přímo z úvah o okolích hodnot. □

Nekonečné hodnoty limit

Podrobnějším sledováním důkazů můžeme tvrzení rozšířit i na některé nekonečné hodnoty limit: V prvním případě je zapotřebí, aby buď alespoň jedna z limit byla konečná nebo aby obě měly stejné znaménko. Pak opět platí že limita součtu je součet limit. Příklad „ $\infty - \infty$ “ ale není zahrnut.

V druhém případě může být jedna z limit nekonečná a druhá nenulová. Pak opět platí, že limita součinu je součin limit. Příklad „ $0 \cdot (\pm\infty)$ “ není ale zahrnut.

V případě podílu může být $a \in \mathbb{R}$ a $b = \pm\infty$, kdy výsledek limity bude nula, nebo $a = \pm\infty$ a $b \in \mathbb{R}$, kde výsledek bude $\pm\infty$ podle znamének čitatele a jmenovatele. Příklad „ $\frac{\infty}{\infty}$ “ není zahrnut.

Zdůrazněme, že naše tvrzení vesměs jako speciální případ pokrývají také odpovídající tvrzení o konvergenci posloupností a jednostranných limit.

Nechť f je reálná nebo komplexní funkce definovaná na intervalu $A \subset \mathbb{R}$. Říkáme, že f je **spojitá v bodě** $x_0 \in A$, jestliže je

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Funkce f je spojité na A , jestliže je spojité ve ve všech bodech $x_0 \in A$.

Všiměme si, že pro hraniční body intervalu A říká naše definice, že f v nich má být spojité zprava, resp. zleva.

Z vět o limitách okamžitě vyplývá většina následujících tvrzení:

Theorem

Nechť f a g jsou spojité funkce na intervalu A . Pak

- 1 *součet $f + g$ je spojitá funkce*
- 2 *součin $f \cdot g$ je spojitá funkce*
- 3 *pokud navíc $g(x_0) \neq 0$, pak podíl f/g je dobře definován v nějakém okolí x_0 a je spojitý v x_0 .*
- 4 *pokud spojitá funkce h je definována na okolí hodnoty $f(x_0)$, pak složená funkce $h \circ f$ je definována na okolí bodu x_0 a je v x_0 spojitá.*

Důkaz.

Tvrzení (1) a (2) jsou zřejmá,

(3) Jestliže je $g(x_0) \neq 0$, pak také celé ϵ -okolí čísla $g(x_0)$ neobsahuje nulu pro dostatečně malé $\epsilon > 0$. Ze spojitosti g pak vyplývá, že na dostatečně malém δ -okolí x_0 bude g neulové a podíl f/g tam bude tedy dobře definován. Pak bude ovšem i spojitý v x_0 podle předchozí věty.

(4) Zvolme nějaké okolí \mathcal{O} hodnoty $h(f(x_0))$. Ze spojitosti h němu existuje okolí \mathcal{O}' bodu $f(x_0)$, které je celé zobrazeno funkcí h do \mathcal{O} . Do tohoto okolí \mathcal{O}' spojitě zobrazení f zobrazí dostatečně malé okolí bodu x_0 . To je ale právě definiční vlastnost spojitosti a důkaz je ukončen. □

Nyní si vcelku snadno můžeme odvodit zásadní souvislosti spojitých zobrazení a topologie reálných čísel:

Theorem

Nechť $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá funkce. Pak

- 1 *vzor $f^{-1}(U)$ každé otevřené množiny je otevřená množina,*
- 2 *vzor $f^{-1}(W)$ každé uzavřené množiny je uzavřená množina,*
- 3 *obraz $f(K)$ každé kompaktní množiny je kompaktní množina,*
- 4 *na libovolné kompaktní množině K dosahuje spojitě zobrazení maxima a minima.*

Důkaz.

- (1) Uvažme $x_0 \in f^{-1}(U)$. Nějaké okolí \mathcal{O} hodnoty $f(x_0)$ je celé v U , protože je U otevřená. Proto existuje okolí \mathcal{O}' bodu x_0 , které se celé zobrazí do \mathcal{O} , patří tedy do vzoru. Každý bod vzoru je tedy vnitřní a tím je důkaz ukončený.
- (2) Uvažme hromadný bod x_0 vzoru $f^{-1}(W)$ a posloupnost x_i , $f(x_i) \in W$, která k němu konverguje. Ze spojitosti f zjevně vyplývá, že $f(x_i)$ konverguje k $f(x_0)$, a protože je W uzavřená, musí i $f(x_0) \in W$. Zřejmě jsou tedy všechny hromadné body vzoru W ve W také obsaženy.
- (3) Zvolme otevřené pokrytí $f(K)$. Vzory jednotlivých intervalů jsou sjednoceními otevřených intervalů a tedy vytvoří pokrytí množiny K . Z něho lze vybrat konečné pokrytí a proto stačí konečně mnoho odpovídajících obrazů i k pokrytí množiny $f(K)$.
- (4) Protože je obrazem kompaktní množiny opět kompaktní množina, musí být obraz ohraničený a zároveň musí obsahovat svoje supremum i infimum. Odtud ale vyplývá, že tyto musí být zároveň maximem a minimem hodnot. □

Důsledek

Nechť $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá. Potom

- 1 obraz každého intervalu je opět interval
- 2 f na uzavřeném intervalu $[a, b]$ nabývá všech hodnot mezi svou maximální a minimální hodnotou.

Důkaz.



(1) Uvažme interval A a předpokládejme, že existuje $y \in \mathbb{R}$ takový, že $f(A)$ obsahuje body menší i větší než y , ale $y \notin f(A)$. Pak vzory otevřených množin $A_1 = f^{-1}((-\infty, y))$ a $A_2 = f^{-1}((y, \infty))$ pokrývají A . Tyto otevřené množiny jsou disjunktní a obě mají neprázdný průnik s A . Nutně tedy existuje $x \in A$, který neleží v A_1 , je ale jejím hromadným bodem. Musí pak ležet v A_2 a to u disjunktních otevřených množin není možné. Proto pokud nějaký bod y nepatří do obrazu intervalu, musí být zároveň všechny hodnoty buď větší nebo menší. Obrazem bude proto opět interval. Všimněme si, že jeho krajní body mohou a nemusí do obrazu patřit. Tvrzení (2) je přímým důsledkem (1). □

Racionální funkce

Nechť f a g jsou dva polynomy, které mohou mít i komplexní hodnoty (tj. připouštíme výrazy $a_n x^n + \dots + a_0$ s komplexními $a_i \in \mathbb{C}$, ale dosazujeme jen reálné hodnoty za x). Pak funkce $h : \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R}, g(x) = 0\} \rightarrow \mathbb{C}$, $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ je dobře definována ve všech reálných bodech kromě kořenů polynomu g . Takové funkce nazýváme **racionální funkce**.

Racionální funkce jsou spojité ve všech bodech svého definičního oboru. V bodech, kde definovány nejsou mohou mít

- konečnou limitu, když jde o společný kořen polynomů f i g (a v tomto případě rozšířením jejich definice o limitní hodnotu v tomto bodě dostaneme funkci i v tomto bodě spojitou)
- nekonečnou limitu, když limity zprava a zleva v tomto bodě jsou stejné
- různé nekonečné limity zprava a zleva.

$a = 0.$ $a = 1.6667$ 

$$h(x) = \frac{(x - 0.05a)(x - 2 - 0.2a)(x - 5)}{x(x - 2)(x - 4)}$$

s hodnotami $a = 0$ a $a = 5/3$.

Obrázek vlevo tedy zobrazuje racionální funkci $(x - 5)/(x - 4)$.

Mocninné funkce

Polynomy jsou seskládány z jednoduchých mocninných funkcí $x \mapsto x^n$ s přirozeným číslem $n = 0, 1, 2, \dots$. Samozřejmý smysl má také funkce $x \mapsto x^{-1}$ pro všechny $x \neq 0$. Tuto definici rozšíříme na obecnou **mocninnou funkci** s $n \in \mathbb{R}$.

Pro $n = -a$ s $a \in \mathbb{N}$ definujeme

$$x^{-a} = (x^a)^{-1} = (x^{-1})^a.$$

Dále jistě chceme, aby ze vztahu $b^n = x$ pro $n \in \mathbb{N}$ vyplývalo $b = x^{\frac{1}{n}}$. Je třeba ale ověřit, že taková b skutečně existují pro dané x . Předpokládejme $x > 0$ a označme B množinu $B = \{y \in \mathbb{R}, y > 0, y^n \leq x\}$. To je zřejmě zhora ohraničená množina a lze ověřit, že pro $b = \sup B$ skutečně platí požadovaná rovnost.

Zdůvodnili jsme tedy existenci x^a pro všechny $x > 0$ a $a \in \mathbb{Q}$.

Mocninná funkce – pokračování

Konečně, pro $a \in \mathbb{R}$, $x > 1$ klademe

$$x^a = \sup\{x^y, y \in \mathbb{Q}, y \leq a\}.$$

Pro $0 < x < 1$ buď definujeme analogicky (je třeba si jen pohrát s nerovnicí) nebo klademe přímo $x^a = (\frac{1}{x})^{-a}$. Pro $x = 1$ je pak $1^a = 1$ pro libovolné a .

Obecnou mocninnou funkci $x \mapsto x^a$ máme tedy dobře definovanou pro všechny $x \in [0, \infty)$ a $a \in \mathbb{R}$.



Exponenciální funkce

Naši konstrukci funkce x^a ale můžeme také číst následujícím způsobem: Pro každé pevné reálné $c > 0$ existuje dobře definovaná funkce na celém \mathbb{R} , $y \mapsto c^y$. Této funkci říkáme **exponenciální funkce o základu c** .

Na obrázcích vidíme funkce $x \mapsto a^x$ a $x \mapsto x^b$ pro jednu konkrétní hodnotu $a = 2.5167$ a $b = 4.5833$.

$a = 2.5167$

$b = 4.5833$



Z našich definic je vcelku zřejmé, že mocninné i exponenciální funkce jsou spojité na celých svých definičních oborech. Zároveň se ze spojitosti definice pomocí suprem množin hodnot zjevně přenáší základní vlastnosti platné pro racionální čísla, a , x , y :

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}, \quad (a^x)^y = a^{x \cdot y}.$$

Definition

Nechť f je reálná nebo komplexní funkce s definičním oborem $A \subset \mathbb{R}$ a $x_0 \in A$. Jestliže existuje limita

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

pak říkáme, že f má v bodě x_0 **derivaci** a . Píšeme často $a = f'(x_0)$ nebo $a = \frac{df}{dx}(x_0)$ případně $a = \frac{d}{dx}f(x_0)$.

Derivace funkce je **vlastní**, resp. **nevlastní**, když je takovou příslušná limita.

Jednostranné derivace (tj. derivaci zprava a zleva) definujeme zcela stejně pomocí limity zprava a zleva.

Z formulace definice lze očekávat, že $f'(x_0)$ bude opět umožňovat dobře aproximovat danou funkci pomocí přímky

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Takto lze vnímat následující lemma, které říká, že nahrazením konstantního koeficientu $f'(x_0)$ vhodnou spojitou funkcí dostaneme přímo hodnoty f .

Lemma

Reálná nebo komplexní funkce má v bodě x_0 vlastní derivaci, právě když existuje na nějakém okolí $\mathcal{O}(x_0)$ funkce ψ spojitá v x_0 a taková, že pro všechny $x \in \mathcal{O}(x_0)$ platí

$$f(x) = f(x_0) + \psi(x)(x - x_0).$$

Navíc pak vždy $\psi(x_0) = f'(x_0)$.

Důkaz.

Nejprve předpokládejme, že $f'(x_0)$ je vlastní derivace. Pokud má ψ existovat, má jistě tvar $\psi(x) = (f(x) - f(x_0))/(x - x_0)$ pro všechny $x \in \mathcal{O} \setminus \{x_0\}$. V bodě x_0 naopak definujme hodnotu derivací. Pak jistě

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = f'(x_0) = \psi(x_0)$$

jak je požadováno.

Naopak, jestliže taková funkce ψ existuje, tentýž postup vypočte její limitu v x_0 . Proto existuje i $f'(x_0)$ a je $\psi(x_0)$ rovna. □

Geometrický význam derivace

Předchozí lemma lze názorně vysvětlit geometricky a tím popsat smysl derivace. Říká totiž, že na grafu funkce $y = f(x)$, tj. na příslušné křivce v rovině se souřadnicemi x a y , poznáme, zda existuje derivace podle toho, jestli se spojitě mění hodnota směrnice sečny procházející body $[x_0, f(x_0)]$ a $[x, f(x)]$. Pokud ano, pak limitní hodnota této směrnice je hodnotou derivace.

Corollary

Má-li reálná funkce f v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ derivaci $f'(x_0) > 0$, pak pro nějaké okolí $\mathcal{O}(x_0)$ platí $f(b) > f(a)$ pro všechny body $a, b \in \mathcal{O}(x_0)$, $b > a$.

Je-li derivace $f'(x_0) < 0$, pak naopak pro nějaké okolí $\mathcal{O}(x_0)$ platí $f(b) < f(a)$ pro všechny body $a, b \in \mathcal{O}(x_0)$, $b > a$.

Důkaz.

Uvažme prvý případ. Pak podle předchozího lematu platí $f(x) = f(x_0) + \psi(x)(x - x_0)$ a $\psi(x_0) > 0$. Protože je ale ψ v x_0 spojitá, musí existovat okolí $\mathcal{O}(x_0)$, na kterém bude $\psi(x) > 0$. Pak ale s rostoucím x nutně poroste i hodnota $f(x)$.

Stejná argumentace ověří i tvrzení se zápornou derivací. □

Funkce, které mají vlastnost $f(b) > f(a)$ kdykoliv $b > a$ pro nějaké okolí bodu x_0 se nazývají **rostoucí v bodě** x_0 . Funkce rostoucí ve všech bodech nějakého intervalu se nazývá **rostoucí na intervalu**. Podobně je funkce **klesající v bodu**, resp. **klesající na intervalu**, jestliže $f(b) < f(a)$ kdykoliv je $a < b$.

Funkce která má v bodě nenulovou konečnou derivaci je v tomto bodě buď rostoucí nebo klesající podle znaménka této derivace.