



# Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin

## Vyšší rostliny: vznik a hlavní znaky

### Petr Bureš



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# **Vyšší rostliny: „laickýma očima“**

# Co k nim patří?

„land plants“ = suchozemské rostliny

## mechorosty



hlevíky  
jatrovky  
mechy

## kaprad'orosty



plavuně



nahosemenné



## krytosemenné



# Jak jsou velké?

## Velikostní variabilita vyšších rostlin

od mm (na hladině plovoucí *Wolffia* příbuzná okřešků)  
po desítky metrů (gigantické jehličnany čel. *Taxodiaceae*).


*General Sherman* největší sekvojový strom (*Sequoiadendron giganteum*) roste v Sequoia National Park v Kalifornii.  
v = 83,8 m, průměr kmene = 7,7 m, objem = ca 1487 m<sup>3</sup>, věk = 2300 – 2700 let.

*Wolffia columbiana* (Araceae)




# Kolik jich je ?

Druhová diverzita vyšších rostlin: po živočiších nejbohatší  
- asi 290 tisíc druhů.



**velmi  
hrubé  
odhady,  
omezené  
úrovni  
poznání !**




# Vztah k ostatním živým organizmům

Hmotnostní podíl na biomase: oproti živočichům mnohem vyšší. Vyšší rostliny tvoří kostru většiny ekosystémů zemského povrchu.




# Vztah k ostatním živým organizmům

Základna potravní pyramidy. Vyšší rostliny tvoří zdroje potravy býložravců, člověka a dalších členů potravní pyramidy



# Vztah k ostatním živým organizmům

Podíl vyšších rostlin na **tvorbě kyslíku** v atmosféře je zásadní.



Na druhé straně vzrůst podílu kyslíku v atmosféře, vlivem řas a sinic, byl limitujícím faktorem terestrializace a tedy i vzniku vyšších rostlin a diverzifikace terestrických živočichů, především obojživelníků, plazů, savců a hmyzu.



# Význam pro člověka

Vyšší rostliny měly klíčovou roli ve vývoji lidské civilizace.



# Vyšší rostliny: fylogenetické postavení

# Rostliny ve stromu života

Strom života má tři imperia


1. *Bacteria*

2. *Archaea*

3. *Eukarya*

Membránami ohraničené organely:  
mitochondrie, Golgiho aparát,  
endoplazmatické retikulum a jádro s chromosomy  
nuleoproteinovými strukturami organizujícím  
během mitózy

Rostliny (vč. vyšších  
patří do imperia *Eukarya*






Spolu se zelenými řasami, ruduchami a glaukofyty patří vyšší rostliny do říše *Plantae*

# Imperium *Eukarya*, eukaryotní část stromu života, zahrnuje ještě další říše

## Říše *Chromista*

## Říše *Plantae*



skrytěnky, zlativky, hnědé řasy, rozsivky, ...

**Další 3 říše: *Amoebozoa*, *Rhizaria*, *Excavata***

**Říše *Opistoconta***



houby, živočichové



# Kdy vznikly rostliny?



Gigantické jednobuněčné řasy poprvé možná již před 2,1 mld. let ve starším proterozoiku

Science 10 July 1992:  
Vol. 257 no. 5067 pp. 232-235  
DOI: 10.1126/science.1631544

[< Prev](#) | [Table of Contents](#) | [Next >](#)

**Megascopic eukaryotic algae from the 2.1-billion-year-old neogaunee iron-formation, Michigan**

TM Han and B Runnegar



*Grypania* = nejstarší fosílie řas ?

Recentní gigantické jednobuněčné zelené řasy *Acetabularia* a *Caulerpa*



# Kdy vznikly rostliny?


Multicelulární řasy poprvé před 1,2 mld. let

*Paleobiology*, 26(3), 2000, pp. 386–404

*Bangiomorpha pubescens* n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes

Nicholas J. Butterfield

**Abstract.**—Multicellular filaments from the ca. 1200-Ma Hunting Formation (Somerset Island, arctic Canada) are identified as bangiacean red algae on the basis of diagnostic cell-division patterns. As



stř.  
proterozoikum

Recentní *Bangia*  
(*Rhodophyta*)

FIGURE 3. *Bangiomorpha pubescens* n. gen., n. sp. Thin-section identification and England Finder coordinates appear in parentheses. A, HUPC 63000 (HUST-1P, M-32). B, HUPC 62995 (HUST-1Q, O-45), paratype; note the hierarchically paired cells reflecting diffuse transverse intercalary cell division. C, HUPC 63001 (HUST-1Q, P-25); note the multiserial portions of the filament, unaccompanied by filament expansion; scale as for A.

# Fylogenetický vztah k ostatním rostlinám

říše *Plantae* (*Archaeplastida*)

podříše *Biliphytobionta*

oddělení *Glaucophyta*  
oddělení *Rhodophyta*



Sesterská  
k zeleným  
rostlinám

podříše *Viridaeplantae* - zelené rostliny

vývojová linie: *Chlorophytae* - zelené řasy



vývojová linie: *Streptophytae*

vývojová větev *Charophytae* - parožnatky



vývojová větev *Bryophytae* - mechorosty



vývojová větev *Cormophytae* - cévnaté rostliny



Vyšší rostliny zahrnují dvě vývojové větve v podříši *Viridaeplantae*

# Fylogenetický vztah k ostatním rostlinám

říše *Plantae* (*Archaeplastida*)

podříše *Biliphytobionta*

**podříše *Viridaeplantae* (=Chlorobionta) - zelené rostliny**

**zelené řasy + parožnatky + vyšší rostliny**


**hlavní znaky: (1) stavba chloroplastu,  
(2) zásobní a stavební polysacharidy,  
(3) rodozměna**

Vyšší rostliny zahrnují dvě vývojové větve v podříši *Viridaeplantae*



# podříše *Viridaeplantae*

Vedle chlorofylu a navíc také (1) chlorofyl b (nikoli c, d nebo jen a)



Výjimku tvoří nečetní paraziti, u nichž mohou tato barviva chybět

# podříše *Viridaeplantae*





Chloroplasty obsahují

(2) škrobová zrna,

(3) tylakoidy vytvářející lamely a grana (10–100/chloroplast)

(4) NEmají fykobilizomy



(= kulovité bílkoviny na povrchu tylakoidů u ruduch, glaukofytů, popř. sinic)





5  $\mu$ m

# podříše *Viridaeplantae*

**Polysacharidy:** (5) celulóza – tvořící mikrofibrilární strukturu (tl. 3 nm) buněčné stěny a (6) škrob – hlavní zásobní polysacharid



U škrobu glukóзовé jednotky spojeny vazbou v alfa 1,4 pozici u celulózy pak v beta 1,4 pozici



**Celulózní exoskelet buňky = preadaptace na mnohobuněčnost a terrestrializaci !!!**



# podříše *Viridaeplantae*

## (7) Mají rodozměnu

gamety - stejnocenné  
- různé velikosti

- volné
- oosféra chráněna v archegoniu (ve streptophytní linii)

zygota - vytvoří zygospóru s následnou meiozou,  
- vytvoří diploidní stélku




# Fylogenetický vztah k ostatním rostlinám

říše *Plantae* (*Archaeplastida*)

podříše *Biliphytobionta*

oddělení *Glaucophyta*  
oddělení *Rhodophyta*



podříše *Viridaeplantae* - zelené rostliny

vývojová linie: Chlorophytae - zelené řasy



vývojová linie: *Streptophytae*

parožnatky + vyšší rostliny

specifický průběh (1) mitózy, (2) cytokinéze i (3) rodozměny


(4) plasmodesmy

Vyšší rostliny zahrnují dvě vývojové větve v podříši *Viridaeplantae*

# vývojová linie: *Streptophytae*

## (1) Otevřená mitóza

uzavřená  
pleuromitóza




*Prasinophyceae,*  
*Ulvophyceae,*

jaderná  
membrána  
zůstává  
při mitóze  
zachovaná



částečně otevřená  
ortomitóza




*Chlorophyta*

polární  
okénka s  
centriolami

fycoplast



otevřená  
ortomitóza



*Charophyceae* a vyšší  
rostliny


jaderná  
membrána  
se rozpouští  
na počátku  
mitózy

fragmoplast

buněčná  
destička

# vývojová linie: *Streptophytae*

Během cytokinéze se tvoří (2) fragmoplast



**Fykoplast a fragmoplast** = odlišně orientované mikrotubulární systémy, při cytokiněze se podílejí na vzniku buněčné stěny fykoplast - mikrotubuly kolmo na spojnici dceřinných jader; fragmoplast - mikrotubuly souběžně se spojnici dceřinných jader

# vývojová linie: *Streptophytae*

(3) Oogamie = samičí gameta - oosféra je nepohyblivá, samčí je menší a pasivně nebo aktivně se k oosféře dostává.





FIGURE 3.4 Haplontic life cycles in some of the green plants. A. Isogamy. B. Oogamy.


Oogamie se nezávisle vyvinula i v jiných skupinách řas nebo u živočichů



# vývojová linie: *Streptophytae*


## (4) plasmodesmata

Nejde jen o pasivní otvory. Průchod látek jimi je aktivně regulován.  
Prochází jimi také endoplazmatické retikulum.



# Chlorophytae


různorodá skupina od jednobuněčných bičíkatých i bezbičíkatých řas, řas tvořících pohyblivé i nepohyblivé kolonie, vlákna i složité stélky ve slaných i sladkých vodách popř. na vlhkých stanovištích i na souši





**Streptophytae**  
**Chlorophytae**

FIGURE 1.3 Simplified cladogram (evolutionary tree) of the green plants, illustrating major extant groups and evolutionary events (or apomorphies, hash marks). \*Embryophytes are treated as plants in this book.

**Chlorophytae je parafyletická skupina**  
**Streptophytae je monofyletická skupina**



# Sesterská skupina vyšších rostlin = *Coleochaetales* = řád třídy *Charophyceae*



Recentní *Coleochaete* a silurská *Parka*






*Coleochaete*

játrovka *Riccia*



*Coleochaete* - ploché terčíkovité přisedlé stélky. Z vegetativních buněk trčí chlup s pomalu rotujícím chloroplastem uvnitř (jedna otočka za dvě minuty).

# Sesterská skupina = *Coleochaetales*



Dvoubičíkaté spermatozoidy z antheridií zachyceny v zúžené části lahvicovitého oogonia. Zvětšená zygota obalena vlákny z okolních buněk přezimuje jako sporokarp; na jaře se rozdělí na 16-32 zoospor a ty vyrostou do nových stélek. Připomíná to poněkud redukovaný sporofyt v životní cyklu jätrovek (vpravo dole).

# Sesterská skupina = *Coleochaetales*

V současnosti řád *Coleochaetales*

ca 15 druhů rostoucích hlavně na povrchu sladkovodních rostlin.


O blízkosti k vyšším rostlinám svědčí zejména:

1. Jen u *Coleochaete* v rámci *Charophyt* zůstává zygota na mateřské rostlině (ve sporokarpu) a prodělává zde následný vývoj až po vznik spór podobně jako sporofyt mechorostů
2. Morfologická podobnost ve stavbě stélky, např. u *Coleochaete orbicularis*, a stélky frondózních jätrovek
3. Sekvenční podobnost molekulárních evolučních markerů *Coleochaete* a jätrovek



vznik vyšších rostlin =  
terrestrializace =  
= rostliny se adaptovaly na  
souš

Rostliny na souš nepřešly, nýbrž  
se tam, nikoli vlastní vinou, ocitaly. K  
přežívání docházelo na stanovištích s  
periodickým zaplavováním v  
pobřežních zónách.



# Vyšší rostliny:

## Podmínky terestrializace

(podmínky kolonizace souše rostlinami)



Copyright © Walter Myers





# Podmínky terestrializace

## (1) Dosažení vyšší koncentrace atmosférického O<sub>2</sub>

Umožnilo to biosyntézu ligninu – základního prvku oporných a vodivých pletiv rostlin

Kyslík vytvořily fotosyntézou sinice







# Podmínky terestrializace

## (2) vytvoření ozónové vrstvy jako ochrany před ultrafialovým zářením


Ozón vznikl z  $O_2$  elektrickými výboji v atmosféře při bouřích



# Podmínky terestrializace

(3) Růst koncentrace atmosférického CO<sub>2</sub>  
=> vznik půd činností mikroorganismů

V kambriu a ordoviku ho bylo 18x víc než dnes !



- (i) Větší fotosyntéza = víc biomasy = víc živin po jejím rozkladu
- (ii) Kyselejší déšť = intenzivnější oxidace hornin
- (iii) Experimentálně prokázán vztah mezi aktivitou půdních organismů a vyšším CO<sub>2</sub>, při jejich vyšší aktivitě – víc vody do půdy

# Podmínky terestrializace

## (4) Vlhké klima

vysoká koncentrace atmosférického CO<sub>2</sub> podmiňovala teplé klima; avšak na J pólu byl tehdy kontinent Gondwana




V okolí jižního polárního ledovce bylo mezi vlhkým a horkým pobřežím a chladným vnitrozemím Gondwany zřejmě monzunové klima

Dostatek srážek podporoval půdotvorbu a poskytoval vlhkost = ideální klima pro terestrializaci

# Mykorrhiza podmínkou terestrializace ???

symbióza zelených řas a některých akvatických hub, snad oomycet mohla spustit terestrializaci (houba pomáhá rostlině k živinám na souši)

Taky lichenická forma symbiózy mohla přispět k půdotvorbě a tím také k terestrializaci



Fosilie permských lišejníků




Recentní lišejník

První lišejníky již v permu před 400 mil. lety

# Terrestrializace a polyploidie ???

Aglaophyton



50 μm

Horneophyton



Crassula



Umožnil vysoký obsah CO<sub>2</sub> tolerovat velké průduchy jinak nevýhodné a tím velikost buněk poskytla prostor pro výraznou polyploidizaci nebo aktivitu retrotranspozonů ???


# Kdy došlo k terestrializaci ?

# Kdy došlo k terestrializaci ?

Nejstarší makrofosílie vyšších rostlin – ryniofytní rostlina

*Cooksonia* –  
rozhraní střední - svrchní silur:



**428 miliónů let**



# Kdy došlo k terestrializaci ?

**Nejstarší makrofosílie** vyšších rostlin – ryniofytní rostlina *Cooksonia* – rozhraní střední - svrchní silur:

**428 miliónů let**



**Nejstarší mikrofosílie** vyšších rostlin = tetrádní spóry z rozhraní spodní - svrchní ordovik:

**470 miliónů let**



A late Silurian sporangium. **Green:** A spore tetrad. **Blue:** A spore bearing a trilete mark – the Y-shaped scar. The spores are about 30-35  $\mu\text{m}$  across



# Kolonizace souše rostlinami

aneb

1. Co rostliny přechodem na souš získaly?
2. Jak se vyrovnaly s tím, co oproti vodním prostředí ztratily?

# Co rostliny přechodem na souš získaly?

(1) přístup ke světlu

(2) přístup k efektivnímu využití CO<sub>2</sub>

(3) větší diverzitu prostředí a opylovačů (ale i herbivorů a parazitů)

# Co rostliny přechodem na souš ztratily?

(1) Ztratily oporu zajišťovanou vodním prostředím; tím byly vystaveny vlivům gravitace, větru, váze dešťové vody, sněhu, námraze ...



# Co rostliny přechodem na souš ztratily?

(2) Byly vystaveny vysychání



(3) Nemohly přijímat živiny celým povrchem těla





# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

(1) Odolnost proti gravitaci, větru, sněhu, námraze,

**Zvýšení konstrukční pevnosti:**

(1a) lignin a jeho depozice v buněčných stěnách a tím tvorba oporných pletiv popř. i pletiv chránících před býložravci



Strukturní jednotka ligninu



Sklerenchymatické provazce v listu bromélie

Tyto tvoří podstatně jak stěnu živých buněk, tak „kostru“ odumřelých pletiv

# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

(1) Odolnost proti gravitaci, větru, sněhu, námraze,

**Zajišťuje dále:**

(1b) fixace rostliny pomocí kořene, oddenku či úponků.



# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly



(2) ochrana před vysycháním způsobeným kontaktem rostliny se vzduchem.

Zajišťují ji:

(2a) kutikula (voskové biopolymery) a její deriváty (voskové šupiny)

(2b) regulovatelný dýchací aparát průduchy  $\text{CO}_2 / \text{O}_2$

(2c) ochranné oděnění - trichomy



# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

## (2) ochrana před vysycháním


### Průduchy:

nekomunikují s okolními buňkami přes plasmodesmy,

mají chloroplasty, zbytek pokožky nezelený

otvírání a zavírání pomocí turgoru

mechanismem protonové pumpy  $K^+$  iontů






# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

## (2) ochrana před vysycháním


### Kutikula

tenká vosková blanka bránící výparu z pokožkových buněk.  
jsou v ní otvory nad průduchovou štěrbinou.




# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

(2) ochrana před vysycháním **Trichomy** vytvářející vyšší vrstvu nepohyblivého vzduchu „boundary layer“ nad průduchy = adaptace snižující výpar



Povrch listu šalvěje (*Salvia*, *Lamiaceae*)




Povrch listu olivy (*Olea*, *Oleaceae*)



Povrch listu epifytické rostliny *Tillandsia* (*Bromeliaceae*)

# Kutikula a průduchy jedle, dubu, opuncie, brukve a přesličky



# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

## (2) ochrana před vysycháním

V případě gametangií zajišťuje ochranu proti suchu:

(2d) obal z alespoň **jedné vrstvy buněk**, které se na tvorbě gamet ani na procesu oplození neúčastní;



# Jak se rostliny s podmínkami souše vyrovnaly

(3) nutnost transportu látek přijímaných dále ve formě vodního roztoku z půdy

zajišťují

(3a) kořeny a kořenové vlášení (nemají kutikulu)

(3b) vodivá pletiva





xylem - tracheida      intercelulára      xylem - trachea




sklerenchym

floem




**xylemová céva**





**floemová sítkovice**

## Tracheidy




**Xylemová  
sklerenchymatická  
vlákna**



**schodovitě  
perforované**



## Tracheje

**široké s  
jednoduchou  
perforací**





sklerenchymatická vlákna


tracheidy



tracheje




- zúžený uzavřený konec
- buněčná stěna
- spirální ligninové výztuhy
- otvory




Tracheidy


různé typy ligninových výztuh



tracheidy s dvůrkatými otvory u borovice



- prázdná dutina
- buněčná stěna
- spirální ligninové výztuhy
- otvory
- zbytky buněčných stěn před jejich rozrušením



Tracheje



Důsledek terestrializace je tak:


komplex apomorfii, tvořících funkční a tvarové členění těla (cormus) cévnatých rostlin na 3 základní orgány:

1. kořen,
2. stonek,
3. listy,

tvořené pravými pletivy

Bezcévnaté (mechorosty) mají stavbu jednodušší.

Proto vyšším rostlinám říkáme někdy *Cormophyta*





# Vztah mezi velikostí, prostředím a vnitřní stavbou

Mechy: čím větší sporofyt, tím dokonalejší vodivé elementy.

Cévnaté rostliny s velmi redukovanou velikostí: redukce či ztráta cévních svazků, popř. dalších orgánů.

U některých okřehků (čeleď *Lemnaceae*, *Magnoliophyta*) tak došlo až k úplné ztrátě kořenů a cévních svazků u druhu *Wolffia* (1.5 mm), který je tvořen v nekvetoucím stavu polokulovitými tělísky téměř stejnotvarého pletiva.




**Gametofyt** = pohlavní fáze rodozměny,

1. Finálním produktem pohlavní buňky (gamety), vznikající v pohlavních orgánech (gametangiích):

v archeconiích jediná vaječná buňka (oosféra);

v antheridiích obrvené spermatozoidy nebo nepohyblivé spermatické buňky


2. Jádra buněk gametofytu mají proti sporofytu poloviční obsah DNA v jádře, jsou haploidní ( $n$ ).



# Sporofyt = nepohlavní fáze rodozměny

1. Finálním produktem spory (u výtrusných vyšších rostlin) nebo vajíčka a pyl (u semenných vyšších rostlin).

2. Protože sporofyt vyrůstá ze zygoty, tj. buňky vzniklé splynutím haploidních gamet odlišného pohlaví, je fází diploidní ( $2n$ ), má oproti gametofytu dvojnásobný obsah jaderné DNA.



Diploidní sporofyt ve sporangiích (výtrusnicích) produkuje haploidní spóry, jejichž vznik je provázen redukčním dělením (meiosou), čímž se ve finále úroveň vrací zpět k haploidnímu stavu a kruh rodozměny se uzavírá.

## Spóra vers. semeno

V obou případech jde větší či menší tělíska tvořící klidové stadium rostlin odolné proti působení nepříznivých faktorů, umožňující tak přežívání rostlin v nepříznivých obdobích sezóny a zároveň je efektivním prostředkem šíření rostlin v prostoru.




# Spóra čili výtrus

jednobuněčné rozmnožovací tělísko

vzniklé meiotickým dělením v zárodečné vrstvě sporangia

Recentními výtrusnými vyššími rostlinami jsou

1. mechorosty *Marchantiophyta*  
*Bryophyta*  
*Anthoceroophyta*
2. plavuně *Lycopodiophyta*
3. kaprad'orosty *Monilophyta*



spóra *Lycopodium clavatum*

# Semeno

mnohobuněčný rozmnožovací orgán

vzniklý z oplozeného vajíčka

na povrchu má osemení (testa)

uvnitř má živná pletiva (perisperm popř. endosperm) a zárodek (embryo).

Recentními semennými rostlinami jsou

4. nahosemenné a

5. krytosemenné.

