



MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE

CZ.1.07/2.2.00/15.0204



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Takakiopsida

Sphagnopsida

Andreaeopsida

Andreaeobryopsida

Polytrichopsida

Tetraphidopsida

Bryopsida: Buxbaumiidae
 Diphysciidae
 Funariidae
 Dicranidae
 Bryidae
Hypnidae

Hylocomium splendens

Thuidium philibertii

Rhytidadelphus squarrosus,
R. triquetrus

Pleurozium schreberi

Calliergonella cuspidata

Amblystegium serpens

Brachythecium rutabulum,
B. albicans

Brachytheciastrum velutinum

Sciuro-hypnum populeum

Homalothecium sericeum,
Tomentypnum nitens

Eurhynchium hians

Hylocomium splendens





Hylocomium splendens

2–3x zpeřená lodyžka,
patrovitě uspořádaná
parafylie

žebro krátké, dvojité

křídelné buňky ztloustlé

lístek vejčitý, náhle ve špičku zúžený



Thuidium philibertii



Thuidium philibertii

2–3x pravidelně, zpeřená lodyžka

parafylie

lístky lodyžní a větevní odlišného tvaru


žebro jednoduché, pod špičku

buňky krátké, okrouhlé, papilnaté

vrcholová buňka větev. lístku končí

2–3 hrotů

lodyžní lístek jemně, dlouze zašpičatělý



Pleurozium schreberi



Pleurozium schreberi


skoro pravidelně zpeřené

lodyžka červená

žebro krátké, dvojité

křídelné buňky oválné, ztloustlé

lístky střechovitě položené, vejčité, vyduté,
široká, vroubkovaná špička





Rhytidadelphus squarrosus



Rhytidadelphus squarrosus

nepravidelně větvené lodyžky

žebro dvojité, krátké

křídelné buňky šestiboké

lístky kostrbatě zpět odehnuté,
vejčitá báze



Rhytidadelphus triquetrus

žebro dvojité, asi do $\frac{1}{2}$ délky

křídelné buňky slabě odlišené

lístky kostrbatě zpět odehnuté,
ze srdčité báze pozvolna zúžené





Calliergonella cuspidata



Calliergonella cuspidata

řídce zpeřená lodyžka,
konce větví svinutými lístky hrotité
žebro krátké, dvojité
křídelné buňky nafouklé, šestiboké,
bezbarvé
lístek vejčitý, tupý, vydutý



Amblystegium serpens






Amblystegium serpens

většinou drobné,
nepravidelně větvené

žebro jednoduché, asi do $\frac{1}{2}$
délky

křídelné buňky krátce
obdélníkovité

lístky z vejčité base kopinaté




Brachythecium rutabulum



Brachythecium rutabulum

- štět drsný (=bradavčitý)
- nepravidelně větvená lodyžka
- žebro jednoduché
- křídelní buňky oválné
- lístky široce vejčité, ± řáskaté,
± vyduté



Brachythecium albicans



Brachythecium albicans



štět hladký

nepravidelně větvená lodyžka,
lístky přilehlé ale
s odstávajícími špičkami

žebro jednoduché

křídelné buňky čtvercové

lístky vejčité, dlouze šídlovitě
zašpičatělé



Brachytheciastrum velutinum



***Brachytheciastrum velutinum* (*Brachythecium* v.)**



štět drsný

žebro jednoduché

křídelné buňky drobné, čtverové

lodyžní l. vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé

větevní l. obloukovitě odstálé, pilovité, s na hřbetě trnem vybíhajícím žebrem



Sciuro-hypnum populeum



Sciuro-hypnum populeum (*Brachythecium p.*)



štět drsný

nepravidelně větvená lodyžka


žebro jednoduché, až do špičky
dosahující

křídelné buňky čtvercové

lístek z vejčité podlouhlé base kopinatě
šídlovitý, vydutý



Eurhynchium hians



Eurhynchium hians



nepravidelně větvená lodyžka,
listky oddálené

listek vejčitě trojboký, pilovitý

žebro jednoduché,

vybíhá na hřbetě jako trn

křídelné buňky málo odlišené






Homalothecium sericeum



Homalothecium sericeum

větve za sucha srpovitě zatočené
lístek kopinatý, dlouze zašpičatělý,
ráskatý
žebro jednoduché, končí před špičkou
drobné křídelné buňky



***Tomentypnum nitens* (*Homalothecium n.*)**



Tomentypnum nitens (*Homalothecium n.*)

statné, hnědě vlášenité rostlinky

listek kopinatý, dlouze zašpičatělý,
řáskatý

žebro jednoduché, pod špičku

na bázi l. a hřbetě žebra rhizoidy
(rh. vlášení)

