

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie

DIFERENCIACE BUNĚK

RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
Ústav experimentální biologie PŘF MU



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Program přednášky:

- diferenciační potenciál buněk
- diferenciační dráhy
- růstové faktory
- indukovaná diferenciace




Vývoj mnohobuněčného organismu

- identický genom ve všech buňkách
- kontrola na úrovni genové exprese
 1. buněčná proliferace
 2. diferenciaci buněk
 3. buněčné interakce
 4. pohyb buněk
 5. buněčná smrt

Lidský organismus:

1 zygota → 10^{13} buněk (250 různých typů)





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.




DIFERENCIAČNÍ POTENCIÁL BUNĚK

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Časná embryogeneze u savců:

- zygota
- morula (8, resp. 16 buněk = blastomery)
- blastocysta (~ 64 buněk)



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Blastocysta:

- trofoektoderm →
extraembryonální tkáň (placenta)
- inner cell mass (ICM) →
embryo

Gastrulace → 3 zárodečné listy:

- ektoderm (neurální a epidermální buňky)
- mesoderm (svalová a pojivová tkáň)
- endoderm (epitel vnitřních orgánů)



Ektoderm

- CNS
- sítnice a čočky
- lebeční a senzorická ganglia a nervy
- pigmentové buňky
- pojivová tkáň hlavy
- epidermis
- vlasy, ochlupení
- prsní žlázy



Mesoderm


- lebka a kostra
- svalová tkáň (lebka i kosterní svalstvo)
- dermis
- pojivová tkáň
- urogenitální systém
- střevní svalovina
- srdce
- krevní a lymfatické buňky
- slezina



Endoderm

- žaludek
- tračník
- játra
- slinivka
- močový měchýř
- epiteliální výstelka průdušnice, plic, hltanu, štítné žlázy, střev





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Totipotence

- nelimitovaný diferenciační potenciál
- schopnost tvořit embryonální i extraembryonální tkáně
- časná stádia rýhování zygoty (1-4 dny)


Pluripotence

- schopnost tvořit buňky všech 3 zárodečných listů
- buňky ICM (embryonální kmenové buňky, 5-14dní)

Multipotence

- schopnost tvořit buňky příslušného typu tkáně
- např. hematopoetické kmenové buňky, neuronální kmenové buňky...






totipotentní buňka
(zygota, blastomery)

pluripotentní buňky
(embryonální kmenové)

multipotentní buňky
(hematopetické kmenové)

progenitorové buňky

terminálně diferencované
buňky



Rozdíl v diferenciačním potenciálu kmenových a progenitorových buněk

Eukaryontní buňka:

- 5000 různých bílkovin (10^9 - 10^{10} molekul)
- každý buněčný typ vytváří asi 100 specifických proteinů
 - housekeeping genes:
exprimovány konstitutivně na relativně nízké úrovni ve všech buňkách organismu
 - housekeeping proteins:
esenciální metabolické enzymy, buněčné komponenty
- exprese různých genů závisí na typu buňky, fázi buněčného cyklu atd.



Příčiny diferenciaci:

- postupné změny v aktivitě genů (programovány v genomu)
- odpověď na molekulární signály vysílané ostatními buňkami
- odpověď na fyzikální kontakt s ostatními buňkami



Signály regulující diferenciaci

- Solubilní regulátory
 - Hormony (glukagon, hydrokortison, tyroxin,...)
 - Růstové faktory (TGF-transformující růstový faktor, FGF-fibroblastový růstový faktor, interleukiny, ...)
 - Vitaminy (D, A ...)
 - Ionty (Ca^{2+} , ...)

- Fyzické kontakty mezi buňkami (gap junctions)

- Kontakt buněk s mezibuněčnou matrix (kolagen, laminin, ...)


- Polarita a tvar buněk

- Fyzikální parametry prostředí (teplota, parciální tlak O_2 , ...)



Molekulární mechanismy diferenciace

- nejdůležitějším místem regulace je iniciace transkripce
- vazba regulačních proteinů na specifické sekvence DNA (regulační oblasti)
- relativně malý počet strukturních motivů



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.




Molekulární mechanismy diferenciace

- 2 základní mechanismy účinku regulačních proteinů:
 - a) ovlivnění vazby RNA polymerázy a transkripčních faktorů na promotor
 - b) lokální modifikace struktury chromatinu v oblasti promotoru
- kombinace regulačních proteinů
- u člověka asi 3000 TFs
- ± 5 TFs působí společně a reguluje transkripci jednoho genu
- jeden TF reguluje více genů (pozitivně i negativně)
- tkáňová specifita




Zachování exprese genů po rozdělení buňky




Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



DIFERENCIAČNÍ DRÁHY

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Diferenciace

buňky směřovány do určitého vývojového směru (linie) – tento stav nelze měnit (například buňky erytroidní linie „nepřeskočí“ do linie myeloidní)

Dediferenciace


ztráta diferencovaného fenotypu

- je obvyklá *in vitro* (adaptace na kultivační podmínky)
- *in vivo* u nižších živočichů (regenerace obojživelníků)
- experimentálně – příprava iPS cells

Transdiferenciace


schopnost určitých buněk určité tkáně (včetně SCs nebo progenitorů) diferencovat do buněk typických pro jiné orgány nebo tkáně (např. hematopoetické)





Epigenetic landscape: H.C. Waddington (1957)


Epigenetic landscape: T. Graf & T. Enver (2009)
- role transkripčních faktorů




Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Indukovaná transdiferenciace






Diferenciační potenciál hematopoetických kmenových buněk


Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.






Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.





Some hematopoietic growth factors and their target cells


Type of growth factor	Responding hematopoietic cells
Erythropoietin (EPO)	Erythroid progenitors
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF)	Granulocytes, neutrophils
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)	Granulocytes, macrophages
Interleukin-3	Multipotent precursor cells
Stem cell factor (SCF)	Stem cells
Macrophage colony-stimulating factor (M-CSF)	Macrophages, granulocytes




Vliv TFs na diferenciaci krevních buněk



Porucha diferenciácie krevných buněk




Průběh neuronální diferenciace



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.






Regulace neuronální diferenciace

TGF-β superfamily

- TGF-β (1-3)
- BMPs
- nodal
- activin

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.






Neuronální diferenciace

Kmenová buňka:

- nestin
- GFAP
- DNA




Neuronální
diferenciace

Progenitorová
buňka:

- β -tubulin III
- GFAP
- DNA

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.





Neuronální diferenciace

Neurony:

- β -tubulin III
- DNA


Gliové buňky:

- GFAP
- DNA

Diferenciace příčně pruhované svaloviny


diferenciaci doprovází

- zástava buněčného cyklu
- změna morfologie
- fúze v syncytia



Diferenciace příčně pruhované svaloviny

- svalové prekurzory exprimují *mrf4*, *myf5* a *myoD*
- *in vitro*: po odstanění růstových faktorů se spustí diferenciace
- exprese svalově specifických proteinů:
myogenin, svalový aktin, myosin II, tropomyosin ...



RŮSTOVÉ FAKTORY

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Růstové faktory (Growth Factors)

- vazba na příslušný membránový receptor
- aktivace specifické intracelulární signální dráhy
- stimulace přežívání a růstu buněk (metabolismus, zvyšování objemu, antiapoptotické)
- některé fungují i jako mitogeny (např. PDGF), resp. induktory diferenciaci
- např. cytokiny, hormony (insulin), ... růstové faktory

Cytokiny

- signální proteiny ovlivňující buněčnou proliferaci, diferenciaci a imunitní odpověď
(interleukiny, G-CSF, GM-CSF...)



Příklady růstových faktorů

EGF (Epidermal Growth Factor)

- specifická vazba na EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)
→ aktivace RTK kaskády


FGF Family (Fibroblast Growth Factor)

- 22 molekul
- FGF2 = bFGF (basic fibroblast growth factor)
- receptory FGFR1-4

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)

- stimulace vaskulárních endotelií → angiogeneze
- v případě hypoxie - exprese HIF -> VEGF





Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.




TGF (Transforming Growth Factor)

- up-regulace u některých typů nádorů
- schopnost indukovat nádorovou transformaci v podmínkách *in vitro* (kryší fibroblasty ledvin)
- TGF- α (makrofágy, mozkové buňky, keratinocyty):
vývoj epitelu - příbuznost s EGF, vazba na EGFR
- TGF- β - isoformy β 1, β 2, β 3: diferenciaci buněk,
vývoj embrya, regulace imunitního systému, apoptóza




Neurotrofiny (Neurotrophins)

- produkovány cílovou tkání → přežívání neuronů, neuronální diferenciace
- receptory:
 - p75, Trk receptory (A,B,C)
 - NGF (nerve growth factor)
 - BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
 - NT-3 (neurotrophin-3)
 - NT-4 (neurotrophin-4)




Pleiotropní efekt BDNF



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



BDNF-indukovaná neovaskularizace



HPCs- hematopoietic precursor cells, MCs - mural cell, ECs endothelial cells

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



EPO (Erythropoietin)

- produkce v ledvinách
- stimulace tvorby erytrocytů
- rekombinantní EPO

TPO (Thrombopoietin)

- produkce ve slezině a v ledvinách
- stimulace tvorby megakaryocytů, krevních destiček

G-CSF (Granulocyte Colony Stimulating Factor)

- stimulace tvorby granulocytů/neutrofilů


GM-CSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor)



RECEPTOROVÉ TYROZIN-KINÁZY


funkce: regulace proliferace, diferenciace, metabolismu, aj.

lidský genom : 59 genů (+alternativní sestřih) → 20 receptorových rodin



DOMÉNY :

- extracelulární (receptorová)
- transmembránová
- cytoplasmatická (tyrozin kinázová)



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.




AKTIVACE:


dimerizace vlivem růstových faktorů → cross-fosforylace

a) → konformační změna – stimulace katalytické aktivity

b) → tvorba vazebných míst pro domény adaptorových proteinů (Grb-2)



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



INDUKOVANÁ DIFERENCIACE

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Indukovaná diferenciace


- induktory diferenciace (růstové faktory, vitamíny, inhibitory kináz, změny v kultivaci, syntetické látky...)
- indukce příslušné diferenciační dráhy
- inhibice signálních drah pro „self-renewal“

Příklady induktorů diferenciace *in vitro*:


- kyselina all-*trans* retinová (ATRA)
- $1\alpha,25$ -dihydroxycholecalciferol ($1,25(\text{OH})_2\text{-D}_3$)
- phorbol myristylacetát (PMA)
- trichostatin
- dimethylsulfoxid (DMSO)
- SU5402 (inhibitor FGFR1)...





Kyselina *all-trans* retinová (ATRA) jako induktor diferenciace



promyelocytes




***all-trans* retinoic acid**




**polymorphonuclear cells
(neutrophils)**

Figure 16-6a The Biology of Cancer (© Garland Science 2007)

Kyselina retinová (RA) jako modelový induktor diferenciace (a morfogeneze)



1. vazba na jaderné receptory (RAR, RXR)
2. vazba komplexu na regulační oblast (RARE)
3. acetylace histonů → aktivace transkripce



Linie HL-60:

- lidská myeloidní leukémie
- spontánní diferenciaci:
asi 10 % buněk populace


- induktory granulocytární diferenciaci:
kyselina *all-trans* retinová (ATRA)
dimethylsulfoxid (DMSO)
- induktory monocyto/makrofágové diferenciaci:
phorbolmyristyl acetát (PMA)
1,25-dihydroxyvitamin D₃

Diferenciace linie HL-60 do stádia granulocytů:





Induktor: 1mM kyselina *all-trans* retinová

Marker: CD-66b (CD-67)


Detekce: anti-CD66b, SwAM-FITC




Granulocytární diferenciaci HL-60: flow cytometrie / CD66b



1mM ATRA



1mM ATRA + 13mM CA




1mM ATRA + 52mM CA

Diferenciace linie HL-60 do stádia makrofágů:

Induktor: 1,6 nM phorbolmyristyl acetát (PMA)


Marker: CD-14

Detekce: anti-CD14, SwAM-FITC



Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.






Linie P19:

- myší embryonální karcinom
- 7denní embryo do testes
- „embryoid bodies“ (EB)

- induktory mesodermální diferenciace:
kyselina *all-trans* retinová (ATRA)
dimethylsulfoxid (DMSO)
- induktor neuronální diferenciace:
kyselina *all-trans* retinová (ATRA)

Schéma diferenciace buněk P19



metoda kultivace na
bakteriologických miskách




metoda „visících kapek“
(hanging drops)





Mesodermální diferenciaci buněk P19:

Induktor: 0,8% DMSO

Marker: myosin II

Detekce: anti-skeletal myosin, SwAM-FITC






Neuronální diferenciaci buněk P19:

Induktor: 1mM kyselina *all-trans* retinová (ATRA)

Marker: neurofilamin

Detekce: anti-neurofilament 160, SwAM-FITC



Praktické využití indukované diferenciaci:

- základní výzkum
- diferenciační terapie v onkologii
 - hematologické malignity (APL, AML)
 - vybrané typy solidních nádorů (neuroblastom)
- diferenciační terapie v dermatologii
 - akné
- příprava buněčných derivátů *in vitro*



Retinoidy jako induktory diferenciace v klinické praxi:

Roaccutane (isotretinoin, 13-cis-RA)

- akné, neuroblastom



Vesanoid (tretinoin, all-trans-RA)

- akutní leukemie



COMBAT

léčba solidních nádorů (meduloblastom , neuroblastom, sarkomy...)

celecoxib

inhibitor cyclooxygenázy

antiangiogenní účinek

etoposid

inhibitor topomerázy II

zástava b. cyklu

temozolomid

alkylační činidlo

apoptóza

kys. retinová

diferenciační činidlo

diferenciace/apoptóza




Fig. 1. Combined oral maintenance biodifferentiating and antiangiogenic therapy (COMBAT) – treatment plan.

ONKOLOGIE

Original Article · Originalarbeit

Onkologie 2006;29:308-313
DOI: 10.1158/00008517.1

Published online: June 6, 2006

Combined Biodifferentiating and Antiangiogenic Oral Metronomic Therapy is Feasible and Effective in Relapsed Solid Tumors in Children: Single-Center Pilot Study

Jaroslav Sterba^a Dalibor Valík^b Peter Mudry^a Tomas Kepak^a Zdenek Pavelka^a
Viera Bajciová^a Karel Zitterbart^a Vera Kadlecová^a Pavel Mazanek^a

^aDepartment of Pediatric Oncology, University Hospital Brno,

^bDepartment of Laboratory Medicine, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic

Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience


D. Zapletalová^a N. André^{h,i} L. Deak^a M. Kyr^a V. Bajciová^a P. Mudry^a L. Dubska^{k,j}
R. Demlova^{l,j} Z. Pavelka^a K. Zitterbart^a J. Skotakova^b K. Husek^c A. Martincekova^a
P. Mazanek^a T. Kepak^a M. Doubek^{d,e} L. Kutnikova^a D. Valík^f J. Sterba^{g,h}

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie - jaro 2013 - 07 / 3.4.



Teoretické modely diferenciční terapie

- přímá diferenciaci nádorové buňky
- oprava onkogenního mechanismu vede k původní diferenciaci
- „přesměrování“ na prekursor → jiná diferenciacní dráha



www.impactjournals.com/oncotarget/

Oncotarget, May, Vol.3, No 5

Solid Tumor Differentiation Therapy – Is It Possible?

Filemon Dela Cruz¹ and Igor Matushansky²

