

Mollusca - měkkýši

- Lophotrochozoa
- sesterská skupina: Annelida s. l.? / Brachyozoa + Nemertea?
- cca 130 000 recentních druhů (+ cca 35 000 fosilních)
- převážně mořské druhy, také sladkovodní a suchozemské
- pohlavní rozmnožování, u některých skupin hermafroditismus
- vývoj u původnějších druhů přes larvu (veliger)
- přímý vývoj u odvozenějších druhů
- tělo ze tří oddílů: hlava - noha - útrobní vak
- druhotná tělní dutina - coelom - u dospělců pouze jako dutina perikardia (osrdečníku), pravděpodobně také okolo gonád a vylučovacích orgánů
- otevřená cévní soustava se srdcem, haemolymfa

Mollusca - měkkýši





Schéma základní tělní stavby měkkýše se schránkou

Mollusca - měkkýši




Tělní dutiny okolo gonád a srdce



- homologní s coelomem u Annelida a Deuterostomia ???

Mollusca - měkkýši

Radula




Mediální řez hlutanem hlemýždě zahradního (*Helix pomatia*): 1 - ústa; 2 - radula;
3 - chrupavka (odontofor); 4 - hlutan





Ozubené destičky a zuby
na radule měkkýše

Mollusca - měkkýši



Radula (na příkladu plže)



e = jícen (oesophagus)

m = ústa

mx = čelist (maxilla)

o = odontofor (chrupavka)

op = protraktor odontoforu (sval)


r = radula

rp = protraktor raduly

rr = retraktor raduly

Mollusca - měkkýši

Schránka u Conchifera
na příkladu Bivalvia:



A - Řez lasturou a pláštěm
škeble (*Anodonta*)

B - Řez okrajem pláště
a lastury velevruba (*Unio*)

1 - periostracum (konchiolinová vrstva)

2 - ostracum (porcelánová neboli prismatická vrstva z CaCO_3)

3 - hypostracum (perleťová vrstva z CaCO_3)

4 - zevní epitel pláště

5 - pojivová vrstva pláště


6 - vnitřní epitel pláště

7 - řasa na okraji pláště - zóna tvorby periostraca

8 - zóna tvorby hypostraca na plašťovém epitelu

Mollusca - měkkýši


Nervová soustava



A - tetraneurální (Aplacophora,
Mono-, Polyplacophora);
B + C - gangioneurální
B - Gastropoda;
C - Bivalvia

1 - cerebrální (mozková) ganglia
2 - pedální (nožní) ganglia
3 - pleurální (boční) ganglia
4 - viscerální (útrobní) ganglia

Mollusca - měkkýši



Mollusca - měkkýši

(Třída) Aplacophora - červovci

- cca 250 druhů (mořských)
- monofylum?

Autapomorfie (?):

- červovitě protáhlé tělo s ventrální rýhou
- redukce schránky z dorsálních plátů
- gonodukty ústí do osrdečníku

Další znaky (event. autapomorfie):

- kutikula s vápnitými osténky či šupinkami (synapomorfie všech Aculifera)
- papily epidermis
- chybí noha (patrně důsledek redukce, tedy autapomorfie!)

- Další důležitý znak (plesiomorfie):
- tetraneurální nervová soustava

Mollusca - měkkýši


(Podtřída) **Solenogastres (= Neomeniomorpha)**

- rýhonožky

- cca 180 druhů
- délka většinou několik mm, výjimečně do 30 cm
- v břišní rýze je jako podélný záhyb rudiment nohy
- v mořích od sublitorálu až do velkých hloubek
- bentičtí - na nebo ve sedimentech
- mnohé druhy epizoicky na Anthozoa a Hydrozoa
- predátoři:
 - radula často dvouřadá, slouží k zachycení kořisti
 - u asi 1/3 druhů je radula zcela redukována
 - přední část trávící trubice u některých druhů vyvinuta v „pumpu“ k vysávání polypů

Autapomorfie:

- redukce žaber (dýchání přes pokožku pláštové dutiny)
- hermafroditismus



Mollusca - měkkýši




(Podtřída) Caudofoveata (= Chaetodermomorpha)

- červovky

- cca 60 druhů (mořských)
- délka většinou pod 3 mm, výjimečně do 14 cm
- v měkkých substrátech od mořského sublitorálu do větších hloubek
- mikrofagové (bakteriofagové)

Autapomorfie:

- ústní štítek („nožní terč“ – dlouho považován za zbytek nohy, avšak odvozen z tkání hlavy a hltanu!)
- haemoglobin
- nepárovitá gonáda
- nepárovitá předsíň u srdce
- nepárovitá jaterní žláza (hepatopankreas)



frontální pohled

Mollusca - měkkýši

(Třída) Polyplacophora - štítkonošci



- cca 900 druhů
- mořští, většinou v mělkých vodách na skalnatých pobřežích, některé druhy i v hloubkách (do 4,5 tis. m)
- spásají rostlinný i živočišný nárost (Hydrozoa, Bryozoa atd.)
- schránka z 8 příčných destiček, pohyblivě spojených
- perinotum (lem kolem těla) má kutikulu s vápnitými osténky




Chiton olivaceus - chroustnatka středomořská

Autapomorfie (?):

- osmá dorsální destička
- čtvrtá vrstva schránky: tegmentum s aesthetyc (nejedná-li se o autapomorfii společného předka všech Aculifera; aesthetyc slouží jako fotoreceptory)



Tegmentum s aesthetyc




Chroustnatka *Tonicella marmorea*: 1, 3, 4 - první, třetí, osmá schránková destička; 2 - perinotum

Mollusca - měkkýši

(Třída) Polyplacophora

vnitřní stavba (dorsální pohled; srdce a osrdečník vlevo neúplně zakreslené, levý hepatopankreas a žábry vynechané, exkreční soustava zakreslena jen vlevo)



Mollusca - měkkýši

(Třída) **Bivalvia** - mlži


- cca 10 000 druhů (+ cca 20 000 fosilních)
- mořští (eulitorál - 10 000 m) a sladkovodní (cca 1 200 druhů)
- bentičtí
- mikro/saprofágové

Autapomorfie:

- dvoudílná schránka (lastury)
- spojená ligamentem a resiliem
- redukce raduly a čelistí

Další znaky:

- značně redukovaná hlava
- 1 pár gonád
- srdce: 1 síň, 2 předsíně
- 1 pár adduktorů schránky (svěrací svaly)
- 1 pár retraktorů nohy



Bivalvia - mořské životní formy: A - skulař (*Pholas*); B - ustřice (*Ostrea*); C - hřebenatka (*Pecten*); D - *Mya*; E - *Donax*; F - *Ensis*; G - *Chamelea*, *Venus*; H - slávka (*Mytilus*); I - šášeň (*Teredo*)

Mollusca - měkkýši

(Třída) Bivalvia - mlži




Schéma vnitřní anatomie škeble rybniční (*Anodonta cygnea*) - pravá lastura a chlopeň pláště odstraněny, řez tělem v mediání rovině.

Mollusca - měkkýši

(Třída) **Bivalvia** - mlži

Tradiční systém mlžů odvozený z typů žáber:

(Řád) „**Protobranchia**“ - perožábří

- 1 pár ktenidií
- ústní chlapadélka

(spíš plesiomorfní stav, možná však monofylum)

(Řád) „**Filibranchia**“ - nitkožábří

- lupénky ktenidií přeměněné na dlouhá vlákna spojená ciliemi
- žábry slouží i příjmu potravy


(Řád) „**Eulamellibranchia**“ - listožábří

- vlákna žaber přirostlá konci k bázi nohy resp. stropu pláštové dutiny, propojena vazivovými můstky

(Řád) **Septibranchia** - skulinožábří

- žábry redukované, vodní plíce v horním oddílu pláštové dutiny (nad septy)

(dnes řazeni do *Anomalodesmata*, monofylie nejistá)



Základní typy žáber u Bivalvia

Mollusca - měkkýši

„Protobranchia“ - perožábří



Nucula nucleus - oříškovka obecná

14 mm, sublitorál až do hloubek
okolo 150 m, hojný druh evropských moří

„Filibranchia“ - nitkožábří



Mytilus edulis - slávka jedlá
9 cm, na skalách příbojové zóny,
přichycena byssovými vlákny,



Ostrea edulis - ústřice jedlá
20 cm, levou miskou přirůstá k
podkladu, nemá nohu



Pecten jacobaeus
- hřebenatka svatojakubská
13 cm, asymetrické lastury

„Eulamellibranchia“ - listožábří



Cerastoderma edule
- srdecovka jedlá
6 cm, běžný druh
evropských moří




Solea marginatus - střenka jedlá
14 cm, hojná v písčitém dně
evropských moří



Margaritifera margaritifera
- perlorodka říční
13 cm, sladkovodní v čisté tekoucí
vodě, stáří až 120 let


Mollusca - měkkýši



Fylogenetický diagram mlžů podle Bielera & Mikkelsen (2006)



Mollusca - měkkýši

(Třída) Bivalvia - mlži



Různé tvary nohy:

- A – kotvová (*Portlandia*) ve třech fázích pohybu;
- B - plazivá (*Galeomma turtoni*);
- C - přísavná (*Devonia perrieri*);
- D - odrazová (*Acanthocardia echinata*)



Vývoj sladkovodního mlže přes larvu

glochidium: A - glochidia opouští mlže ex-halačním otvorem, přichycují se na hostiteli (rybě); po exoparasitické fázi se pouštají, na dně dorůstají v dospělce. B - glochidium


Mollusca - měkkýši

(Třída) **Gastropoda** - plži

- cca 100 000 druhů (údaje se velmi rozchází! + min. 15 000 fosilních druhů)
- mořské (bentické i pelagiální), sladkovodní i suchozemské druhy

Autapomorfie:

- spiralizace útrobního vaku
- asymetrie
- torze útrobního vaku o 180°




Vznik nesouměrnosti u plžů: A - F - posun souměrné spirální ulity o 180° ; G - CH - posun kuželovité ulity o určitý úhel doprava a dozadu; I - K - vznik asymetrie orgánů pláštové dutiny; 1 - pravé žábry


Mollusca - měkkýši

(Třída) **Gastropoda**


Příklady zástupců




Turritella communis (Proso-
branchia: Mesogastropoda)




Aporrhais pespelecani (Proso-
branchia: Mesogastropoda)



Conus textile - homolice (Proso-
branchia: Neogastropoda)




Pterotrachea sp. - kýlonožec
(Prosobranchia: Mesogastro-
poda)



Bethelia sp. (Opisto-
branchia: Saccoglossa)



Chromodoris
woodwardae
(Opisthobranchia)




Aplysia fasciata – zej
(Opisthobranchia:
Anaspidea)




Aplysia parvula - zej
(Opisthobranchia:
Anaspidea)

Mollusca - měkkýši


(Třída) Gastropoda: smyslové orgány



Typy očí u Gastropoda:
A - otevřený oční váček (*Haliotis* sp.)
B - uzavřený oční váček s čočkou, sklivcem a corneou (*Helix pomatia*)




Podélný řez pohárovým okem
přílipky (*Patella rata*):
1 - sítnice;
2 - pigment; 3 - zrakový nerv;
4 - ztlustlá kutikula



Statocysta kýlonože
rodu *Pterotrachea*:
1 - statolit
2 - smyslové buňky
3 - obrvené buňky
4 - nerv

Podélný řez okem děrnatky
(*Fissurella* sp.):
1 - krycí epitel;
2 - čočka; 3 - sklivec; 4 - sítnice;
5 - zrakový nerv; 6 - pigmentová
znka




Mollusca - měkkýši

(Třída) **Gastropoda**

Různé typy larev:

- A - Praeveliger
- B - Veliger s diskoidním velárním aparátem
(*Patella vulgata*, Archaeogastropoda)
- C - F: *Haliotis tuberculata* (Archaeogastropoda)
- vývoj larvy
- C - Veliger před vylíhnutím
- D - Trošku starší veliger (16 h po oplození)
- E - Veliger 19 h po oplození
- F - Pediveliger přecházející na bentický způsob života, 4,5 d po oplození
- G - Pediveliger *Nassarius incrassatus* (Neogastropoda)
- H - Pediveliger *Nassarius reticulatus* (Neogastropoda)
- I - Larva krátce před vylíhnutím - *Siphonaria japonica* (Basommatophora)



Mollusca - měkkýši

(Třída) Scaphopoda - kelnatky


- cca 520 recentních druhů (+ cca 900 fosilních)
- mořské (eulitorál - 7000 m)
- bentické: hrabají v substrátu
- mikrofágové (hlavní potrava: Foraminifera)
- nepárovitá gonada
- 1 pár ledvin
- hlavová chlapadélka (cirri)
- radula a čelist

Autapomorfie:

- trubicovitá schránka
- z hlavy ústní kužel
- redukce srdeční předsíně
- redukce žáber (místo nich vodní plíce)



Ulity *Dentalium* spp.



Dentalium sp. - podélný řez:
1 - ulita; 2 - plášt';
3 - plašt'. dutina; 4 - noha; 5 - ústní kužel; 6 - cirri;
7 - radula; 8 - střevo, 9 - játra; 10 - řitní otvor;
11 - cerebrální ganglion; 12 - pohlavní žláza

Mollusca - měkkýši

(Třída) Tryblidia (= Neopilinida ≈ Monoplacophora) – přílipkovci


- cca 30 recentních druhů
("živé fosilie": mnoho fosilních zástupců z období Kambrium-Devon, Pleistocén; fosilní a recentní zástupci společně řazeny do Monoplacophora, avšak jsou opravdu blízko příbuzné???)
- Atlantik, Pacifik, Indický oceán: hloubka 175-6400 m
- první recentní zástupce popsán v r. 1957, „živé fosilie“
- na měkkých i tvrdých substrátech

Autapomorfie:

- 6 párů ledvin (také s respirační funkcí)
- zdvojené gonády a osrdečníky


Další znaky:

- 6 párů žáber (event. redukce až na 3 páry; hlavně ventilace!)
- 0,9 - 40 mm velká, jednotná schránka (ulita) ze tří vrstev
- 8 párů zatahovacích svalů (retraktorů)
- tetraneurální nervová soustava



Mollusca - měkkýši

(Třída) Tryblidia (= Neopilinida; Monoplacophora)



Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda - hlavonožci

- cca. 750 druhů
- mořští, od litorálu po velké hloubky (min. do 5,5 tis. m)
- bentické i pelagiální druhy (dobří plavci)
- dravci
- prodloužená dorso-ventrální osa těla, položena o 90°
(frontální strana se stává dorsální, caudální strana ventrální)

Autapomorfie:


- ulita s komorami + siphunculus
- chapadla (ramena)
- nálevka (z nohy)

Oliheň *Loligo vulgaris* (Decabrachia)



Mollusca - měkkýši


(Třída) **Cephalopoda** - hlavonožci



Hypotetická představa o vývoji z předka – zástupce Monoplacophora s kuželovitou ulitou (Hypseloconidae) podle J. Dzika (1981) (zdroj: Wikipedia)

Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda



Typy očí:

A - *Nautilus* sp.



B - s otevřenou přední komorou - *Illex* sp.


C - přední komora zcela (až na porus) uzavřena - *Loligo*

D - např. u *Sepia* sp. nebo *Octopus* sp.




Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda



Ústřední nervová soustava:

- A – Loděnka (*Nautilus* sp.; Tetrabranchiata);
B - Chobotnice pižmová (*Moschites moschatus*, Dibranchiata: Octobrachia)



Obr. 476. Cévní soustava a žábry chobotnice pižmové (*Moschites moschatus*).

1 — srdeční síň s tepennou krví,
2 — hlavová aorta, 3 — rozvětvení aorty, 4 — hlavová žila, 5 — dutá žila, 6 — útrobní žila, 7 — žábry, 8 — přívodní žaberní žila, 9 — odvodní žaberní žila, 10 — žilné srdce, 11 — vychlípeniny přívodní žaberní žily vnikající do ledvin.


Mollusca - měkkýši

(Třída) **Cephalopoda** - hlavonožci



(Podtřída) **Nautiloidea**
= **Tetrabranchiata** - čtyřžábří

- 5 recentních druhů (+ cca 2 500 fosilních)
- mořští, v hloubce 50-650 m (Indický oceán, Pacifik)
- dravci a mrchožrouti
- vnější koncentrická schránka
- po 2 párech ktenidií (žaber), srdečních předsíní a ledvin
- nálevka z dvou nesrostlých laloků
- cca 90 chapadel ve dvou věncích
- jednoduché komorové oči



Tetrabranchiata: *Nautilus* sp. - loděnka

Mollusca - měkkýši

(Třída) **Cephalopoda** - hlavonožci

(Podtřída) **Coleoidea = Dibranchiata** - dvoužábří

- mořští, od sublitorálu po hlubiny
- schránka skryta uvnitř těla, více či méně redukovaná
- po 1 páru ktenidií (žaber), srdečních předsíní a ledvin
- jednotná, trubicovitá nálevka (srostlá)
- 8-10 chapadel s přísavkami nebo příchytnými háčky
- vysoce výkonné oči s čočkou
- velmi rozvinutá, koncentrovaná nervová soustava
- pokožka s chromatofory a iridocyty, často také bioluminiscenčními orgány

(Řád) **Decabrachia** - desetiramenatci

- 5 párů chapadel (ramen), 4. pár prodloužen, uzpůsoben lovу

(Řád) **Octobrachia** - chobotnice

- 4 páry chapadel, mezi nimi plovací blána




Chobotnice *Octopus* sp.



Oko sepie obecné
(*Sepia officinalis*)

Mollusca - měkkýši



(Třída) Cephalopoda



Ulita u belemnitů (Belemnitida; †)

Ulita sepie obecné (*Sepia officinalis*) z břišní strany

- 1 - povrch nejmladšího septa;
- 2 - okraj proostraka
- 3 - zadní okraj proostraka
- 4 - rudiment břišní stěny sifonové trubice
- 5 - rostrum




Redukční řada vývoje ulity u Dibranchiata:

- A - Belemnitida (†)
- B - *Belosepia* (†)
- C - *Sepia*
- D - *Conoteuthis* (†)
- E - *Loligo*
- F - *Spirula*


Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda: Decabrachia - desetiramenatci



Mollusca - měkkýši

(Třída) **Cephalopoda: Decabrachia** - desetiramenatci



Spirula spirula - sepie točenka



Sepia officinalis - sepie obecná



Loligo vulgaris - oliheň obecná


Mollusca - měkkýši

(Třída) **Cephalopoda: Decabrachia** - desetiramenatci




Oliheň *Sepioteuthis sepioidea*

(Caribbean Reef Squid) – vpravo dole snůška vajíček



Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda: Octobrachia - chobotnice




Páření u *Octopus vulgaris*: A - páření;
B - hectocotylus


Hectocotylus je přeměněné chapadlo (u Octobrachia 3. páru, u Decabrachia 4. páru chapadel) k přenosu spermatofórů.

Mollusca - měkkýši

(Třída) Cephalopoda: Octobrachia - chobotnice



Druhotná schránka ze ztvrdlého sekrétu
1. páru chapadel, jednokomorová



Argonaut pelagický (*Argonauta argo*): A - samice (až 45 cm), B-C - samec (cca 2 cm)


Brachiozoa a jejich pravděpodobné sesterské skupiny

Annelida

Nemertea

Brachiozoa

Phoronida



Brachiopoda

Inarticulata

Craniiformea Linguliformea

= Craniida



= Lingulata



Rhynchonelliformea
(= Testicardines)



?

Phoronida - chapadlovky



- výhradně mořští, cca. 15 recentních druhů
- hermafrodit, také nepohlavní rozmnožování (příčné dělení, pučení)
- červovitě protažené tělo (do 25 cm)
- epidermis vylučuje chitinovou trubičku (z vnějšku jí zpevňují zrnka píska apod.)
- trubička buďto zahrabaná do měkkého substrátu, nebo přichycená k povrchu tvrdého podkladu
- metasoma tvoří 90 % těla



Phonoris mülleri


A - lofofor vystrčen z chitinové trubičky;



B - vnější pohled z boku - chitinová trubička odstraněna)



Brachiopoda - ramenonožci

- mořští, solitérní, velcí max. 7 cm (fosilní max. 30 cm)
- cca 350 recentních druhů (cca 30 000 fosilních)
- tělo bilaterálně symetrické a kryté dvěma miskovitými schránkami z fosforečnanu nebo uhličitanu vápenatého (vyloučený pláštěm)
- malé tělo je umístěno ve zadní části misek a pokračuje v různě dlouhý stvol na zakotvení v substrátu nebo jím přirůstá k podkladu
- tělo tradičně děleno do tří oddílů: pro-, meso-, metasoma; každý by měl obsahovat coelomovou dutinu (avšak nové výsledky toto v případě prosomatu vyvracejí)
- prosoma vytváří záklopku na ústa, tzv. epistom
- mesosoma tvoří dvě na konci spirálovitě **stočená ramena** loforu s chapadélky (monociliátní epitel, protiproudový orgán)
- metasoma, podstatná část těla, vytváří dva ploché, **lalokovité výběžky pláště**






- potrava filtrována řasinkovým epitelem na chapadélkách a posouvána do úst; řít' je v pláštové dutině (A) nebo trávící trubice končí slepě (B) a je tvaru písmene "J"
- otevřená cévní soustava: váčkovité srdce a dvě hlavní cévy zasahující do výběžků pláště a jsou napojeny na krevní laky
- dýchají povrchem těla
- obloukovitě propojená nadjícnová a podjícnová ganglia, ze kterých vybíhají nervy; zvláště na lofoforu četné pokožkové smyslové buňky
- převážně gonochoristi, larva obrvená, plovoucí

Linguliformea = Lingulata

– jazovky (Lingulida)
a pajazovky (Discinida)

- protažené a slabě klenuté schránky jsou chitinofosfátové bez zámkového aparátu
- lofofor není nikdy podepřen pevnými strukturami
- střevo průchozí
- dlouhý kontraktilelní stvol, kterým jsou ukotveny v substrátu



Lingula unguis;
A - vnější pohled; B - ventrální skořápka odstraněna; C - laterální pohled;
D - dorsální pohled (čárkováno: zatažený jedinec)




Lingula anatina
– jazovka stopkatá
(Indický oceán)

chitinové štětiny na okraji pláště



Craniiformea - kranie

- schránky z uhličitanu vápenatého
- svol často redukovaný, jedinci bývají přicementovaní k podkladu
- fosilní záznam sahá do ordovika, málo recentních zástupců



Rhynchonelliformea - opornatky

- schránky z uhličitanu vápenatého a se zuby
- lofofor je podepřen pevnými strukturami
- střevo končí slepě
- stvol většinou kratší

Rhynchonella sp.



„Tentaculata“ = „Lophophorata“ - chlapadlovci

Monofylie chlapadlovců (na příklad na základě předpokládané původní trojdílnosti – trimerie – těla a coelomu; jako možná synapomorfie byl uváděn epistom prosomatického původu) byla vždy sporná a jejich **taxonomické oprávnění bylo zcela vyvráceno výsledky molekulárně-biologických studií**. Mezi chlapadlovce byl někdy také zahrnován další taxon nejasného postavení, tj. Kamptozoa neboli Entoprocta (mechovnatci). Nicméně, všechny tyto taxony dnes patří mezi Lophotrochozoa.

