




Cirkulační, cévní systém obratlovců




FISH




AMPHIBIAN



REPTILE




MAMMAL OR BIRD




Základem cirkulačního systému jsou

- arterie (tepny), vedou krev od srdce
- vény (žíly), vedou krev do srdce
- srdce - hlavní hnací motor/pumpa



Struktura arterií a vén, velmi podobná


- Arterie k danému průměru silněnší stěna → odolávají větším tlakům
- Velké vény mají chlopně




Koeppen & Stanton: Berne and Levy Physiology, 6th Edition.
Copyright © 2008 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved


Vždy endotel - bariéra, zdroj růstových faktorů, místo pro adhesi imunitních buněk, zdroj NO (eNOS - endoteliální NO syntáza) - vazodilatční efekt na svalovinu cév


	<i>Mean diameter</i>	<i>Mean wall thickness</i>	<i>Endothelium</i>	<i>Elastic tissue</i>	<i>Smooth muscle</i>	<i>Fibrous tissue</i>	
Artery	4.0 mm	1.0 mm					
Arteriole	30.0 μm	6.0 μm					
Capillary	8.0 μm	0.5 μm					
Venule	20.0 μm	1.0 μm					
Vein	5.0 mm	0.5 mm					






Limity krevního průtoku







Celková plocha, průtok a příslušné tlaky v cévním systému





Distribuce krve v jednotlivých cévách






Procentuální distribuce krve u člověka
a skokana






Tlaky v cévním systému




Rozdíly mezi plicním a systémovým tlakem u různých obratlovců



Selektivní distribuce krve u potápějícího se tuleně


→ hospodaření s kyslíkem



Význam - distribuce živin, metabolitů, tepla

Transport látek přes cévní stěnu

- v důsledku vyššího tlaku = filtrace, hlavně voda a některé ionty
- osmotickým tlakem plasmových koloidů (bílkoviny)
- aktivě transport vezikuly a membránovými transportéry (větší molekuly...)
- regulace hlavně **endotelem, nervy a hormony**
- regulace ovlivňuje tlak, permeabilitu, aktivitu transportérů a přenašečů
- změnu tlaku zprostředkovává srdeční a hladká svalovina
 - tunica media
 - prekapilární svěrače



Relativní permeabilita svalových kapilár pro různé látky (pro proteiny jsou prakticky nepropustné)


	Velikost (Da)	Ekvivalent sferoidu (nm)	Relativní permeabilita
Voda	18	-	1,00
NaCl	59	14	0,96
Urea	60	16	0,8
Glukósa	180	36	0,6
Sacharóza	342	44	0,4
Myoglobin	17600	190	0,03
Hemoglobin	68000	310	0,01
Albumin	69000	-	<0,0001

Průměrné hodnoty onkotických tlaků u různých živočichů


<i>Cnidaria</i>	0,005
<i>Urochordata</i>	0,05
Paryby	0,31 (0,2-0,5)
<i>Kroužkovci</i>	<i>0,45 (0,09-1,02)</i>
Obojživelníci	1,01 (0,5-1,6)
Plazi	1,16 (0,5-1,6)
Kruhoústí	1,30 (1,2-1,4)
Ptáci	1,30 (1,1-1,5)
Kostnaté ryby	1,32 (0,4-2,7)
Savci	2,88 (2,1-3,7)
Hmyz	8,35 (3,1-13,6)




**Závislost onkotického tlaku
na koncentraci proteinů**
(Důležitá je molární koncentrace)




Prekapilární svěrače regulují tlak a průtok krve




Homeostasis and temperature control





Vasodilatace a vasokonstrikce periferních cév v regulaci hospodaření s teplom



Tlaky zprostředkovávající výměnu látek mezi cévami a okolím





Endothelial Function Assessment

- Vascular Tone
 - Vascular reactivity
 - Vasoconstrictors: ET-1
 - Vasodilators: Nitric oxide products
- Markers of Endothelial Activation
 - Adhesion molecules (VCAM, ICAM, selectin)
- Markers of Coagulation/Fibrinolysis
 - PAI-1/tPA, fibrinogen, thrombomodulin, VWF
- Markers of Inflammation
 - CRP, TNF- α , IL-1, IL-6
- Hormones and Metabolic Products with Known Vascular Effects
 - Adiponectin, FFA

Caballero AE. *Obes Res.* 2003;11:1278-89.

Endotel


Normal Endothelial Function

Dilatation	Constriction
Growth inhibition	Growth promotion
Antithrombosis	Prothrombosis
Anti-inflammation	Proinflammation




Transport láték endoteliemi


Luminal side




Abluminal side



Caveolin - mediátor transcytósy






Insulinem řízená rovnováha ve funkcích endotelu


Mediátory :


NO (oxid dusnatý) x ET-1 (endotelin-1)





Endothelial cells

SRDCE






(a)




(b)

Ryby





- dvoukomorové srdce
- srdcem prochází jen odkysličená krev
- některé (např. Sliznatky, *Myxini*) pomocná srdce



Srdce sliznatek


Jednotlivá srdce tepou různou frekvencí,
v závislosti na výkonu?




Srdce pumpuje od- i okysličenou krev od obojživelníků výše

- u savců a ptáků již nedochází v srdci k míchání od- s okysličenou krví
- u krokodýlů možnost přechodně kompletně oddělit


3-CHAMBERED



3-CHAMBERED (SEPTATED)



4-CHAMBERED




AMPHIBIANS

TURTLES



BIRDS AND MAMMALS





Distribuce krve srdcem u dýchajícího a potápějícího se krokodýla



Rozdíly v tlaku v komoře a v aortě (Windkessel efekt)



Porovnání dynamiky jednotlivých parametrů srdeční činnosti a isovolumetrická kontrakce



Srovnání systolického a diastolického tlaku v arteriích s hodnotou onkotického tlaku
 Přes relativně velké (násobky) rozdíly v arteriálním tlaku, jsou si poměry arteriálního tlaku ku onkotickému blízké. Vyrovnáno hodnotou onkotického tlaku.

Výjimka jsou ptáci - velmi nízký onkotický tlak, proč?

		Arteriální tlak (systola/diastola, kPa)	Onkotický tlak (kPa)	Arteriální tlak / omkotický tlak
Savci	Člověk	16,3/10,9	3,81	3,6
	Ovce	18,4/15,2	2,99	5,6
	Pes	15,2/7,6	2,72	4,2
Ptáci	Kur	20,3/5,8	1,50	8,7
	Holub	18,4/14,3	1,10	14,8
Plazi	Želva	5,7/4,4	0,87	5,8
Obojživelníci	Skokan	4,1/2,7	0,69	4,9
	Ropucha	4,4/2,6	1,28	2,5
Ryby	treska	3,9/2,5	1,13	2,8

Srovnání kardiovaskulárních parametrů v klidu a během aktivity u obratlovců

V závislosti na vývojové „vyspělosti“ při aktivitě stoupá tepová frekvence, oproti primitivnějším skupinám, kde se zvětšuje i tepový objem, s výjimkou obojživelníků.



Tep – min^{-1}

Tepový objem – ml

VO₂ – ml O₂ / min

AV difference – množství O₂ v arteriální oproti venózní krvi (intenzita odebrání O₂ tkání)


		V klidu	Při aktivitě	Násobek zvýšení	% podíl na zvýšení VO ₂
Pošum (1,48 kg)	Tep	143	321	2,2x	51%
	Tepový objem	2,43	2,29	0,9x	-2%
	AV deference	4,5	10,1	2,2x	51%
	VO ₂	19,5	100	5,1x	
Holub (0,44 kg)	Tep	115	670	5,8	87%
	Tepový objem	1,70	1,59	0,9x	-1%
	AV deference	4,6	8,3	1,8x	14%
	VO ₂	8,9	88	9,9x	
Ještěr (1,03 kg)	Tep	50	108	2,2x	41%
	Tepový objem	2,3	3,1	1,3x	12%
	AV deference	2,6	6,1	2,3x	47%
	VO ₂	3,3	21,6	6,6x	
Ropucha (0,25 kg)	Tep	26	47	1,8x	16%
	Tepový objem	0,34	0,32	0,9x	-1%
	AV deference	2,1	10,2	4,9x	84%
	VO ₂	0,18	1,53	8,5x	
Pstruh (1,00 kg)	Tep	38	51	1,4x	11%
	Tepový objem	0,46	1,03	2,2x	39%
	AV deference	3,2	8,3	2,6x	50%
	VO ₂	0,56	4,35	7,8x	



Sinoatrial node fires, action potentials spread through atria which contract


Autonomní řídící centra srdeční činnosti

- Sino-atriální uzlík (pacemaker)
- Atrio-ventrikulární uzlík
- Hisův svazek + Purkyňova vlákna






Atrioventricular node fires, sending impulses along conducting fibers; ventricles contract


Hlavní body regulace srdeční činnosti



2. The cardioregulatory center controls the frequency of action potentials in the parasympathetic (*red*) neurons extending to the heart through the vagus nerves. The parasympathetic neurons decrease the heart rate.


Rozsah nervové stimulace srdční činnosti u člověka a charakter jednotlivých akčních potenciálů u jednotlivých převodních systémů






Zapojení baroreceptorů karotického sinu (karotická tělíska) a oblouku aorty

Regulation of heart rate and force





Změny tepové frekvence a krevního tlaku v důsledku potápění u tuleně, kačeny a aligátora. S ponořením klesá frekvence, ale může i tlak.



Přesto, že po ponoření se snižuje tepová frekvence, stresová stimulace stále funguje a je tak nadřazená. Demonstrováno na trénovaném (b) a netrénovaném potkanu (c).




FORCED DIVING



Shrnutí mechanismů regulujících krevní tlak

Krátkodobé




Dlouhodobé

Regulace tlaku v cévách

Vazodilatace		Vazokonstrikce	
Stimulací tvorby cGMP	Stimulací tvorby cAMP	Inhibicí tvorby cAMP	Stimulací tvorby IP ₃
NO ANP	adenosin A ₂ histamin H ₂ adrenalin b ₂ VIP	serotonin adrenalin a ₂ angiotensin II	serotonin adrenalin a ₁ vazopresin
cGMP a cAMP v hladkém svalu stimuluje Ca ²⁺ pumpu sarkoplazmatického retikula pokles koncentrace Ca ²⁺ v buňce	Pomalejší „odklízení“ Ca ²⁺	IP ₃ uvolňuje Ca ²⁺ ze sarkoplazmatického retikula	


Regulace cévního průtoku

Myogenní autoregulace	Napětí cévní stěny aktivuje kationtové kanály - depolarizace - vazokonstrikce
Metabolická	Produkty metabolismu vyvolávají vazodilataci
„shear“ dependentní	Vazodilatace zprostředkovaná působením NO, který se tvorí v cévním endotelu
nervová	<ul style="list-style-type: none">• Sympatické vazokonstrikční nervy ve většině tkání• Parasympatické vazodilatační nervy v sekrečních a spongiformních tkáních
humorální	<ul style="list-style-type: none">• Vazokonstrikční účinek angiotensinu II, noradrenalinu, vazopresinu, serotoninu• Vazodilatační účinek ANP, histaminu, mediátorů zánětu




Podíl parasympatické
a sympatické regulace
srdečního tepu


Ukázka účinku angitensinu
na příjem Na iontů



Časová dynamika zapojení jednotlivých regulátorů a senzorů při odpovědi na změnu krevního tlaku



Úloha jednotlivých regulátorů a receptorů při odpovědi na změnu krevního tlaku



Zapojení srdce v hormonální regulaci cévního systému a hospodaření s vodou

Cardiac distension
Sympathetic stimulation
Angiotensin II
Endothelin

Atriální (A) a mozkový (B)
natriuretický peptid

