


Adaptace prvoků k parazitismu

- Strukturální
- Biologické
- Fyziologické
- Biochemické
- Ekologické
- Molekulární



Možnosti studia parazitologie

Bakalářský stupeň:

Obecná parazitologie (Gelnar)

Speciální parazitologie (Řehulková)

Základy humánní parazitologie
(Gelnar)

Magisterský stupeň (povinně volitelné)

Biologie parazitických protozoí (Koudela)

Biologie parazitických helmintů (Kašný)

Biologie parazitických členovců (Valigurová)

Lékařská parazitologie a diagnostika (Ditrich)

Magisterský stupeň + DSP (volitelné)

Parazito-hostitelské interakce (Horák)

Patologie parazitismu (Dyková)

Imunologie parazitismu (Salát)

Ekologie parazitů (Vetešníková-Šimková)

Další související přednášky:

Evoluční ekologie (Vetešníková-Šimková)

Histologie (Hodová)


Mikroskopická (Zoologická) technika
(Seifertová)

Mikroskopické zobrazovací techniky
(Mašová)


Biostatistika (Jarkovský)

Adaptace prvoků k parazitismu

- Strukturální
- Biologické
- Fyziologické
- Biochemické
- Ekologické
- Molekulární



Tvarová různorodost prvoků



Historie mikroskopické technika




ANTONIUS A LEEUWENHOEK.

*Regia Societatis Londinensis
membrum.*


Vorkelje pinx.

A. de Blou fec.


Obr. 2 Antony van Leeuwenhoek, zakladatel vědecké mikroskopie.



Historie mikroskopické techniky




Kentův systém protozoí - 1882




Obr. 31 Kentův systém protozoí (z Kenta: Manual of the Infusoria, Vol. I, Londýn 1882).

Konvergence při evoluci prvoků



Obr. 32 Konvergence při evoluci schránek u nepříbuzných skupin. **a + b** *Codonella cratera* (nálevník), **c + d** *Diffugia* (kryténka) (z Foissnera a Hausmanna: Mikrokosmos 76: 258, 1987. Zvětš. a 1 500x, b 700x, c 450x, d 220x.

Evoluce klasifikačních systémů



Obr. 33 „Distance matrix tree“ sestavený z úplných sekvencí malých podjednotek rRNA, překrývající se s částí sekvenčních dat tří různých nálevníků (ze Schlegela: Europ. J. Protistol. 27: 207, 1991).

Evolve protozoí - současnost






Figure 4.11 Phylogeny of the eukaryotes according to Adl et al.¹

The tree is based largely on ultrastructural features and shows proposed relationships between various groups. Archaplastida includes algae and green plants; other groups (e.g. Jakobida) may be free living and thus not mentioned in the text. Note that according to this phylogeny, amebas with lobose pseudopods (e.g. *Entamoeba* sp.) are not necessarily the closest relatives of those amebas with complex skeletons and often branching pseudopods (e.g. the foraminiferans).


Redrawn from the *J. Eukaryotic Microbiology*, volume 52, issue 5 cover illustrating the classification of Adl et al. 2006. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. *J. Euk. Microbiol.* 52:399–451.

Trypanosomatidea




Obr. 56 Trypanosomatidea:
a krevní formy *Trypanosoma brucei* mezi erythrocyty.
b *Trypanosoma fallisi*.
c schéma ultrastruktury *T. congolense*. **d** kinetoplast (kp) u *Blastocrithidia triatomae*. **e** rozprostřené kroužky kDNA kinetoplastu *Crithidia fasciculata*.
 n = jádro, um = undulující membrána (b z Martina a Dessera: J. Protozool. 37: 199, 1990, c převzato z Vickermana, d laskavostí H. Mehlhorna, Bochum, e z Pérez-Morga a Eglunda: J. Cell Biol. 123: 1969, 1993). Zvětš. a 1 000x, b 1 100x, c 8 000x, d 40 000x, e 80 000x.

Diplomonadea - Giardia




Obr. 44 Diplomonadea: **a** *Giardia* (= *Lamblia*) se dvěma jádry (n) a osmi bičíky (f). **b** adhezivní disk u *Giardia* (a z Grella: Unterreich Protozoa, Einzeller oder Urtiere. In: Lehrbuch der Speziellen Zoologie, 4. vyd., ed. H.-E. Gruner, Stuttgart 1980; b, laskavostí D. V. Holbertona, Hull). Zvětš. a 3 000x, b 7 000x.

Gregarinaea – (a) pár gamontů spojených v syzigii, (b) typy epimeritu a (c) epimerit a protomerit a deutomerit)




Obr. 89 Gregarinaea: a pár gamontů spojených v syzigii. b různé typy epimeritů. c typická podoba epimeritu (epm), protomeritu (prm) a deutomeritu (dem) a schéma intracelulárně přichyceného epimeritu (b + c převzato z Légera). Zvětš. a 100x.

Apicomplexa - sporozoit




Obr. 84 Apicomplexa: **a** sporozoit. ac = apikální komplex, min = mikronemy, rho = roptrie. **b** mikropór v příčném (vlevo) a podélném průřezu (vpravo). pm = plazmatická membrána, ims = systém vnitřních membrán (alveoly) (převzato z Scholtysecka a Mehlhorna).

Apicomplexa - oocysty




Obr. 82 Apicomplexa:
a oocysty *Eimeria stiedai*.
b oocysta druhu r. *Eimeria*
z rekta gekona. **c** schéma
oocysty. n = jádro,
oc = stěna oocysty,
rb = světlolomné tělíčko,
rbo = zbytkové tělíčko
oocysty, rbs = zbytkové
tělíčko sporocysty,
spc = sporocysta,
spz = sporozoit.
(b laskavostí B. Bannerta,
Berlín). Zvětš. a 300x,
b 1 600x.

Schéma apikálního komplexu



Obr. 85 Apicomplexa: konoidová oblast sporozoitů. **a** konoidový komplex na celkovém preparátu. **b** schéma: co = konoid s mikrotubuly a s nimi sdruženými strukturami, pm = plazmatická membrána, ims = membrány alveolů, pr = pólóv prstenec s mikrotubuly z něj vycházejícími (mt), pcr = prekonoidální prstence. **c, d** apikální komplex při průniku do buňky, v pohledu svrchu a na průřezu. rho = roptrie (a z Nicholse et al.: J. Protozool. 34: 217, 1987; b–d převzato z Scholtysecka a Mehlhorna). Zvětš. a 35 0000x.

Schéma průniku sporozoita do hostitelské buňky





Obr. 94 Haematozoa: Haemosporida, schematické znázornění změn v merozoitu *Plasmodium knowlesi* při průniku do hostitelské buňky. mj = pohyblivý buněčný spoj posouvající se zpět po invadujícím sporozoitu; n = jádro, rho = roptrie v různých stádiích vyprazdňování, sc = buněčný povlak (převzato z Bannistera).

Sporozoit pronikající do buňky




Obr. 86 Apicomplexa: sporozoit *Toxoplasma gondii* při invazi hostitelské buňky (z Nicholse a O'Connora: Lab. Invest. 44: 324, 1981). Zvětš. 20 000x.

Mikrosporidia – průnik do hostitelské buňky



Ciliata – schématická stavba



Buněčná a strukturální organizace





Schéma živočišné buňky



Jádro a cytoplasma

- Plasmatická membrána
 - Pellicula
 - Alveoli – dutinky, záhyby
 - Glykocalyx – glykoproteinový povrchový povlak

 - Pelliculární mikrotubuly – záhyby, membrány,
 - Undulující membrány
 - Základní prvek dalších buněčných struktur

Plasmatická membrána - modifikace





Figure 4.3 Plasma membranes and their modifications in protozoa.


(a) Epicytic folds of a gregarine parasite of damselflies. These folds extend along the body as ridges. (b) Membranes of *Ichthyophthirius multifiliis*, a parasite of fishes; the dark elongate bodies perpendicular to the membranes are mucocysts (AS, alveolar sac; OLM, outer limiting membrane; OAM, outer alveolar membrane; IAM, inner alveolar membrane; MC, mucocyst).

Plasmatická membrána - stavba



Obrázek 8.6 – Podrobná struktura plasmatické membrány živočišné buňky, příčný řez. Viz obrázek 7.29 – detaily ECM.

Jádro a jeho obal




Povrch jaderného obalu.

TEM připravený mrazovým lámáním.
A, vnitřní membrána, B, vnější
membrána, NP, jaderný pór
(pórový komplex).

0.25 μm


Pórové komplexy (TEM). Každý pór
je obklopen proteinovými částicemi.

Ribosomy




Obrázek 7.10 – Ribozomy. (a) Tato elektronová mikrofotografie části pankreatické buňky ukazuje mnoho ribozomů, volných (v cytosolu) i vázaných (na endoplazmatické retikulum). Vázané ribozomy pankreatické buňky vytváří množství sekrečních proteinů, včetně hormonu inzulínu a trávicích enzymů. Vázané ribozomy také tvoří proteiny, určené pro začlenění do membrán nebo vnitřních částí jiných organel. Volné ribozomy vytváří především takové proteiny, které zůstávají rozpuštěné v cytosolu. Vázané a volné ribozomy jsou identické a mohou přeskakovat mezi těmito dvěma úlohami. (b) Zjednodušené schéma ribozomu znázorňuje jeho dvě podjednotky.

Endoplasmatické retikulum




Golgiho aparát



Golgiho aparát (dictyosom)

- Dobře vyvinut u některých bičíkovců majících parabasální tělíska spojená s kinetosomem, basálními tělísky nebo bičíky
- Dictyosom hraje u protozoí různou roli, např. může být zdrojem skeletárních destiček u některých améb a polárního filamentu u microsporirií.

Lysosomy




(a) Lysozomy bílé krvinky

(b) Lysozom v činnosti

Obrázek 7.13 – Lysozomy. (a) V této potkaní bílé krvince jsou lysozomy velmi tmavé díky specifické barvičce, která reaguje s jedním z trávicích produktů lysozomu. Tento typ bílé krvinky tráví bakterie a viry a rozkládá je v lysozomech (TEM).

(b) V cytoplasmě této bílé krvinky autofagický lysozom pohltil dvě poškozené organely, mitochondrii a peroxizom (TEM).

Mitochondrie



Obrázek 7.17 – Mitochondrie, místa buněčného dýchání. Na kresbě a mikrofotografii (TEM) jsou zřejmé dvě mitochondriální membrány. Kristy představují záhyby vnitřní membrány. Výsekové schéma ukazuje dva kompartmenty ohraničené membránami, mezimembránový prostor a mitochondriální matrix.

Mitochondrie

- Enzymy oxidativní fosforylace a cyklus ATP
- Často mají tubulární struktury – cristae
- Výrazné mitochondrie u některých bičíkovců

Mikrotělíška - microbodies

- Obvykle jsou sférická a mají densní granulární matrix
- U většiny živočichů a rostlin obsahují oxidázy a katalázy
- Oxidázy redukují kyslík na peroxid vodíku a katalázy se podílejí na dekompozici peroxidu vodíku na vodu a kyslík.







Mikrotěliška - microbodies

- **Peroxisomy** – mikrotěliška mající biochemickou aktivitu - peroxisomy u mnoha aerobních protozoí
- U některých anaerobních protozoí jsou tzv. **hydrogenosomy** – produkují molekulární hydrogen – (Trichomonas)
- Mikrotěliška rovněž enzymy glyoxylátového cyklu – syntéza uhlovodíků z tuků
- **Glykosomy** – mikrotěliška u Kinetoplastida – glykolytické enzymy

Mikrotěliška - microbodies

- **Extrusomy** – organely plasmatického původu vznikající v dictyosomech
 - **Toxosomy** – obranné mechanismy, vylučování toxických látek
 - **Kinetocysty** – podílejí na příjmu potravy
 - **Haplocysty** – podílejí se na paralyzování potravy
 - **Trichocysty** – mechanická rezistence vůči predátorům
 - **Mucocysty** – u nálevníků . Ochrana před osmotickým šokem (*Ichthyophthirius multifiliis*)

Cytoskelet



Struktura a funkce cytoskeletu

Vlastnost	Mikrotubuly	Mikrofilamenta (aktinová filamenta)	Intermediární filamenta
Struktura	Duté trubice, stěna se skládá ze 13 sloupců tubulinových molekul	Dvě zdvojená vlákna aktinu	Vláknité bílkoviny svinuté do silnějších lan
Průměr	25 nm s 15nm průsvitem	7 nm	8–12 nm
Bílkovinné podjednotky	Tubulin skládající se z α -tubulinu a β -tubulinu	Aktin	Jeden z několika různých proteinů skupiny keratinů, závisí na buněčném typu
Hlavní funkce	Zachování buněčného tvaru (kompresi odolávající „nosník“) Buněčný pohyb (v řasinkách nebo bičících) Chromozomální pohyb při buněčném dělení Pohyb organel	Zachování buněčného tvaru (tlak přenášející složky) Změny buněčného tvaru Svalový stah Proudění cytoplazmy Buněčný pohyb (v pseudopodiích) Buněčné dělení (vznik rýhovací štěrbin)	Zachování buněčného tvaru mechanického tlaku Ukotvení jádra a některých dalších organel Jaderný skelet

Lokomoční organely

Tři typy lokomočních organel

- Pseudopodia
 - Bičíky (flagella)
 - Řasinky (cilie)
-
- Undulipodia – flagella + cilie

Panožky -pseudopodia

- Améby – dočasné struktury pohybu a příjmu potravy
 - Lobopodie
 - Filopodie
 - Rhizopodie
 - Axopodie
- Améby limax (Limax)

Améby - panožky



Bičíky - flagella

- Štíhlé, dlouhé – **centrální axonema** – centrální pár mikrotubulů
- Na obvodu **9 párů mikrotubulů**
- Axonema začíná v kinetosomu (centrální tělísko)
- **Periflagelární kapsa**
- **Mastigont** – systém označující spojení mezi bičíkem, kinetosomem a souvisejícími organelami
- **Heterokont** – bičíkovec se dvěma (a více) funkčními typy bičíků

Struktura bičíku nebo řasinky



Stavba bičíku – mikroskopický řez



Bičíky - flagella

- Štíhlé, dlouhé – **centrální axonema** – centrální pár mikrotubulů – organela pohybu
- Na obvodu **9 párů mikrotubulů**
- Axonema začíná v kinetosomu (centrální tělísko)
- **Periflagelární kapsa**
- **Mastigont** – systém označující spojení mezi bičíkem, kinetosomem a souvisejícími organelami
- **Heterokont** – bičíkovec se dvěma (a více) funkčními typy bičíků


Giardia - pohyb tekutiny



System mastigont u bičíkovců



Archamoebae – systém karyomastigontu




Bičíkovci - heterokont



Řasinky - cílie

- Cílie jsou strukturálně analogické bičíkům – mají kinetosom, centrální axonemu a 9 periferálních dvojic mikrotubulů
- 2 základní typy ciliatury
 - Somatická ciliatura (kinetie – řady)
 - Orální ciliatura (různé uspořádání – systematika)

Ciliophora - nálevníci



Ciliatura nálevníka





Diagram struktury ciliárního komplexu




Rekonstrukce pelikulárních struktur



Potrava a metabolismus prvoků

- **Heterotrofni** – mnoho symbiotických zástupců –
evoluce parazitismu
- **Cytostom** - organela pro příjem potravy – Ciliata
- **Cytopyge** – buněčná řit
- Příjem potravy:
 - **Fagocytóza**
 - **Pinocytóza**
 - **Endocytóza**

Ciliata – schématická stavba



Fagotyzóza




Pinocytóza

Receptory zprostředkovaná endocytóza



Tvorba potravní vakuoly

Balantidium coli



Rozmnožování prvků