


Mořské hliny



Hlubokomořský plankton a nekton

- nedostatek až nepřítomnost světla a primární produkce
- transparentní nebo červeně zbarvení (tj. prakticky neviditelní), predátoři, bioluminiscence, někdy gigantismus, špatná kalcifikace
- medúzy, žebernatky, hlavonožci, korýši (Copepoda, Isopoda, Amphipoda, Caridea), chiméry, žraloci, ryby, vorvaň obrovský (až -2200 m)



Gigantocypris sp. (Ostracoda)
6 druhů; max. 3 cm, kolem -1000 m,
obrovské reflexní oči – zachytí slabé
bioluminescenční záření; živí se
hlavně klanonožci




Phronima sp.
(Amphipoda)
velké oči, loví
klanonožce,
osídluje tuniky salp



Munopsis sp. (Isopoda)
„deep sea spiders“
plavání vpřed i vzad
(„šlapání vody“)

Cephalopoda


- téměř všichni jsou predátoři, složité chování, vysoce organizovaná NS, komorové oko, ramena + chapanla s přísavkami, silné zobákovité čelisti...



Architeuthis dux - kraratice obrovská
čel. Architeuthidae; ř. Teuthida, až 14 m,
♂ méně, teprve od r. 2004 snímky z přír.
habitu -900 m, ve všech oceánech,
živí se rybami a chobotnicemi,
sama je potravou vorvaně obrovského →



Nautilus pompilius – loděnka hlubinná
podtř. Nautiloidea, „žijící fosílie“, >20 cm,
ca 90 ramen bez přísavek; -100 až -300 m,
denní vertikální migrace; špatně vidí; kanál
(siphuncle) - regulace obsahu plynu/vody v
komorách a tím vznášivosti, v -800 m
schránka praskne



nadř. Octopodiformes


- hlubokomořské druhy - ouškovité výrůstky k plavání a malá vnitřní kostra



Grimpoteuthis spp.
„dumbo octopus“
ca 13 druhů, max. 20 cm
-3000 až -4000 m



Stauroteuthis syrtensis
30 cm, až -1000 m, Atlantik



Vampyroteuthis infernalis – vampýrovka hlubinná
až 30 cm, tropy a mírné pásmo, -600 až -1000 m,
ramena spojená blánou; velké oči, přes které přetahuje
kůži, 2 dlouhá filamenta registující potravu; fotofory

Hlubokomořské ryby

- velmi dobré smyslové orgány - např. tykadlovité výrůstky, citlivá postranní čára, velké citlivé oči nebo dobrý čich a hmat
- bioluminiscence – symbiotické bakterie ve fotoforech, slouží k přilákání kořisti, vnitrodruhové komunikaci a rozmnožování nebo obraně oslepením predátora; u někt. produkce červeného světla
- modifikovaná tlama a čelisti, ostré zuby, špatně osifikované kosti, křehká kůže
- maskování – zbarvení tmavé, červené nebo průsvitné

Lophiiformes – dřasové - paprsek hřbetní ploutve jako světlíkující vějíčka (illicium)



čel. Ceratiidae - tykadlovkovití
♀ až ca 1 m; ♂ trpasličí,
v dospělosti žijí přichyceni na ♀,
zcela atrofují až na varlata;
-1000 až -2000 m, celosvětově;
např. *Ceratias holboelli*

Haplophryne mollis
čel. Linophrynidae
bradovousovití
vějíčka redukovaná;
♂ trpasličí, přisedlí na ♀

Caulophryne sp., čel.
Caulophrynidae - čerto-
vníkovití; bez vějíčky,
hmatová tykadla

Perciformes - ostnoploutví



Chiasmodon niger - zubovka černá
čel. Chiasmonidae
subtropy a tropy, -700 až -2800 m;
max. 25 cm, spodní čelist přesahuje
horní, polyká vcelku ryby větší než je
sama (*Gempylus serpens* 86 cm)

Stomiiformes - velkoústí



čel. Stomiidae - světlonošovití
červené fotofoty – vidí červeně
zbarvené org.; larva s dlouze
stopkatýma očima



Agryopelectus sp.
čel. Sternopychidae - stříbrnáčkovití
ploché tělo, teleskopické oči, maskování:
odraz na bocích, zespoda bioluminiscence

Argentiniformes - stříbrnicotvaří
čel. Opistoproctidae – strašníkovití, „barreleye fish“



Winteria telescopa - strašík tmavý
obrovské čočky, bioluminiscence




Macropinna microstoma

1. foto *2004, rotující oční koule
v transparentní hlavové tkáni; krade
kořist ulovenou trubýši?



Saccopharyngiformes - velkolamky, příbuzní úhořů

Eurypharynx pelecanoides - šírotlamka pelikánovitá
čel. Eurypharyngidae: jen 1 druh; ca 1 m, malé zuby,
obrovská tlama, ale kořist převážně malí korýši, konec
ocasu světélkuje; tropy a subtropy, -900 až -8000 m



Anguilliformes - holobřiší


Nemichtys scolopaceus - úhořovka zobákovitá
čel. Nemychtiidae; až 1,5 m dlouhý, rozvíhavé čelisti,
malé hákovité zuby – hákuje končetiny korýšů

Hlubokomořské dno: abysální pláň

- ca 60 % povrchu Země
- prům. hloubka -4500 až -6000 m, nerovnosti překryté jemným prachem
- především Atlantik a Indický o., Pacifik málo (lemován příkopy, které zachytí většinu sedimentu)
- biogenní sedimenty – vápnitý kal (kokolitky, dírkonošci, jemně rozdrcené schránky živočichů), makroúlomky měkkýšů a korálů, křemitý kal (rozsivky, mřížovci)
- zdánlivě pustá, ale relativně velká druhová bohatost
- dírkonošci, hlístice, stejnonožci, mnohoštětinatci, mlži, ostnokožci, žaludovci; zdrojem potravy nejčastěji baktérie



nádobí z Titanicu
abysální pláň, sv. Atlantik



Cnidaria



Pennatulacea, Alcyonaria:
A) *Umbellula*: 42 druhů
čel. Umbellulidae



Boloceroides daphneae
čel. Boloceroididae
(Actiniaria); prům. stvolu
1 m, chapadla až 3 m;
vých. Pacifik, kolem
-2500 m, blízko
hydroterm. vývěrů, *1990





Actiniaria:
Actinoscypnia sp.
čel. Actinoscypnidae
„fly-trap anemone“

„Porifera“




Hexactinellida – mnohojaderné
syncitium, křemité jehlice, často
tvoří početné skupiny; a)
Hyalonema sp., -100 až -6000
m, b) *Euplectella aspergillum*
houba pletená, až 60 cm



Chondrocladia - ca 35 druhů
(Demospongia), karnivorní,
kolem -2000 m



Biremas sp. („Polychaeta“)
trsy jemných chapadel
kolem úst k plavání



Pycnogonida - nohatky
hlubokomořští až 50 cm (!),
sají na bezobratlých;
Monterey Canyon ca -3000 m



Megadicopia hias
Asciidae, čel.

Octacnemidae; Monteray Bay,
-200 až -1000 m; dravec,
ústní otvor rychle sklapne,
kořist (klanonožec) je
strávena, zase se otevře



Bathynomus giganteus
(Isopoda, čel. Cirolanidae)
až 70 cm; velké složené
oči, schopnost volvace,
mrchožrout i dravec; velká
vajíčka, larva chybí; studené
vody Atlantiku, -200 až -2200 m

Echinodermata

- hlavní složka bioty mořského dna, zanechávají typické cestičky




Ophiuroidea - hadice

- celkem ca 1900 druhů, mnoho z nich hlubokomořských:
-500 až -7000 m
- často sdruženy s houbami a žahavci



Gorgonocephalus arcticus
„Northern basket star“
čel. Gorgonocephalidae
(ř. Euryalida); Sev. Atlantik
až -1500 m


Amphiura filiformis
čel. Amphiuridae
(ř. Ophiurida); zahrabává
se do sedimentu; Severní
moře, -5 až -1200 m




Kumulativní nárůst druhů
ostnokožců - sv. Atlantik, vlečná síť
(Gage 1986)

Crinoidea - lilijice

- bazální větev ostnokožců
- tělo využené pohyblivými vápenitými destičkami
- většina druhů (x tis.) fosilních – radiální speciace v ordoviku a triasu; crinoidové vápence (+ dírkonošci, měkkýši)
- fosilní a hlubokomořské mají stvol („sea lilies“)
- typické na hranách kontinentálního zlomu
- recentní hlubokomořské: ř. **Isocrinida**, **Millericrinida**, **Cyrtocrinida**, část **Comatulida** (ca 20 druhů)



Rhizocrinus lofotensis
čel. Bythocrinidae, Comatulida
až 10 cm; často husté porosty,
od -800 až do více než -2000 m;
(„živoucí fosilie“ - *G.O. Sars,
1864)




doliolaria



Agaricocrinus americanus

Astroidea - hvězdice

- až do hloubek -6000 m a více; predátoři/mrchožrouti, filtrátoři (např. *Novodinea*, potravou jsou nejč. batypelagičtí klanonožci), „bahnožrouti“



čel. Zoroasteridae

36 druhů, hloubky -200 až -6000 m celosvětově; malý středový terč a dlouhá štíhlá ramena; bílé až oranžovočervené; fosilní záznam

Xyloplax turnerae - 2-13 mm, abysál, na potopeném dřevě; **Concentricycloidea** - pův. jako 6. třída ostnokožců, ale zřejmě patří mezi hvězdice





Figure 2. Comparison of adult water-vascular morphology. a: Concentricycloids (based on original descriptions of *Xyloplax turnerae* (Rowe et al. 1988). b: Other asterozoans (based on asteroids).

Holothuria - sumýši

- 95 % biomasy mořského dna; většina bentických, ale někt. dokážou aktivně plavat
- bohatá střevní mikroflóra - účinnější trávení



Enypniastes eximia
čel. Pelagothuridae
ca 20 cm; jemně želatinózní tělo, chybí vápnité destičky, obrana: lepivé vlákno; plave, ale špatně kráčí



Scotopanes globosa
„sea pig“, čel. Elpidiidae
až 10 cm; Atlantik a Indopacifik, ca -1000 m;
tubulární kráčivé výběžky,
často vysoké denzity
<http://www.youtube.com/watch?v=x3dvs6C8c7g>

<http://www.youtube.com/watch?v=gr5tN33VziM&feature=related>



Paelopatides confundens
čel. Synallactidae; ca 20 cm,
schopnost plavat



Psychropotes longicauda
čel. Psychropotidae
kosmopolitní druh

Echinoida - ježovky

- ř. **Echinothuroidea** – bazální skupina pravidelných ježovek, většina druhů hlubokomořských; schránka tenká, dekalcifikovaná, primární ostny „kopýtkaté“, hřbetní ostny s jedovým váčkem, asi 50 druhů; až do -5000 m



Araeosoma belli
vých. Indický oceán



Phormosoma sp.

- ř. **Echinoida**



Dermechinus horridus „cactus urchin“
3x vyšší než širší, Aristelova lucerna
malá – zřejmě filtrující mikrofág,
primární ostny dlouhé svítící,
sekundární krátké, ale ve velkém
množství; j. polokoule

Ryby a paryby



Aulopiformes - jinožábří

Bathypterois grallator - bezočka chůdovitá, „tripod fish“
čel. Ipnopidae; max. 40 cm, tuhé prodloužené břišní a
ocasní paprsky, plankton naráží do prsních ploutví;
hemafrdit



Lophiiformes

čel. Ogcocephalidae – chřestivcovití, „walking bat-fish“
chemické látky k nalákání kořisti: korýši, ryby,
mnohoštětinatci; -200 až -1000 m




Hexanchiformes - šedouni

Chlamydoselachus anguineus - žralok límcový
až 2 m, kosmopolit, -150 až -1500 m, „živoucí fosilie“;
loví sépie, žraloky a hlubokomořské ryby

Hydrotermální vývěry

- vývěry horké minerální vody podél středooceánských hřbetů a prahů, hloubka obvykle ca -2500-4000 m
- černé kuřáky ($>350^{\circ}\text{C}$, vysrážené sulfidy kovů, až 30 m vysoké komíny), bílé kuřáky ($30\text{-}350^{\circ}\text{C}$, Ba_2SO_4), vývěry o $X^{\circ}\text{C}$ teplejší než okolní voda
- rozvinutá bentická společenstva: bradatice, mlži, krabi, krevety, plži, ježovky, hvězdice, hadice, sasanky, polypovci, ryby
- prim. producenti - archebakterie oxidují sirovodík – potrava nebo symbionti
- rychlá kolonizace, náhlé extinkce, životnost X-X0 let






Studené vývěry

- hypersalinní průsaky, průsaky uhlovodíků a průsaky na subdukčních zónách
- i v hloubkách kolem -100 m
- relativně malá diverzita, ale často enormně vysoká biomasa




průsak uhlovodíků






ponorka Alvin (1977)




bílý kuřák



černé kuřáky

- Galapážský rift - *1977, -2500 m, 8-12°C, objevena *Riftia*, mlži, krabi
- Východopacifický práh - *1979, 350°C, černý kuřák
- hřeben Juan de Fuca - *1981, průsak na subdukční zóně
- Guaymaský bazén - *1982, průsak
- Floridský sráz, Mexický záliv - *1984, -3000, hypersalinní průsak
- Kaskádová subdukční zóna - *1984, -2036 m, +0,3°C, methan
- Atlantik - *1985, -3500 m, bílé krevety
- Mariánská pánev - *1987
- 9North - *1991, pozorování od vzniku, Nautilus
- Lucky Strike, Azorské ostrovy - *1993, vrchol sopky, -1525 m



„Pogonophora“ – bradatice, pogonofory

- dříve jako samostatný kmen, nyní skupina (třída, řád?) uvnitř „Polychaeta“
- dlouhé červovité až nitkovité tělo v chitinoproteinové rource, pohyb uvnitř trubice
- hemoglobin se 2 vazebními místy: pro kyslík a sirovodík; dýchací pohyby chapadel
- většinou gonochoristé, oplození vnější
- larvy planktonní a planktonotrofní, trávicí soustava časem atrofuje, autotrofní bakterie fagocytovány
- ca 120 druhů, stále nové objevy; -80 až -9900 m




Riftia pachyptila *1977




Lamellibranchia sp.

- 4 tělní oddíly 1) tentakulomera: různý počet chapadel, někdy stočené do spirály
– dýchání, 2 zrohovatélé laloky; 2) frenulomera: 2 tvrdé hřebeny (frenulum)
nebo 2 křídlovité výběžky pro uchycení v trubici; 3) gonomera - nejdelší:
pohlavní org. a trofozóm – žláznatá tkáň s chemautotrofními symbionty;
4) opistosoma: štětiny k ukotvení v trubici
- 2 skupiny



Prevíata



Vestimentifera

Previata (syn. Frenulata)

- mají frenulum
- chladná voda, od velkých hloubek až do litorálu (Ochotské moře)
- u někt. i omezený příjem org. l.
- čel. *Siboglinidae* (*1914)



Siboglium



Bobmarleya gadensis

*2008, záliv Cádiz, -2200 m



Vestimentifera

- až 1000 chápadel dále rozvětvených



Riftia pachyptila

vých. Pacifik, černé kuřáky - často dominantní, nejrychleji rostoucí bezobr. (85-160 cm/rok), rychlá kolonizace nově vzniklých habitatů (stálý pool larev?)



Lamellibranchia luymesii

trubice max. 3 m, průsak uhlovodíků, Mexický záliv, -500 až -800 m; pomalý růst, až >250 let (!), „kořeny“ nasává H₂S



L. satsumi

trubice až 5 m, průsak uhlovodíků, záliv Kagoshima, -82 m

Molusca: Bivalvia

- mlži s chemoautotrofními symbionty: Vesicomyidae, Mytilidae, Solemyidae, Thyasidae, Lucinidae, Teredinidae
- kolonizace hlubokomořských vývěrů pravděpodobně z mělkého moře, mezistupeň: velrybí zdechliny, potopené dřevo
- larvy neseny abysálními proudy (X00 km), stimulace přisednutí: vysoká mikrobiální denzita, teplota a H_2S



Calyptogena magnifica - až 25 cm
ř. Veneroida, čel. Vesicomyidae
(Kelliellidae?); hydrotermální vývěry,
metanové průsaky; Východopacifický práh
a Galapážský rift; chemoautotr. symbionti
na žábřech; trávicí trakt vymizel; aktivně
lezou; potrava pro chobotnice?



Bathymodiolus: ca 20 druhů
ř. Mytiloida, čel. Mytilidae
Atlantik; přichyceni byssovým
vlákнем, symbionti na žábřech, ale
ústa a střevo zachovány, filtrace
bakterií z vody; hustoty až 300
ind./m²; největší *B. boomerang*
(až 36 cm)

„Polychaeta“

- z hydrotermálních vývěrů a studených průsaků známo ca 110 druhů (z ca 8 čel.)
- různá trofická úroveň – spásaci bakteriálních povlaků, predátoři, mrchožrouti (např. *Galapagomystides aristata* - hemofág?)
- **Polynoidae** – 2. největší čel., 20 podčel.; abysální pláně, příkopy, hydrotermální vývěry (40 druhů), velrybí mršiny; 23 % druhů komenzálních - hostitelé: žahavci, mlži, Vestimentifera atd.



Branchipolynoe, čel. **Polynoidae**
ca 20 druhů na Vestimentifera,
Bathymodiolus a *Calyptogena* (až 90%
prevalence!) komenzálové nebo paraziti?
v hostiteli heterosexuální páry

Alvinella pompejana, čel. **Alvinellidae**
až ca 13 cm; mukózní rourky na stěnách
černých kuřáků, pionýrský druh; zád' až
80°C, příd' ca 20°C; na zádech epibiontní
chemolitotrof. bakterie

Decapoda: Caridea

- krevety čel. Alvinocarididae (Mirocarididae) - specialisté na redukční prostředí, Bresiliidae, Oplophoridae
- zvláštní adaptace očí, karotenoidové pigmenty, chemoautotrofní epibionti (na ústních končetinách, stěnách žaberní komůrky, ve střevě)



Alvinocaris, čel. Alvinocarididae
rod široce rozšířen v Atlantiku i
Pacifiku; >10 druhů; vysoké denzity
na slávkovém podloží



Rimicaris exoculata, čel. Bresiliidae
až 5,5 cm; dominantní na komínech černých
kuřáků Středoatlantského hřbetu (až 2500
ind./m²); oko chybí, ale má světločivný
dorzální orgán (modro-zelená a IR) x u
juvenile podobná stavba jako oko povrch.
druhů

Decapoda: Anomura, Bathyura

- **Anomura** - většinou pouze částečná nutriční závislost na chemoautotrofech; čel. Galatheidae, Kiwaidae, Chirostylidae, Lithodidae
- **Brachyura** – specializované čel. Bythograeidae, Xenograpidae....



Kiwa hirsuta

„yetti-lobster“ *2005
čel. Kiwaidae, ca 15 cm;
hydroterm. vývěry
- Východopac. práh;
slepý, ochlupení:
symbiontní bakterie;
mrchožrout



Galatheidae



Lithodidae



Bythograea thermydron


čel. **Bythograeidae**: 13 druhů
vrcholoví predátoři hydroterm.
vývěrů v Pacifiku; průsvitný
karapax, bez pigmentace; u
dospělců chybí vnější struktura
oka × u juvenilů oko velmi
citlivé; gravidní ♀ - větší
vzálenost od vývěrů (embrya
citlivá na sulfidy)



Thermarces cerberus
čel. Zoarcidae – slimulovití
(Perciformes - ostnoploutví)



Bythites hollisi, čel. Bythitidae
jeskyňovcovití (Ophidiiformes -
hrujovci); běžný na Galapážském
a Východopac. riftu




Benthoctopus
ca 25 druhů,
-200 až -3000 m

Vulcanoctopus hydrothermalis
čel. Octopodidae
endemit hydroterm. vývěrů Východopacif.
prahu; ♀ velmi vzácné, nemají spermathéku;
parazitický klanonožec *Genesis*
vulcanoctopusi (*2000)



Zdroje potravy

- mořský sníh – drobná těla (zooplankton) padající ke dnu
- krab *Xenograpsus testudinatus*
mělké hydroterm. vývěry u Taiwanu, ca -200 m




„...zdechlina rozežraná na horkém loži z oblázků...“

- uhynulá těla kytovců, paryb, ryb a tuleňů
- velrybí mršiny - relativně časté habitaty, dosud zaznamenáno >400 druhů rozkladačů (z toho ca 21 výlučně), rozklad může trvat 10-15 let
- sukcese společenstva rozkladačů
 1. mobilní mrchožrouti – rozklad měkkých tkání (různonožci, hlubokomořské ryby a žraloci), rychlosť rozkladu až 40–60 kg/den
 2. oportunisičtí rozkladači (mnohoštětinatci, klanonožci, krabi, hadice) – kolonizace živinami obohaceného okolí, denzity až 40 tis. ind./m²
 3. anaerobní rozkladači kostí (červi, mlži, stejnonožci, bakterie) – společenstva podobná hydroterm. vývěrům





čel. *Lysianassidae* – největší čel. různonožců (>500 druhů), jedni z nejhojnějších mrchožroutů ve světovém oceánu; např. *Eurythenes gryllus* – max. 14 cm, kosmopolit, hlavní dekompozitor hlubokomořského prostředí, batotolerantní (až -7800 m), stenotermní; veliké mandibuly na krájení potravy, velké střevo, pomalý metabolismus, přežije dlouhé hladovění, při žraní zvětší objem těla 3-5x



Columbellidae:
Astyris permodes



♀ ♂

Osedax frankpressi – čel. Siboglinidae, ♀ až 7 cm, ♂ 0,2 mm – žijí v těle ♀ (až 100 ind./♀), stádium trochofory, determinace pohlaví dle místa, kde larva přisedne; slizovitý obal, tkáně se symbiont. bakteriemi trvale zanořené v kosti (zeleně), pérovitá chlapadla k dýchání kyslíku; vysoká produkce vajíček (vaječníky bílé), po sežrání kosti červ uhyne; dosud 2 druhy rodu



Lithodidae: Munidopsis sp.



sliznatky čel. **Myxinidae** (Cyclostomata) kolonizují mršinu jako první, často XOO jedinců z okolí až 2 km; např. *Eptatretus*, *Myxine*



Somniosus pacificus - světloun pacifický (Squaliformes - ostrouni); údajně až 7 m, sev. Pacifik, kontinentální šelf a svahy, až kolem -2000 m; na velrybích mršinách největší jedlík

ryby čel. **Macrouridae** - hlavounovití (Gadiformes - hrdloploutví) až 15 % všech abysálních ryb; např. ***Coryphaenoides armatus*** - hlavoun ozbrojený; sv. Pacifik