

Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie – 27.4.2015


Buněčné terapie

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie
Přírodovědecká fakulta MU



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tato prezentace je spolufinancována
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky



Regenerativní medicína

= lékařské postupy, které umožňují tělu opravit, nahradit nebo regenerovat poškozené nebo nemocné buňky, tkáně a orgány

- buněčné terapie
- tkáňové inženýrství
- biomateriálové inženýrství
- produkce růstových faktorů
- transplantační medicína

Buněčné terapie

Definice FDA (Federal Drug Agency, USA):

- prevence, léčba, odstranění nebo zmírnění onemocnění nebo poškození lidského organismu aplikací autologních, allogenních nebo xenogenních buněk, které byly zpracovány nebo změněny *ex vivo*
- autologní buňky = buňky téhož organismu
- allogenní buňky = buňky jiného organismu téhož živočišného druhu
- xenogenní buňky = buňky jiného živočišného druhu

Program přednášky:

- genové terapie
- imunoterapie nádorů
- příprava orgánových, tkáňových a buněčných derivátů *in vitro*
- využití adultních a embryonálních SCs

GENOVÉ TERAPIE

Metody:


- náhrada exprese patologického genu
- oprava defektního genu *in situ*
- náhrada patologické alely standardní alelou

Terapie *ex vivo* (cell-based delivery):


- odběr buněk pacienta, kultivace, genetická změna *in vitro*, pomnožení, reimplantace
- deficit ADA, familiární hypercholesterolémie

Terapie *in vivo* (gene drugs, direct delivery):

- aplikace vektoru do těla pacienta
(injekce, aerosolový sprej)
- cystická fibróza



IMUNOTERAPIE NÁDORŮ A PROTINÁDOROVÉ VAKCÍNY




Využití monoklonálních protilátek
např. Herceptin (trastuzumab)



Protinádorové vakcíny

- klinické testy pro karcinomy prostaty, prsu, vaječníků a kolorektální karcinomy
 - a) nádorové buňky pacienta + dendritické buňky → vakcína rozpoznává a likviduje specificky buňky nádoru
 - b) nádorové buňky pacienta pozměněny *in vitro* → vyšší schopnost indukce imunitní odpovědi

Zvýšení imunitní odpovědi vůči nádoru

- odběr T-lymfocytů od pacienta s nádorem, jejich pomnožení *in vitro*, reimplantace pacientovi





1. rozsev karcinomu vaječníků v břišní dutině
2. odběr nádorové tkáně, kultivace *in vitro*
3. inzerce genu pro GM-CSF pomocí virového vektoru
4. inaktivace nádorových buněk ozářením
5. reimplantace pozměněných nádorových buněk → aktivace imunitního systému vůči buňkám nádoru


PŘÍPRAVA ORGÁNOVÝCH, TKÁŇOVÝCH A BUNĚČNÝCH DERIVÁTŮ *IN VITRO*

3 základní strategie regenerace tkání

- cell-based
oprava tkáně transplantací zdravých buněk do místa poškození
- scaffold-guided
porézní biodegradovatelný materiál, který slouží jako "lešení" pro dárcovské zdravé buňky; často aplikace v kombinaci s růstovými faktory
(ekvivalent extracelulární matrix)
- bioactive molecule-guided
indukovaná proliferace a diferenciace buněk v poškozené tkáni aplikací růstových faktorů

Praktické využití "cell-based" strategie:


- oprava poškozených chrupavek v kloubech
- oprava poraněné rohovky
- oprava poraněné míchy
- posílení činnosti imunitního systému
- terapie autoimunitních onemocnění (AIDS)
- terapie neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba)
- léčba aterosklerózy



cell-based strategie - léčba aterosklerózy


Oprava poraněné rohovky:

- odběr buněk z oblasti limbu → kultivace na feeder-layer (myší fibroblasty) → kultivace na gelu → transplantace



Praktické využití "scaffold-guided" strategie:


- komerčně dostupné:
kůže, chrupavka
- ve stádiu výzkumu:
chrupavka, kost, játra, cévy
oprava poraněné míchy
močový měchýř, ledvina




scaffold-guided strategie - obecné schéma
(autologní provedení)



Příprava umělé kůže (artificial skin):

- autologní, allogení
- keratinocyty z 1 cm²
→ až 1000 cm² kůže
během 2 týdnů






80letá žena
autologní
graft
po 12 měs.





68letý muž
allogenní
graft a
kultivovaná
epidermis
po 6 měs.




scaffold-guided strategie – poranění míchy

Oprava poškozené chrupavky v kolenním kloubu:


- odběr malého objemu chrupavky z kloubu → rozvolnění chondrocytů → smíchání s kolagenovým gelem → vytvarování → kultivace → transplantace





Rekonstrukce močového měchýře:

- a) scaffold s nasazenými buňkami
- b) spojení scaffold osazeného buňkami s původním měchýřem
- c) implantát je pokryt fibrinovou hmotou (připojení – omentum)



scaffold-guided strategie – "umělá" ledvina

Vytvoření funkční transplantovatelné ledviny:

- odstranění buněk z původní kadaverozní ledviny (decelularizace) → osazení epiteliálními a endoteliálními buňkami → kultivace v bioreaktoru → transplantace pokusným zvířatům → funkční ledvina

**nature
medicine**

nature.com > journal home > advance online publication > technical report > abstract

ARTICLE PREVIEW
view full access options >



NATURE MEDICINE | TECHNICAL REPORT

Regeneration and experimental orthotopic transplantation of a bioengineered kidney


Jeremy J Song, Jacques P Guyette, Sarah E Gilpin, Gabriel Gonzalez, Joseph P Vacanti & Harald C Ott

Affiliations | Contributions | Corresponding author


Nature Medicine (2013) | doi:10.1038/nm.3154
Received 04 September 2012 | Accepted 11 February 2013 | Published online 14 April 2013




Příklady nosičů (scaffolds) biologického původu



střevní submukózní tkáň



kolagenová matrix




Rekonstruovaná močová trubice s využitím kolagenové matrix


Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie / 10 / 27.4.2015


Praktické využití
"bioactive molecule-guided" strategie:

- růstové faktory:
PDGF, BMP-2 (bone morphogenetic protein)
- chrupavka, kost
- hluboká poranění tkání



Léčba hlubokých poranění
(kombinace všech 3 strategií)






VYUŽITÍ ADULTNÍCH A EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK

Health Problems that Might be Treated by Stem Cells

35




Bi8120 Aplikovaná buněčná biologie / 10 / 27.4.2015

Transplantace kostní dřeně

- SCs hematopoetické, SCs mesenchymální, progenitorové buňky...
- leukémie, lymfomy, aplastické anémie, vrozené metabolické poruchy
- přímá transplantace nebo separace hematopoetických SCs
- klinicky využíváno od 60. let 20. století
- nedostatek vhodných dárců


SCs z pupečnickové krve (umbilical cord blood)


- možná alternativa k transplantaci kostní dřeně
- menší riziko komplikací při transplantaci od nepříbuzných dárců - tzv. GVHD (graft-versus-host disease)
- nižší nároky na příbuznost dárce
- nevýhodou relativně málo SCs v odebraném materiálu (řešení: možnost kombinace)
- darování vs. archivace pro vlastní potřebu



Terapeutický potenciál lidských ASCs

- dědičná forma anémie, thalasemie, poruchy tvorby krevních destiček, imunoterapie
- kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční
- demence, degenerativní onemocnění CNS
- dědičná onemocnění jater, cirhóza (produkce α -1-antitrypsinu)
- svalové dystrofie
- diabetes





CUSTOM-MADE STEM CELLS

After discovering a reliable method for transforming human stem cells into nerve cells in rats, researchers have proved that those neurons can reach targeted muscles.

Embryonic cells




Fertilized egg

Researchers use human eggs fertilized in vitro.




Zygote

The embryo starts dividing into multiple cells.



Morula

Up to 4 days after the fertilization the embryo reaches a size of 16 cells.



Blastocyst

When the embryo reaches 200 cells or more its inner mass can be cropped for small groups of 30 stem cells.



Differentiation

Embryonic stem cells can give rise to almost any kind of specialized cells by changing the chemical or thermic environment of the culture, or inserting specific sequences of genes into their nucleus.



Culture

Over the course of several days, the cells proliferate and begin to crowd a culture dish.

Neural cells



Blood cells




Muscle cells



Treatment

Neural stem cells are treated with a cocktail of proteins that makes them functional.




Implantation

Once inserted in rats, these primed cells can develop into neurons or functional nerve cells attached to muscular tissue.

Cold storage

Unspecialized cells can be kept in liquid nitrogen for long periods of time for further use.





První klinická studie s využitím lidských ESCs

- leden 2009 – schváleno FDA
- využití hESCů pro léčbu poškození míchy
- Geron Corporation




Geron Phase I Clinical Trial


- GRNOPC1:
Geron's hESC-Derived Oligodendrocyte Progenitor Cells
- využití hESCs pro léčbu poškození míchy

Preklinické testy na hlodavcích


- dobré výsledky na testy toxicity i na tvorbu teratomů (pouze benigní cysty v místě poškození)
- žádná migrace buněk mimo nervový systém
- žádná imunitní odpověď vůči GRNOPC1

9 Months After No Treatment


(Damaged Zone)

9 Months After GRNOPC1 Treatment


(Loss of Neurons and Myelin)



(Myelinated Rat Axons)



(Loss of Neurons and Myelin)





(Myelinated Rat Axons)

Výsledky preklinických testů na krysách

GRNOPC1 Phase 1 Multi-Center Spinal Cord Injury Trial

- **Open Label Trial**
- **Subacute, Functionally Complete Spinal Cord Injury with a Neurological Level of T3 to T10**
- **2x10⁶ Cells**
- **Transplant 7-14 Days Post Injury**
- **Temporary Immunosuppression with Low Dose Tacrolimus**
- **Primary Endpoint: Safety**
 - *Neurological*
 - *Overall*
- **Secondary Endpoint: Efficacy**
 - *ASIA Sensory Score*
 - *Lower Extremity Motor Score*



Geron's Intellectual Property Portfolio

TheScientist

MAGAZINE OF THE LIFE SCIENCES

News & Opinion The Nutshell Multimedia Subjects Surveys Magazine

Search



Employee-owned Company Producing
The World's Finest Optical Filters
1-800-824-7662

News & Opinion

First hESC Trial Kaput

Geron is terminating a clinical trial testing a human embryonic stem cell treatment for spinal cord injury.

By Jef Akst | November 15, 2011

13 Comments




Like 62

Link this

Stumble

Tweet this



WIKIMEDIA COMMONS, NISSIM BENVENISTY

The world's first clinical trial testing a human embryonic stem cell (hESC) therapy is closing to further enrollment after a long, rocky ride, according to the Geron Corporation. The company, which started the trial two years ago, announced the trial's shuttering Monday (November 14), along with its decision to withdraw from the stem cell sector altogether—not for lack of promise, but simply a strategic move to stay afloat during hard economic times.

Follow The Scientist



Subscribe to RSS feed

All
The Nutshell
News & Opinion

Popular Posts

1. The Dark Side of Working Nights
2. Plant RNA Paper Questioned
3. Best Places to Work

Druhá klinická studie s využitím lidských ESCs

- listopad 2010 – schváleno FDA
- využití hESCs pro léčbu poškození Stargardtovy makulární dystrofie
(nejčastější forma makulární degenerace u dětí, neléčitelná, příznaky: 8-10 let, slepota: 30 let)
- ATC (Advanced Cell Technologies)
- retinal pigment epithelium (RPE) cells
<http://www.advancedcell.com/>



STEM CELLS®

EMBRYONIC STEM CELLS/INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS

Long-Term Safety and Function of RPE from Human Embryonic Stem Cells in Preclinical Models of Macular Degeneration

BIN LU,^a CHRISTOPHER MALCUT,^b SHAOMEI WANG,^a SERGEJ GIRMAN,^a PETER FRANCIS,^a LINDA LEMIEUX,^b ROBERT LANZA,^b RAYMOND LUND^a

^aCasey Eye Institute, Oregon Health and Science University, Portland, Oregon; ^bAdvanced Cell Technology, Worcester, Massachusetts, USA

Key Words. Embryonic stem cells • Retinal pigment epithelium • Macular degeneration • Clinical trials

STEM CELLS 2009;27:2126–2135

www.StemCells.com

Advanced Cell Technologies:

2 klinické studie s využitím lidských ESCs

- Sub-retinal Transplantation of hESC Derived RPE(MA09-hRPE)Cells in Patients With Stargardt's Macular Dystrophy
- Safety and Tolerability of Sub-retinal Transplantation of hESC Derived RPE (MA09-hRPE) Cells in Patients With Advanced Dry Age Related Macular Degeneration (Dry AMD)
- 4 kohorty, v každé 3 pacienti - rozdílné počty transplantovaných buněk (50 – 200 tisíc)
- zahájení: duben 2011, ukončení: 2013



[About Us](#) [Our Approach](#) [Research & Development](#) [Clinical Trials](#) [Investor & Media](#) [Contact](#)

The Power of Regenerative Ophthalmology™

We are developing innovative new therapies to treat vision loss with the mission of improving the quality of life for millions of patients worldwide.

[LEARN MORE](#)

Human Retinal Pigment Epithelial Cells

We believe in the power of vision. Ocata Therapeutics, Inc. ("Ocata"; NASDAQ Global Market: OCAT), formerly named Advanced Cell Technology, is a clinical stage biotechnology company focused on the development and commercialization of regenerative medicine and cell therapy technologies. The company's most advanced products are in clinical trials for the treatment of Stargardt's macular degeneration, dry age-related macular degeneration and myopic macular degeneration. Ocata's preclinical programs involve cell

Ongoing Clinical Trials



Stargardt's Disease

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
RPE Cell Therapy				Phase II
Photoreceptor Progenitor Therapy		Preclinical		

Dry Age-related Macular Degeneration

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
RPE Cell Therapy				Phase II
Photoreceptor Progenitor Therapy		Preclinical		

Myopic Macular Degeneration

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
RPE Cell Therapy			Phase I	

Retinis Pigmentosa

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
Photoreceptor Progenitor Therapy	Preclinical			

Glaucoma

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
Retinal Ganglion Progenitor Therapy	Preclinical			

Corneal Blindness

	DISCOVERY	PRECLINICAL	PHASE I	PHASE II
Corneal Endothelial Therapy	Discovery			





"You're a selfish bastard, Lewis..! Those stem cell lines were meant for people who've LOST an organ!"