

Metamorfnní petrologie I

6. Metamorfóza a metamorfní facie

3. Metamorfóza a metamorfní facie

Osnova:

- *Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády*
- *Metamorfní facie*
- *Geotektonická pozice metamorfózy*

1. Metamorfní zóny, indexové minerály izogrady

Diagnostické minerály

- přítomnost některých minerálů, jak v podstatném tak akcesorickém množství nám může indikovat určité metamorfnní podmínky nebo specifické chemické složení
- jejich použití v názvu horniny nám může rychle poskytnout důležitou informaci
- například staurolitický svor dosáhl teplotních podmínek nejméně 550 °C

- termín **metamorfnní zóna** byl zaveden Barrowem (1893) v metapelitech oblasti Dalradian ve Skotsku
- podle zvyšujícího metamorfnního stupně vstupují další (indexový) minerál:
 - chlorit – biotit – granát – staurolit – kyanit – sillimanit
 - střednětlaká metamorfóza
- později byla zjištěna v oblasti Buchan ve Skotsku jiná posloupnost minerálů:
 - biotit – cordierit – andalusit – sillimanit
 - nízkotlaká metamorfóza

2. Metamorfni facie


- Eskola (1915) odvodil koncept metamorfni facii (bazické horniny):
 - 1) Metamorfni facie zahrnuje horniny, které byly metamorfovány za stejných podmínek.
 - 2) Jestliže horniny stejného chemického složení jsou tvořeny stejnými minerály, pak náleží jedné facii.
 - 3) Podmínkou je aby hornina byla v rovnováze s metamorfními podmínkami (retrográdní met.).

- George Barrow (1893, 1912): Scottish Highlands, mapoval první výskyty porfyroblastů minerálů v metapelitech jako zóny: chlorite, biotite, garnet, staurolite, kyanite, sillimanite.
- U. Grubenmann (1911) *Die Kristallinen Schiefer:*
 - epizona – mělké pohřbení, (zelené břidlice)
 - mesozona – střední hloubka pohřbení, (amfibolity)
 - katazona – hluboké pohřbení, (granulity)
- Cecil E. Tilley (1925): definoval zóny indexových minerálů jako izogrady (tedy linie o stejné teplotě)

• *Metamorfni zóny,*

• Termín metamorfni zóna byl zaveden Barrowem (1893) v metapelitech oblasti Dalradian ve Skotsku. Podle zvyšujícího metamorfniho stupně vstupuje do horniny další (indexový) minerál

- chlorit
- biotit
- granát
- staurolit
- kyanit
- sillimanit




Regional metamorphic map of the Scottish Highlands, showing the zones of minerals that develop with increasing metamorphic grade. From Gillen (1982) *Metamorphic Geology. An Introduction to Tectonic and Metamorphic Processes*. George Allen & Unwin. London.

- **Chlorite zone.** Pelitic rocks are slates or phyllites and typically contain chlorite, muscovite, quartz and albite
- **Biotite zone.** Slates give way to phyllites and schists, with biotite, chlorite, muscovite, quartz, and albite
- **Garnet zone.** Schists with conspicuous red almandine garnet, usually with biotite, chlorite, muscovite, quartz, and albite or oligoclase
- **Staurolite zone.** Schists with staurolite, biotite, muscovite, quartz, garnet, and plagioclase. Some chlorite may persist
- **Kyanite zone.** Schists with kyanite, biotite, muscovite, quartz, plagioclase, and usually garnet and staurolite
- **Sillimanite zone.** Schists and gneisses with sillimanite, biotite, muscovite, quartz, plagioclase, garnet, and perhaps staurolite. Some kyanite may also be present (although kyanite and sillimanite are both polymorphs of Al_2SiO_5)


Pentii Eskola (1914, 1915) horniny o podobném chemickém složení v okolí Osla a Orijärvi mají odlišné minerální asociace

Reakce:



Oslo: Ksp + Crd

Orijärvi: Bi + Mu



Eskola (1920) : metamorfní facie na bazických horninách (5 základních)


Greenschist, Amphibolite, Hornfels, Sanidinite, Eclogite

Eskola (1939) : Granulite, Epidote-amphibolite, Glaucophane-schist, (Blueschist)


Metamorfní facie

- **Definice:** Je to soubor metamorfních minerálních asociací, opakujících se v prostoru a čase tak, že existuje konstantní a proto předpověditelný vztah mezi mineralogickým složením, chemickým složením horniny a stupněm metamorfózy.
- Metamorfní facie byly definovány na metabazitech.
- **Typy metamorfních facií:** 1) zeolitová, 2) prehnit-pumpellyitová, 3) modrých břidlic – glaukofan, 4) eklogitová - granát + omfacit, 5) zelených břidlic - chlority, aktinolit, 6) epidot-amfibolitová, 7) amfibolitová, 8) granulitová - ortopyroxen

Facie	Diagnostické minerály v mafických horninách
zeolitová	zeolity
prehnit-pumpellyitová	prehnit + pumpellyit
modrých břidlic	glaukofan + lawsonit nebo epidot (+albit +/-chlorit)
eklogitová	granát + omfacit
zelených břidlic	chlorit + albit + epidot (nebo zoisit) +/- aktinolit
epidotických amfibolitů	plagioklas (albit-oligoklas) + hornblend + epidot +/- granát
amfibolitová	plagioklas (oligoklas- andezín) + hornblend +/- granát
granulitová	ortopyroxen (+ klinopyroxen + plagioklas +/- hornblend +/- granát




Metamorphic Grade \longrightarrow




pelity	mafické horniny	nečisté dolomitické mramory
biotitová zóna	facie zelených břidlic	mastek
granátová zóna	facie epidotických amfibolitů	tremolit - aktinolit
staurolitová zóna		
staurolit-kyanitová zóna		
sillimanitová zóna	amfibolitová facie	diopsid
sillimanit - K-živcová zóna	granulitová facie	diopsid, forsterit

Chemicky různé horniny se během metamorfózy chovají odlišně (pelity, mafické horniny)

Generalized Metamorphic Facies Boundaries (after Yardley, 1988)





3) *Geotektonická pozice jednotlivých typů metamorfóz*



After Raymond (1995)

Miyashiro (1961) různé sekvence metamorfních facií v různých tekt. prostředích:

1. Contact Facies Series (very low-P)
2. Buchan or Abukuma Facies Series (low-P regional)
3. Barrovian Facies Series (medium-P regional)
4. Sanbagawa Facies Series (high-P, moderate-T)
5. Franciscan Facies Series (high-P, low T)




Série metamorfních facií

✓ vysoký poměr P/T (Zeo – PP – Blue – Ecl) – série glaukofan-jadeit **Sanbagawa**

✓ střední poměr P/T (Gre – Epi A – A – G) – série kyanit-sillimanit **barrovienská**


✓ nízký poměr P/T - (Gre – A – G) – série andalusit-sillimanit **Abukuma (Buchan)**



Kontaktní metamorfóza

Nízký P/T

(andalusit-sillimanit)



Clay



Brick



Pottery





Porcelain

Velikost a intenzitu kontaktní metamorfózy ovlivňují:

1) Vlastnosti plutonu


- velikost
- složení
- teplota
- tvar



2) Vlastnosti okolních hornin


- složení
- hloubka a metamorfní gradient
- permeabilita (vodivost hornin)

Facies Series: Low Pressure, High Temperature
CONTACT METAMORPHISM





1) Kontaktní metamorfóza probíhá za velmi nízkých tlaků a je způsobena teplem magmatu na povrchu nebo těsně pod ním.

Facies Series: Low Pressure, Andalusite—Sillimanite type
BUCHAN FACIES SERIES




2) Metamorfóza typu Buchan je nízkotlaká metamorfóza.

Subdukce





- Teplota 600°C je na straně subdukčního příkopu v hloubce 100 km a pod vulkanickým obloukem v hloubce kolem 20 km




Metamorfóza vysokotlaká

- Vysoký P/T (glaukofan-jadeit)
- Ryoke Belt (na straně ke kontinentu)
- Dominantní metapelity metamorfované až do sillimanitové zóny.
- Vysoko až středně-teplotní a nízkotlaká met. (HPMT)
- Hojné granitické intruze.




- Sanbagawa Belt (na straně k oceánu)
- Hojné bazické horniny metamorfované ve facii zeolitové až amfibolitové, časté blueschists (**glaukofan**),
- Metapelity dosáhly jen granátové zóny.
- Vysokotlaká nízkoteplotní met. (HPLT)

Facies Series: High Pressure, Moderate Temperature
SANBAGAWA FACIES SERIES



- 4) *Metamorfóza typu Sambagawa je známa ze subdukčných zón.*



- *Vyznačuje se párovým uspořádáním zón.*
- *Na jedné straně je zóna Ryoke-Abukuma charakterizovaná nízkým tlakem a vysokou teplotou.*
- *Na druhé straně Sanbagawa zóna pro niž je charakteristická nízká teplota a vysoké tlaky.*



After Miyashiro (1961)

Facies Series: High Pressure, Very Low Temp (jadeite–glaucophane)

FRANCISCAN FACIES SERIES



- 5) Franciská metamorfóza jde o vysokotlakou metamorfózu typickou pro subdukční zóny

Kontinentální kolize (Himaláje)

The Archetypal Continental Collision: India–Asia

plate boundaries, faults, mantle earthquakes, slip rates, warm mantle

↑ 20 mm/yr

Seno et al., 1993; McNamara et al., 1995; Calais & Amarjunga, 2000




Fig 20a India has collided with Asia









Fig 20b Collision has pushed up the Himalayas and Tibet







Mt. Everest
(Sagarmatha)







crustal stacking



Facies Series: Med Pressure, High Temp Kyanite —Sillimanite type


BARROVIAN FACIES SERIES






- 3) Barrovienská metamorfóza je střednětlaká regionální metamorfóza k níž dochází během kontinentální kolize.




Regionální - orogenní pásma

- MP/LT-HT barrovienská metamorfóza
 - Chl-Bt-Grt-St-Ky-Sill
 - *série kyanit-sillimanit, střední poměr P/T*
 - sed. břidlice \Rightarrow břidlice \Rightarrow fylit \Rightarrow svor \Rightarrow rula
-
- Chloritová zóna: (chlorit, muskovit, křemen, albit)
 - Biotitová zóna: (biotit, chlorit, muskovit, křemen, albit)
 - Granátová zóna : (almandin, biotit, chlorit, muskovit, křemen, albit nebo oligoklas)
 - Staurolitová zóna : (staurolit, biotit, muskovit, křemen, granát a plagioklas)
 - Kyanitová zóna. (kyanit, biotit, muskovit, křemen, plagioklas, granát a staurolit)
 - Sillimanitová zóna. (sillimanit, biotit, muskovit, křemen, plagioklas, granát a někdy staurolit)










TIME 1



TIME 2







Literatura

- Dudek, A. - Fediuk F. - Palivcová M. (1962): Petrografické tabulky
- Hejtman, B. (1962): Petrografie metamorfovaných hornin
- Konopásek, J. – Štípská P. – Klápová H. – Schulmann K. (1998): Metamorfnní petrologie
- Naprostá většina obrazového materiálu pochází z celé řady internetových stránek věnujících se metamorfnní petrologii