

Numerické metody

10. přednáška, 22. dubna 2015

Jiří Zelinka

Základní pojmy

$$Ax = \mathbf{b}, A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

A – matice soustavy, regulární. Řešení: $\tilde{\mathbf{x}} = A^{-1} \mathbf{b}$

Rozšířená matice soustavy:

$$(A | \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

A – dolní trojúhelníková: $a_{ij} = 0$ pro $i < j$.

A – horní trojúhelníková: $a_{ij} = 0$ pro $i > j$.

A – pásová, jestliže existují $p, q, 1 < p, q < n$ taková, že $a_{ij} = 0$, jestliže $i + p \leq j$ nebo $j + q \leq i$, šířka pásu $w = p + q - 1$.

A – třídiagonální pro $p = q = 2$.

A – ryze řádkově diagonálně dominantní

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n.$$

A – ryze sloupcově diagonálně dominantní – podobně

Věta:

Ryze řádkově (sloupcově) diagonálně dominantní matice, je regulární.

Gaussova eliminační metoda

Úprava soustavy na soustavu s horní trojúhelníkovou maticí R :

$$(A | \mathbf{b}) \longrightarrow (R | \tilde{\mathbf{b}})$$

Pak provádíme tzv. zpětný chod – počítáme řešení od poslední složky k první.

Elementární úpravy a matice úprav

Nemění řešení, každá úprava má inverzi.

1. násobení řádku nenulovou konstantou c

$$I_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & c & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad I_c^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & 1/c & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

2. výměna řádků i, k

$$P_{i,k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \dots & & & & & & 0 \\ 0 & 1 & & & & & & & & & 0 \\ & & \ddots & & & & & & & & \\ & & & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 & & & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ & & 0 & 0 & & & & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & & 0 & 1 & 0 & \dots & & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & \dots & & 0 & 0 & 1 & & \\ & & \vdots & & & & & & & & \ddots & \\ 0 & & 0 & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{i,k}^{-1} = P_{i,k}$$

$P_{i,k}$ – permutační matice

3. přičtení c násobku i -tého řádku ke k -tému, $i < k$

$$G_{i,k,c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & & 0 \\ 0 & 1 & \dots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \\ i & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ k & & & c & & 1 & \\ & & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

$$G_{i,k,c}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & & & 0 \\ 0 & 1 & \dots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \\ i & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ k & & & -c & & 1 & & \\ & & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Ve skutečnosti pro převod na trojúhelníkovou matici stačí 2. a 3. elementární úprava.

Postup při Gaussově eliminaci

(1) výměna 1. a k -tého řádku (v případě potřeby)

$$(A \mid \mathbf{b}) \longrightarrow (A^{(1)} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(1)}), \quad (A^{(1)} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(1)}) = P_{1,k} \cdot (A \mid \mathbf{b})$$

(1') vynulování prvního sloupce pod hlavní diagonálou

$$(A^{(1')} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(1')}) = G_1 \cdot (A^{(1)} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(1)}), \quad G_1 = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

$$l_{k1} = -\frac{a_{k1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$$

(i) výměna i -tého. a k -tého řádku (v případě potřeby)

$$\left(A^{(i)} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(i)} \right) = P_{i,k} \cdot \left(A^{(i-1')} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(i-1')} \right)$$

(i') vynulování i -tého sloupce pod hlavní diagonálou

$$\left(A^{(i')} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(i')} \right) = G_i \cdot \left(A^{(i)} \mid \tilde{\mathbf{b}}^{(i)} \right),$$

$$G_i = \begin{pmatrix} 1 & & \cdots & & 0 \\ & \ddots & & & \\ \vdots & & 1 & & \\ & & l_{i+1,i} & \cdots & \\ & & \vdots & \ddots & \\ 0 & & l_{n,i} & & 1 \end{pmatrix}, \quad l_{ki} = -\frac{a_{ki}^{(i)}}{a_{ii}^{(i)}}$$

$$i = 2, \dots, n-1$$

Gaussova eliminace bez výměny řádků:

$$(R \mid \tilde{\mathbf{b}}) = G_{n-1} \cdot \dots \cdot G_2 \cdot G_1 \cdot (A \mid \mathbf{b})$$

tedy

$$R = G_{n-1} \cdot \dots \cdot G_2 \cdot G_1 \cdot A$$

odkud

$$G_1^{-1} G_2^{-1} \dots G_{n-1}^{-1} R = A.$$

Matice G_i jsou dolní trojúhelníková, tedy G_1^{-i} jsou také dolní trojúhelníkové, takže

$$A = L \cdot R, \quad L = G_1^{-1} G_2^{-1} \dots G_{n-1}^{-1}.$$

L – dolní trojúhelníková matice.

$$G_i^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \cdots & & 0 \\ & \ddots & & & \\ \vdots & & 1 & & \\ & & -l_{i+1,i} & \ddots & \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \\ 0 & & -l_{ni} & & 1 \end{pmatrix},$$

pak

$$L = G_1^{-1} G_2^{-1} \cdots G_{n-1}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ -l_{21} & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -l_{n1} & \cdots & -l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}.$$

LR rozklad

$A = L \cdot R$: LR (též LU) rozklad matice A

Použití při řešení soustavy: substituce $Rx = y$, řešíme soustavu $Ly = b$ s dolní trojúhelníkovou maticí, pak $Rx = y$ s horní trojúhelníkovou maticí.

LR rozklad s výměnou řádků

Provádíme LR rozklad matice $P \cdot A$, kde P je vhodná permutační matice, která provádí výměnu řádků.

Při praktickém výpočtu, pokud narazíme na potřebu vyměnit řádky, postupujeme takto:

Pokud bychom vyměnili řádky předem, v už vypočítané části matice L by tyto řádky byly vyměněny, zbytek by se nezměnil. Proto můžeme vyměnit řádky ve vypočítané části matice L .

Dále v pomocném vektoru p na začátku nastaveném na $(1, 2, \dots, n)^T$ zaznamenáme výměnu řádků, tedy vyměníme v něm stejné řádky.

Příklad

$$2x_1 + 4x_2 - x_3 = -5$$

$$x_1 + x_2 - 3x_3 = -9$$

$$4x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$$

Výběr vedoucího prvku (pivota) – částečný

Při úpravě i -tého sloupce najdeme mezi prvky $a_{ii}^{(i-1)}, \dots, a_{ni}^{(i-1)}$ prvek s maximální absolutní hodnotou (např. $a_{ki}^{(i-1)}$), pak vyměníme i -tý a k -tý řádek.

Výběr vedoucího prvku (pivota) – úplný

Hledáme prvek s maximální absolutní hodnotou mezi $a_{jk}^{(i-1)}$, $i \leq j \leq n, i \leq k \leq n$, pak vyměníme příslušný řádek a spoupec, čímž se změní pořadí proměnných.

Příklad:

LR rozklad matice

$$A = \begin{pmatrix} 0,0001 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

se zaokrouhlováním na 3 platné číslice.

Věta

Nechť všechny hlavní minory matice $A \in \mathcal{M}_n$ jsou různé od nuly, tj.

$$a_{11} \neq 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \dots, \quad \det A \neq 0.$$

Pak matici A lze rozložit na součin dolní a horní trojúhelníkové matice.

Důsledky

- Nechť matice A je pozitivně definitní. Pak GEM lze provést bez výměny řádků a sloupců.
- Nechť matice A je ryze řádkově diagonálně dominantní. Pak GEM lze provést bez výměny řádků a sloupců.