

Fytocenologický snímek č.:

Název:

Lokalizace:

Popis stanoviště:

GPS:

Plocha snímku:

Datum:

Autor:

Taxon:

Nadmořská výška:

Orientace:

Sklon:

Geolog. podloží:

Půdy:

Pokryvnost E3:

Pokryvnost E2:

Pokryvnost E1:

Pokryvnost E0:

E3 – stromové patro / tree layer

E2 – keřové patro / shrub layer

E1 – bylinné patro / herb layer

E0 – mechové patro / moss layer

Tahák:

- E3: nad 3 m
- E2: 1–3 m
- E1: do 1 m
- E0: mechorosty a lišejníky

(juv) = semenáčky dřevin


Braun-Blanquetova stupnice:

- r 1–3 jedinci s nepatrnou pokryvností (abundancí)
- + malá pokryvnost < 1 %, ale více jedinců
- 1 < 5 %
- 2 5 – 25 %
- 3 25 – 50 %
- 4 50 – 75 %
- 5 > 75 %

van der Maarelova transformace B-B stupnice:

- 2m ± 5 %
- 2a 5 – 15 %

Odhad pokryvnosti:



Tabua de ajuda para determinação de cobertura e Abundancia/Dominancia das especies (numeros em letra grande: Abundancia/dominancia segundo Braun-Blanquet)

2b 15 – 25 %