

Biotické krize a globální ekosystémy v historii Země – část V.

Silur-devon


Rostislav Brzobohatý

Výběrovka 17

SILUR (444-416 Ma) - DEVON (416-358 Ma)

SILUR - paleogeografie

- kolize Baltiky, Laurentie = vrcholí kaledonské vrásnění
- vzniká Laurasie
- Paleotethys
- Gondwana se suně k S
- fany – kosmopolitní ráz
- Země má ráz „Green house“
- klima podobné dnešnímu
- ledovce jen u pólů (nad 65 st.)
- aridní klima jen mezi 40 st.
- rovníkové oblasti pokryty teplými mělkými moři




Silurian (435 - 425 Ma)



Middle Silurian 430 Ma

Život

**Od sv. siluru nastupuje u foraminifer tvorba vápnitých
schránek**



Eovolutina sp., sv. silur



Virtuální pohled do silurského moře (Burian), z hlavonožců dominují kuželovité „loděčky“ (*Orthoceras*) – viz ortocerové vápence



**Silur – Skandinávie
(četná tabulata)**



Trs tabulátních korálů rodu *Halysites*, silur USA

Drsnatí koráli (Rugosa) prožívají v siluru počátek svého vrcholu

Tryplasma sp.,
solitérní korál, silur,
Wenlock, Anglie




Entelophyllum sp., trs (valoun)



Entelophyllum sp., koloniový korál, silur,
Kentucky

Mass Extinction Events and coral reef growth



rosáhlé
rify

Porifera – živočišné houby
-hrají významnou roli při stavbě
silurských a devonských útesů




Astylospongia, silur




Caryospongia, silur

Loděnký – významná součást nektonu, predátoři



A



B


FIGURE 10–46 Variation in conch shape among early Paleozoic nautiloid cephalopods. Both of these specimens are from the Silurian of Bohemia. (A) A sawed and polished section of the straight conch of *Orthoceras potens* showing septa and siphuncle. (B) Sawed and polished section of *Barrandeoceras*, exhibiting a coiled form. Specimen A is 22.5 cm in length; B has a diameter of 18 cm.

Orthoceras potens, silur, barrandien

Barrandeoceras sp., silur, barrandien

BIVALVIA (mlži)

Od ordoviku výrazněji zastoupeni než v kambriu, na svůj výrazný rozvoj však čekají až po ústupu brachiopodů v mesozoiku



Panenka sp., silur, barrandien



Cardiola cornucopiae, dalejsko-třebotovské s. sv. silur, barrandien


Gastropoda – nastupují již v kambriu, nehrají však výraznou roli před svrchním paleozoikem, v siluru dominují v této skupině starobybí plži




Platyceras, silur, barrandien



Oriostoma dives, silur, Praha





***Platystoma* (gastropod) sedící na lilijci *Eucalyptocrinus* (častý případ symbiosy) v silurském moři , USA**

Brachiopoda



Leptaena depressa, silur




Camarotoechia sp., silur



Dudley, UK, svrchní silur, Brachiopoda, 1= *Atrypa*, 2 = *Leptaena*

M. Mergl: Genus *Lingulops* (Lingulata, Brachiopoda) in Silurian of the Barrandian (Pl. I)



Zástupci rodu *Lingulops*,
Silur, Barrandien, Mergel (1999)

Trilobiti v siluru ustupují, mají však stále ještě stratigrafický význam



Aulacopleura konincki, silur, Loděnice, barrandien




Stáčení silurských trilobitů rodu *Calymene*

Eurypterida



Paracarcinosoma, Eurypterida, silur

Some of the larger eurypterids compared with one another and a 1.8 meter tall person.




„Cystoidea“ – jablovci, ostnokožci bez radiální souměrnosti, mořský bentos, nástup v ordoviku, vymírají v devonu



Holocystites scutellatus, silur, USA

Graptoloidea - graptoloidi, v siluru největší rozvoj planktonních forem, tvorba černých graptolitových břidlic, anoxie, nedostatek detritofágního bentosu




Monograptus sp., silur



Silur- graptolitové břidlice, barrandien



Demirastrites sp., silur, Sevilla




Monograptus planus, silur, Sevilla

AGNATHA (bezčelistní):

- rybovité formy, často pancéřnaté kožní kosti,
- pohyb po dně i dobří plavci
- kambrium-recent (v současnosti jen kruhoústí)
- velký rozvoj v ordoviku a siluru



sliznatka - recent




rekonstrukce




fosílie

Cephalaspis, silur


**Barevné interpretace některých
bezčelistných ze spodního devonu**



Drepanaspis



Pteraspis



Hemicyclaspis



Drepanaspis

Během siluru se bezčelistní (Agnatha) rozrůžňují a dosahují maximum své diversity, již v Or vznikají z chrupavčitých žaberních podpor čelisti – rozvoj gnathostomat








FIGURE 10–66 The early Paleozoic ostracoderms. (A) *Thelodus*, (B) *Pteraspis*, (C) *Jamoytius*, and (D) *Hemicyclaspis* drawn to the same scale.

**Ryby ze skupiny akanthodů
nastupují v siluru v mořích,
během devonu se adaptují na
sladkovodní prostředí**





Ještě jeden pohled na silurské rybovité obratlovce



Silur – eurypteryda a akanthodi, charakteristické skupiny dravého nektonu

Výtrusné rostliny opouštějí vodu (Psilophyta)



Zosterophyllum rhenanum



Rhynia major

Coocksonia sp.



Cooksonia caledonica, V. New York,
silur


rekonstrukce






Svrchní silur – vulkanická krajina s psilofyty

Vývojové schema cévnatých rostlin



DEVON - paleogeografie

- pokračuje sdružování kontinentů
- kolem rovníku „Old Red“ kontinent
- většinou teplé aridní klima
- útesové vápence
- v závěru ochlazení a opětné oteplení




Časný devon – Avalonia koliduje s Laurentií = Akadské pohoří (N. Anglie, Kanada)


Záp. okraj ruské platformy – kolizní tektonika = orogeneze Uralu a skythské oblasti

Východevropská platforma se zvedá + inverzní tektonika v pečorské pánvi vznikají transtenzní pánve


Lochkovian




The Eifelian World



**The Famennian
World**



Průběh života v devonu, hlavní události, vymírání na konci proběhlo ve vlnách




Stromatoporoidea – koloniální organizmy s vápnitou kostrou dnes řazené k houbám

- jejich bočníkovité, povlékové trsy jsou charakteristické laminovanou stavbou
- v siluru a devonu patří k nejdůležitějším útesotvorným organizmům
- ve svrchním devonu jsou výrazně postiženy vymíráním a tím se mění ráz útesů ve mladším paleozoiku.



irregular shape

ACTINOSTROMA CLATHRATUM
Nicholson; Middle Devonian; UK.



Actinostroma clathratum Nich.,
střední devon,
Anglie




2.5 mm

Aulopora – devon,
Porýní

Četné devonské vápence s faunou se používají jako okrasné kameny



Rekrystalované trsy rugózních korálů, Petoskey, devon



Příklad devonských rifů




Gastropoda – pokračují starobylé skupiny. Rod *Tubina* je charakteristický pro svahy spodnodedvonských útesů



Tubina armata, sp. devon, Koněprusy

Ammonoidea – amoniti


- nastupují ve **sp. devonu (?Si)**,
- v nektonu postupně přebírají roli loďčkovitých
- septální švy se v čase stávají složitějšími (stratigrafie)



Clymenia – rod typický pro svrchní devon

Clymenia

Pohled do devonského moře na život bezobratlých



Loděnka
(*Michelinoceras*)

Amonit
(*Goldringia*)

Ramenonožci
(*Paraspirifer*)

Trilobit
(*Phacops*)

Brachiopoda

-v devonu prožívají nový rozkvět,
dosahují maxima své diverzity

Stringocephalus, devon
(rod hojně zastoupený ve středním
devonu např. Moravského krasu)



10 mm




Bryozoa

- i v devonu mají významný podíl na stavbě útesů



Fenestella althaea

**plochá kolonie fene-
stelidních mechovek,
sp. devon,
New York**




Fenestella sp., devon

Echinodermata (ostnokožci)

Crinoidea (lilijice)

- kambrium-recent
- velký rozvoj v siluru až do konce paleozoika
- oproti recentu obývaly hlubší vody
- planktonní rod *Scyphocrinites* (horninotvorný, sv. silur)



často horninotvorná skupina – ukázka nahloučení celých lilijic v krinoidovém vápenci




recentní lilijice v moři

**Echinodermata (ostnokožci),
vymřelá skupina Blastoidea
(poupěnci)
sp. kambrium - perm**



fosilie



kalichy



rekonstrukce

Penremites godoni
sp. karbon, Illinois

**Z ostnokožců vedle lilijic hrají výraznou roli v devonu
i hvězdice – Asterozoa (predátoři na rozvinutých útesech)**



Devonaster eucharie

New York,

střední devon

Trilobita

-Na počátku devonu
prožívají poslední rozvoj

- Typické rody:



Odontochile




Phacops



Reedops



Dicranus sp., Maroko, devon



Eldredgeops rana – tečkování
Devon USA

A team led by Christopher McRoberts, of the State University of New York at Cortland and Thomas Hegna at Western Illinois University in Macomb examined more than 25 *Eldredgeops rana* trilobites that were discovered in central and western New York state. The fossil exoskeletons were dotted with regular arrangements of a variable number of spots — more than 500 in some cases. Chemical and mineral analyses indicated that spots are of similar composition to the rest of the fossil (Nature, 2013) , mohlo jít o aparát rozptylující světlo

Rody podtřídy Phyllocarida jsou v devonu typickým zástupcem rakovců (dnes přežívá jediná čeleď fylokaridů)



Nahecaris steurtzi, Malacostraca, Phyllocarida, Budenbach, devon (Německo, Hunsrück)

Insecta - hmyz

Nejnovější nálezy ukazují, že původ hmyzu musíme hledat již během siluru

Dokládá to spodnodevonská *Rhyniognatha hirsti*, která zastupuje již relativně vyvinutého zástupce hmyzu (snad ? okřídleného)



Mimo to jsou v devonu doloženy četné zbytky bezkřídleho hmyzu (chvostoskoci) a také

Arachnida - pavoukovci


(devonští zástupci patří dnes do vymřelého řádu Uraraneida [devon-perm] netkali ještě pavučiny, vlastní pavouci, Araneida, nastupují až od karbonu – *Palaeothele montceauensis* - Francie)




Gigantocharinus, svrchní devon



Rhyniognatha hirsti
Rhynie, Skotsko,
sp. devon



Členovci osídlili souši



© N. Tamura, 2012

Strudiella devonica, svrchní devon (famen), Belgie

After terrestrialization, the diversification of arthropods and vertebrates is thought to have occurred in two distinct phases, the first between the Silurian and the Frasnian stages (**Late Devonian period**) (425–385 million years (Myr) ago), and the second characterized by the emergence of numerous new major taxa, during the **Late Carboniferous period** (after 345 Myr ago)..

Devon = rozdílení různých skupin rybovitých obratlovců

čelistnatí



Bezčelistní neboli Agnatha
Prvními obratlovci jsou rybám podobní bezčelistní. Patří k nim různé podtřídy, jako např. Heterostraci, Thelodonti, Osteostraci, Anaspida a Petromyzonida. Do podtřídy Osteostraci náleží zde rekonstruovaný rod *Darmuthia*, který je rozšířen ve svrchním siluru Evropy (Estonsko). Jedinou fosilně zachovanou a tím známou částí těla je široký hlavový štít. Dnes jsou bezčelistní zastoupeni mihulemi a sliznatkami.






FIGURE 10-67 The Early Devonian acanthodian fish *Climatius*. (After Romer, A. S. 1945. Vertebrate Paleontology. Chicago University of Chicago Press.)




devonu Severní Ameriky (Onto), ale ojet... již ve svrchním siluru. Zástupci mají zuby s více špicemi.

Ctenacanthus




Úspěšné kostnaté ryby
Nejvíce životaschopnými ranými obratlovci jsou ryby kostnaté neboli Osteichthyes. Od nich pochází většina dnes žijících sladkovodních a mořských ryb. Na obrázku je ryba rodu *Myothomasia* ze středního devonu. Tento druh se vyvinul jako sladkovodní ryba pravděpodobně z předchůdců, kteří žili na hranici siluru a devonu, a náleží k paprskoploutvým (Actinopterygii), kteří se liší od lalokoploutvých (Crossopterygii) ganoidními šupinami.



Ostracodermi



Pteraspis



Cephalaspis




Další ukázky devonských
bezčelistných


~20
cm

Placodermi (Elasmobranchiomorphi)


aus Romer & Parsons - Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere



Arctolepis



Coccosteus




Phyllolepis



Lunaspis



Ramphodopsis



Gemuendina



Bothriolepis

Další ukázky devonských
čelistnatců – Placodermi
(pancířnatí)

Placodermi, *Bothriolepis*



Bothriolepis, jeden z nejhojnějších rodů plakoderm v devonu

Placodermi - *Dunkleosteus*

(pancířnati)

boční pohled


čelní pohled




FIGURE 10-68 The gigantic armored skull and thoracic shield of the formidable late Devonian placoderm fish known as *Dunkleosteus*. *Dunkleosteus* was over 10 meters (about 30 feet) long. The skull shown here is about 1 meter tall. It is equipped with large bony cutting plates that functioned as teeth. Each eye socket was protected by a ring of four plates, and a special joint at the rear of the skull permitted the head to be raised and thereby provided for an extra large bite. *Dunkleosteus* ruled the seas 350 million years ago. (Courtesy of the U.S. National Museum of Natural History, Smithsonian Institution; photograph by Chip Clark.)

Známe jen hlavu

rekonstrukce





Dunkelosteus – další možné interpretace




***Eastmanosteus* – 380 Ma, stř.- sv. devon, sz. Austrálie (oblast Gogo),
pancéřnatá, příbuzná *Dunkelosteus* (Dinichthyida)**



Možný pohled do mělkých vod devonu (D-*Dunkelosteus*, I- *Ichthyostega*)

Pohled do devonského moře (obratlovci)



(c)
acanthodian
(*Parexus*)

Gnathostomata

(d)
ray-finned fish
(*Cheirolepis*)

(b)
placoderm (*Bothriolepis*)

ostracoderm (*Hemicyclaspis*)

(a)


Agnatha

Kostnaté ryby (Osteichthyes)

- během devonu především ve sladkých vodách
- rozrůznění do tří skupin

Actinopterygii – především Chondrostei


bony fishes during the Mesozoic and Cenozoic. The second category of bony fishes, the Sarcopterygii, is characterized by fishes with sturdy, fleshy lobe-fins and a pair of openings in the roof of the mouth that led to clearly visible external nostrils.



Crossopterygii-lalokoploutví



Dipnoi – dvojdyšní – viz bahníci



Dipterus, devon







FIGURE 10-72 *Dipterus*, a Devonian lungfish.




Kadlub paprskoploutvých ryb v devonu



Sournné schema obratlovců a jejich rozpětí v historii Země



Protopterus sp.



Rozšíření dnešních dvojdyšných bahníků dokládá původní souvislost Gondwany a pohyb litosférických desek



Neoceratodus forsteri




Lepidosiren paradoxa

**Poslední 2 druhy žijících
lalokoploutvých**




Latimeria chalumnae, recent, Komorské ostrovy

Latimeria menadoensis, recent, Sulawesi



Dnešní rozšíření

Dipnoi mají podle současných výzkumů blíže geneticky k tetrapodům než coelakanti (*Latimeria*)




Kolonizace souše rostlinami:

- z ruduch → houby žijící saprofyticky (ne fotosyntéza) na organické hmotě pobřeží
- houby = rozklad org. hmoty, živiny pro kořeny, snížení vysušování (pomoc při osidlování)
=> potrava pro mikrobiotu + vývoj půd,
- osvobození rostlin od vodního prostředí, zefektivnění fotosyntézy (složitější morfologie těla) vedle vodivých systémů sekundární xylém – pevnost těla, kořenové systémy – kotvení + živiny, rozvoj cévnatých rostlin (podzemní kořeny, kmen, listy, vodivá pletiva, podpurná pletiva), nejprve Psilophyta (nejsou ještě morfologicky diferencovaná)
- ještě během devonu přesličky, plavuně, kapradiny



Archaeopteris, sv. devon,
~ 30 m



- rozvoj heterosporie (diferenciace spor na sporofytové generaci)
- samičí se časem podrží na sporofytu a oplodní přímo na něm samčími spory (vítr, hmyz) = nástup semen (předsemenné, Progymnospermophyta, měly druhotná pletiva, xylem i floem a stavbu již podobnou jehličnanům)
- ve vyšším devonu už souvislé porosty – lesy = zelená planeta,




Archaeopteris – sv. devon Porýní



fosílie

Značná diverzita hub byla provázena i značnými rozměry některých skupin. Zástupci rodu *Prototaxites* dosahovaly až 8m výšky. Dříve byly řazeny k rostlinám. Teprve analýza izotopů C ukázala, že se jedná o houby (K. Boyce et al., *Geology* 2007). Výška pomáhala k rychlému šíření výtrusů.



← *Prototaxites* sp. →
Si-De
(podle E. Soutworth 2007)



možná interpretace

mikrostruktura ve světelném mikroskopu

Jiný názor: jde o symbionta řas a lišejníků spíše než hub v užším slova smyslu, nebo o soubor hmoty jatrovek, sinic a houbovitých tubulárních prvků


Lower Devonian landscape

PSILOPSIDA

- první suchozemské rostliny,
- nemají kořeny ani listy
- jednoduché dichotomní větvení
- fotosyntéza-stonky,
- apikální reprodukční systém, spory ve sporangiu
- *Rhynia*



- Rekonstrukce spodnodevonské souše



Protolepidodendron

(b)

(a)


Dawsonites !

(c)

- *Bucheria*




dtto




Střední devon (Augusta -Burian)

Postupná terestrializace života – diverzifikace bezobratlých na suché zemi (stonožky, mnohonožky, roztoči, štíři, pavouci, hmyz, plži etc.) => volné niky s bohatou potravou i pro výstup obratlovců

Vztah párových končetin lalokoploutvých a dvojdyšných ryb ke končetinám tetrapodů



Lobe-finned fish



Early amphibian



dýchací
otvory

lebka
(Saleh, 2006)



Gogonasmus andrewsae

- 380 Ma, Austrálie, 30 cm
- ryba s řadou znaků such. tetrapodů:
 - dýchání,
 - ploutve se svaly a ramenní a loketní kostí
 - ušní oblast blízka ichthyostegáliím




© Brian Choo 2004

rekonstrukce



fylogenetická pozice
(Long et al. 2006)



Vývojová sukcese od ripidistií k ichthyostegaliím



***Panderichthys*, Frasnien, Lotyšsko, interpretace,**


Objev Tiktaalik roseae

Fosílie starou 375 miliónů let našli vědci na ostrově Ellesmere poblíž Severního pólu. Jde o živočicha, který má být „evoluční spojnici“ mezi vodními a suchozemskými tvory.



*vzdálený 980 kilometrů od pólu

Vývoj od vodního k suchozemskému živočichu



Hlava s očima podle časopisu Nature připomíná krokodýla

Zdroj: Reuters, Nature




Fosílie Tiktaalik roseae

Pozůstatky zvířete byly nalezeny zmražené v ledu

Některé části těla zvířete jsou typické pro ryby, jiné pro suchozemské živočichy


Tiktaalik Roseae



Tělo rostlo do délky až tři metrů

Rozpětí čelistí se pohybovalo mezi 25 až 50 centimetry

Zvíře mělo ostré zuby



limb

fin with wrist

fin

Ploutev s loketním a zápěstím kloubem a náznakem prstů => pohyb po mělčině

Tiktaalik

360 Million Years Ago

neck
wrists
flat head
expanded ribs

like a land-living animal



like a lobe-finned fish

fins
scales
primitive jaws

380 Million Years Ago

Upraveno podle (www-news.uchicago.edu, 2007)

Výstup obratlovců na suchou zemi (výběr dnešních dokladů)



Tiktaalik roseae

Elesmere Island (Arkt. Kanada),
375 Ma, sv.devon,
ostré zuby, přední – „noha“,
zadní – ploutev, ~ 3m (?)

Pozn.: Zachelmie (Polsko, Svkrž. Hory, stř.devon, 390 Ma) stopy čtyřnožců (?)




Tiktaalik roseae, model, interpretace

- relativně dobře vyvinutá žebra
- delší krk
- kosti podobné obojživelníkům
- = rel. dobrý pohyb i po zemi


Ichthyostega, svrchní devon



zadní končetina




Two Versions of the Ichthyostega



„dobrý“ pohyb
na souši

(*Tiktaalik* ho má menší než mladá *Ichthyostega*)



Ichthyostegalia – kostra, rekonstrukce Stepanie Pierce (2012)



Ichthyostega - Late Devonian - 1 meter

Co přináší genetika ?


Hox geny u veslonoha amerického (příbuzný jeseterů, „živoucí fosílie“) řídí vývoj párových ploutví ve dvou etapách. Stejná skupina genů řídí stejným způsobem i tvorbu končetin suchozemských tetrapodů.



Některé skupiny ryb měly apriori nástroj („preadaptace“) pro využití párových ploutví k dalšímu vývoji – tento nástroj byl využit a modifikován při přechodu na souši.




zadní párové ploutve




Polyodon spathula - veslonoh americký (Acipenseriformes)

párová končetina



Amphibia



Crossopterygia

u časných svrchnodevonských obojživelníků (Ichthyostegalia)

kolísá velmi počet prstů:

Hynnerpeton - 5

Tulerpeton - 6

Ichthyostega - 7

Acanthostega - 8

FIGURE 10-73 Comparison of the limb bones of a crossopterygian fish (upper right) and an early amphibian.





FIGURE 10-79 The skeleton of *Ichthyostega* still retains the fishlike form of its crossopterygian ancestors. (From Levin, H. L. 1975. Life Through Time. Dubuque, IA: William C. Brown Co.)

Ichthyostega, svrchní devon




lebka





rekonstrukce

Acanthostega, sv. devon,
Grónsko

-vnitřní žábry,
-krátká žebra,
= spíše vodní život




kostra




čas

Jiná interpretace



Crassygyrinus scoticus

Karbon




Tulerpeton

Sv. devon


***Tulerpeton* – dobře vyvinutá žebra, nemá vnitřní žábry, je blízký ke spodnokarbonským obojživelníkům, ?? život v přímořské oblasti**

Významné eventy v nejvyšším devonu


Vymírání mořských rodů (v %) během jednotlivých stupňů devonu – 2 výrazné piky ve svrchní devonu




Souhrnný diagram pro změny diverzity bentických skupin ve svrchním devonu



Souhrnný diagram změn diverzity pelagických skupin ve svrchním devonu





Redukce (bílá barva) některých skupin fauny na hranici frasn/famen (1-trilobiti, 2- brachiopodi, 3 - amoniti, 4 – plakodermi) a famen/tournai (amoniti, plakodermi) (Thomas, 2013)


Otázky ?

Vulkanismus



Oblast řeky Viluj – Sibiř, plošný vulkanismus, sv. devon

Viljuj




**Interpretace globální situace ve svrchním devonu
(Zonenshein et al., 1988) a pozice viljujských trapů**


Impakty



vápence porušené impaktem




Alamo impakt (Nevada), 367 Ma



kalcitické sféruly

Flynn Creek Impact Crater, Tennessee



~3.8 km D., exposed, eroded
360 (±20) MYO, complex crater
36° 17' N. Lat., 85° 40' W. Long.; Jackson County, Tennessee, USA
Data from: PASSC Database, Wikipedia, Google Earth.







bolid, průměr cca 200m

Stáří a parametry kráterů Austrálie



Woodleigh Crater, Z. Austrálie, 364± 8 Ma, bolid 5-6 km prům., kráter 60 km





Siljan, str. Švédsko, 376 ± 1.6. Ma, prům. ~ 50 km, spojen s Kellwasser Event




**Taihu, vých. Čína,
nově zpochyňován impaktový původ !!!**




Stratigrafická pozice různých dokladů bolidů (impakty) okolo hranice devon/karbon (Hallam et Wignall, 1997), dnes další impakty


		Reported Ir anomalies	Possible impact craters	Other impact evidence	
karbon	TOURN.	<i>duplicata</i>		microspherules (China)	
		<i>sulcata</i>			
devon	FAMENNIAN	<i>praesulcata</i>	China	microspherules (China)	
				
		<i>crepida</i>	Australia, China	* Taihu Lake (China)	microspherules (China)
		<i>triangularis</i>	Belgium	* Siljan Ring (Sweden)	microspherules? (Belgium)
			China?		
	FRASNIAN	<i>linguiformis</i>			
		<i>gigas</i>			
		<i>asymmetricus</i>			
		<i>punctata</i>	USA		shocked quartz and Alamo breccia (USA)

Černé hangenbergské břidlice (anoxie), v nejvyšším devonu a na bázi karbonu Rýnského břidličného pohoří (Německo)







Souhrn nejvyšší devon



Diversita podle Sepkoskiho (1997)



Současná křivka diverzity podle Paleobiology Database



Nejnovější křivka diverzity podle PBDB (2012) s použitím nové metody pro korekci nerovnoměrného vzorkování – pro kenozoikum (žlutá barva) je shodná s ad A)

Vymírání koncem devonu:

Datace: ~360 Ma (ve stupních frasn a famen),

Ráz: dlouhotrvající krize, řada postupných redukcí diverzity četných skupin během cca 13 milionů let. Profily kolem hranice frasn/famen jsou velmi dobře známé a stratifikované (konodontová fauna). Závěr krize ~ 300.000 let.

Třetí nejsilnější event (za P/T a sv. Or):- mizí 86 % amonitů, brachiopodů, trilobitů
- zastavil se růst útesů

- Doklady:**
- na hranici Fr/Fa exkurze křivky delta C13, pokles prudký vzrůst delta S34,
 - ukládání černých břidlic => anoxie na dně moří + nízký obsah O₂ v prostředí, anoxie je vázána na eustaticky nízkou hladinu oceánu,
 - k hranici Fr/Fa se vztahují i krátery (Švédsko, Quebec, Austrálie) = impakty, pro které svědčí i mikrotektity v Belgii, v Číně a Austrálii + iridiové anomálie
 - Viljujské efuse

Toto vymírání – v podmínkách vysoké teploty s prudkým ochlazením v H a K (viz vysoká úroveň delta O18)

Závěr: Postupné vymírání vlivem stavu planety (přehřátí + anoxie),
terestrické příčiny doplněné impaktem 1 – 2 bolidů,
silný vliv především na mořské bezobratlé (zvláště útesotvorné)



Použité prameny:

- Benton, M.J., 1997: Vertebrate Palaeontology. – Chapman & Hall, pp.452. London.
- Courtillot, V. , 1999: Evolutionary Catastrophes, The Science of Mass Extinction. – Cambridge University Presss, pp.173, Cambridge (UK).
- Gould J.S. (ed.), 1998: Dějiny planety Země. – Knižní klub, Columbus, pp. 256, Praha.
- Hallam, A., Wignall, P.B., 1997: Mass Exctinctions and their Aftermath. – Oxford Univ. Press, pp. 320. Oxford.
- Kalvoda, J., Bábek, O., Brzobohatý, R., 1998: Historická geologie. – UP Olomouc, pp. 199. Olomouc.
- Lovelock, J., 1994: Gaia, živoucí planeta. – MF, MŽP ČR, Kolumbus 129, pp. 221. Praha.
- Margulisová, L., 2004: Symbiotická planeta, nový pohled na evoluci. – Academia, pp. 150. Praha.
- Paturi, F. X., 1995: Kronika Země. - Fortuna Print, pp. 576. Praha.
- Pálfy, J., 2005: Katastrophen der Erdgeschichte – globales Aussterben ? – Schweizerbart. Ver. (Nägele u. Obermiller), pp. 245, Stuttgart.
- Pokorný, V. a kol., 1992: Všeobecná paleontologie. – UK Praha, pp. 296. Praha.
- Raup, D.M., 1995: O zániku druhů. – Nakl. LN, pp.187. Praha.

Internet – různé databáze (především obrazová dokumentace)