

Jméno:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Celkem	11	12

Vstupní písemka ze semináře z matematiky II, únor 2017

Max. počet bodů 40

- 1a. Napište definici lineární nezávislosti vektorů v_1, v_2, \dots, v_k ve vektorovém prostoru V . (1 bod)
- 1b. Mějme lineární zobrazení $\varphi : U \rightarrow U$ a vektory $u_1, u_2, \dots, u_k \in U$. Dokažte: Jsou-li vektory $\varphi(u_1), \varphi(u_2), \dots, \varphi(u_k)$ lineárně nezávislé, jsou lineárně nezávislé i vektory u_1, u_2, \dots, u_k . (3 body)
- 2a. Napište definici lineárního zobrazení mezi dvěma vektorovými prostory. (1 bod)
- 2b. Napište jak vypadají všechna lineární zobrazení z \mathbb{R}^n do \mathbb{R}^k . (3 body)
- 3a. Napište definici jádra lineárního zobrazení a definici podprostoru ve vektorovém prostoru. (2 body)
- 3b. Dokažte: Jádro $\ker \varphi$ lineárního zobrazení $\varphi : U \rightarrow V$ je vektorový podprostor ve V . (2 body)
4. Dokažte: Lineárního zobrazení $\varphi : U \rightarrow V$ je prosté, právě když jeho jádro $\ker \varphi$ obsahuje pouze nulový vektor. (4 body)
- 5a. Napište definici lineárního obalu vektorů u_1, u_2, \dots, u_k ve vektorovém prostoru U . (1 bod)
- 5b. Z definice lineárního obalu dokažte rovnost $[u_1, u_2, u_3] = [u_1, u_2 - u_1, u_1 + u_2 + 2u_3]$. (3 body)
- 6a. Napište definici suprema množiny $M \subseteq \mathbb{R}$. (2 body)
- 6b. Se všemi potřebnými předpoklady zformulujte základní větu, která o supremu platí. (2 body)
- 7a. Napište definici limity posloupnosti reálných čísel. (1 bod)
- 7b. Pomocí věty o supremu z předchozí úlohy dokažte: Každá rostoucí posloupnost záporných reálných čísel má limitu. (3 body)
- 8a. Napište definici limity reálné funkce f v bodě $a \in \mathbb{R}$. (1 bod)
- 8b. Z definice limity dokažte:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x),$$

pokud limity vpravo existují. (3 body)

- 9a. Pomocí kvantifikátorů napište negaci definice

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

(1 bod)

- 9b. Dokažte z definice limity (resp. z předchozí úlohy), že limita v bodě 2 funkce $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takové, že $f(x) = 0$ pro x iracionální a $f(x) = 1$ pro x racionální, není rovna 0. (3 body)

- 10a. Napište definici spojitosti reálné funkce v bodě $a \in \mathbb{R}$. (1 bod)

- 10b. Dokažte z definice spojitosti: Jestliže jsou dvě funkce f a g spojité v bodě $a \in \mathbb{R}$, pak je v tomto bodě spojitý i jejich součin. (3 bod)

Pro ty, kteří už mají všechno hotovo

11. Nechť U je vektorový prostor a $\varphi : U \rightarrow U$ lineární zobrazení takové, že $\varphi \circ \varphi = \varphi$. Pak prostor U lze zapsat jako direktní součet dvou podprostorů, které souvisejí s φ . Napište a dokažte. (4 body)

12. Nechť $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je rostoucí funkce. Co netriviálního můžete říci o množině bodů nespojitosti této funkce? Své tvrzení dokažte. (4 body)