



## Zadání příkladů – Statistická inference II – 2017



**Příklad 12. nezávislost  $\mu$  a  $\sigma^2$ ; pravděpodobnost pokrytí** Necht'  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , kde  $\mu = 20$  a  $\sigma^2 = 100$ . Pomocí simulační studie vypočítejte Pearsonův korelační koeficient  $r_{\bar{x}, s}$ . Nakreslete šedou barvou rozptylový graf  $(\bar{x}_m, s_m)$ , kde  $m = 1, 2, \dots, M$ , přičemž  $M = 5000$ . Černou barvou vyznačte v grafu takové body  $(\bar{x}_m, s_m)$ , pro které platí  $t_{W,m} = \left| \frac{\bar{x}_m - \mu}{s_m} \sqrt{n} \right| < t_{n-1}(\alpha/2)$ . Dále vykreslete hranice, které jsou definovány body  $(\bar{x}_m, s_m)$ , jež splňují vztah  $t_{W,m} = t_{n-1}(\alpha/2)$ . Vypočítejte pravděpodobnost pokrytí 95% DIS pro  $\mu$  jako podíl  $\sum_m I(t_{W,m} < t_{n-1}(\alpha/2))/M$ . Zvolte (a)  $n = 5$ , (b)  $n = 50$  a (c)  $n = 100$ .

Simulaci proveďte také za předpokladu, že data pochází ze smíšeného rozdělení  $X \sim [pN(\mu, \sigma_1^2) + (1-p)N(\mu, \sigma_2^2)]$ , kde  $p = 0.9$ ,  $\mu = 20$ ,  $\sigma_1^2 = 100$  a  $\sigma_2^2 = 400$ .



```
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.946
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.950
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.95
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.95
```



```
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.958
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.950
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.9525
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.9500
```



```
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.961
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.950
##                                     n
## aktualni pst.pokryti                0.946
## nominalni pst.pokryti (spolehlivost) 0.950
```



### Příklad 13. konvergence $\rho$ a $\xi$ k normálnímu rozdělení

1. Proveďte simulaci pseudonáhodných čísel z  $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ , kde  $\mu_1 = 0$ ,  $\mu_2 = 0$ ,  $\sigma_1 = 1$ ,  $\sigma_2 = 1$ ,  $M = 10\,000$ ,  $\rho = 0.8$ .

Pro každé  $m = 1, 2, \dots, M$ , vypočítejte realizaci výběrového korelačního koeficientu  $r_m$  a Fisherovy  $Z$ -proměnné  $z_{R,m}$ . Zobrazte histogramy simulovaných  $r_m$  a  $z_{R,m}$  a superponujte je teoretickými hustotami příslušných normálních rozdělení. Vytvořte animaci zobrazující rozdělení výběrového korelačního koeficientu  $R$  a Fisherovy  $Z$  transformace pro různé rozsahy náhodného výběru  $n \in \{5, 10, \dots, 70\}$ .

2. Vytvořte animaci zobrazující rozdělení výběrového korelačního koeficientu  $R \in \{0.1, 0.2, \dots, 0.9\}$  a Fisherovy  $Z$  transformace pro tyto různé korelační koeficienty. Animace vytvořte pro (a)  $n = 5$ , (b)  $n = 10$ , (c)  $n = 100$ .




**Příklad 14. Test o korelačním koeficientu  $\rho$ :** Mějme data `one-sample-correlation-skull-mf.txt` a proměnné největší výška mozkovny `skull.pH` a morfologická výška tváře `face.H` (obě v mm) starověké egyptské mužské populace, o kterých předpokládáme, že mají dvourozměrné normální rozdělení  $N_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ .

- Otestujte hypotézu o tom, že korelační koeficient největší výšky mozkovny a morfologické výšky tváře je rovný 0.251.
- Vypočítejte  $100 \times (1 - \alpha)\%$  empirický DIS pro korelační koeficient, kde koeficient spolehlivosti  $1 - \alpha = 0.95$ .

Použijte

- Waldovu testovací statistiku  $Z_W$ ;
- testovací statistiku poměrem věrohodnosti  $U_{LR}$ .



|                       | test.statistika | W                                              | kritický obor          | $p$ -hodnota |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Waldův přístup        | 1.104799        | $(-\infty, -1.959964) \cup (1.959964; \infty)$ | (0.1868617, 0.4605561) | 0.2692467    |
| Věrohodnostní přístup | 1.241757        | $\langle 3.841459; \infty)$                    | (0.1880626, 0.4590998) | 0.2651328    |

**Příklad 15. Rozdělení testovacích statistik  $F$ ,  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$  jednovýběrového testu o rozptylu  $\sigma^2$**   
Pomocí simulační studie ověřte, že

- statistika  $F = \frac{nS_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_n^2$
- statistika  $U_w = \frac{n}{2} \left( \frac{n}{F_{obs}} - 1 \right)^2 \sim \chi^2(1)$
- statistika  $U_S = \frac{n}{2} \left( \frac{F_{obs}}{n} - 1 \right)^2 \sim \chi^2(1)$
- statistika  $U_{LR} = F_{obs} - n \left( 1 + \ln \left( \frac{F_{obs}}{n} \right) \right) \sim \chi^2(1)$
- Vygenerujte  $M = 1000$  pseudonáhodných výběrů o rozsahu  $n = 5$ . Pro každý náhodný výběr vypočítejte hodnoty realizací testovacích statistik  $F$ ,  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$ . Vytvořte histogramy těchto testovacích statistik a superponujte je křivkami příslušného rozdělení.
- Vytvořte animaci, pomocí které bude zřejmé, jak se s rostoucím  $n$  rozdělení testovacích statistik  $F$ ,  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$  asymptoticky blíží k příslušnému rozdělení. Animaci spravte pro měnící se  $n \in \{3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000\}$

### Příklad 16. Pokračování příkladu 15

- Vygenerujte  $M = 1000$  pseudonáhodných výběrů o rozsahu  $n = 5$ . Pro každý náhodný výběr stanovte hodnoty realizací testovacích statistik  $F$ ,  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$ . Pomocí funkce `density()` vypočítejte jádrové odhady rozdělení testovacích statistik  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$ . Tyto jádrové odhady zobrazte do jednoho grafu a barevně je odlište. Do grafu dokreslete křivku hustoty  $\chi^2$  rozdělení o jednom stupni volnosti a vertikální referenční čaru v hodnotě 0.
- Vytvořte animaci, pomocí které bude zřejmé, jak se s rostoucím  $n$  rozdělení testovacích statistik  $U_W$ ,  $U_S$  a  $U_{LR}$  asymptoticky blíží k  $\chi^2(1)$  rozdělení. Animaci spravte pro měnící se  $n \in \{3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000\}$

### Příklad 17. Pravděpodobnost pokrytí – 1. část

1. Nechť  $X \sim \text{Bin}(N, p)$ , kde  $N = 30$  a  $p = 0.8$  a pravděpodobnost úspěchu  $\hat{p} = \frac{24}{30} = 0.8$ , kde  $x = 24$  a  $N = 30$ . Waldův 95% empirický DIS pro  $p$  je rovný  $(d, h) = (0.657, 0.943)$ . Vypočítejte pravděpodobnost pokrytí tohoto intervalu.

*Poznámka:* Pravděpodobnost pokrytí Waldova 95% DIS pro  $p$  vypočítáme následovně:

$$\Pr(\text{pokrytí}) = \sum_j \Pr(X = Np_j : p \in \text{Waldovu 95\% DIS pro } p_j),$$

kde  $p_j \in \mathcal{M}_J = \{\frac{1}{30}, \frac{2}{30}, \dots, 1 - \frac{1}{30}\}$ , t.j. jde o součet takových funkčních hodnot pravděpodobnostní funkce v bodech  $Np_j$ , kde  $p \in \text{Waldovu 95\% DIS pro } p_j$ . Výsledky uspořádejte do tabulky, jejíž sloupce budou  $x_j$ ,  $p_j$ ,  $d_j$  (dolní hranice Waldova 95% DIS pro  $p_j$ ),  $h_j$  (horní hranice Waldova 95% DIS pro  $p_j$ ),  $\Pr(\text{pokrytí})$  a *pokrytí* (indikace toho, zda  $p$  náleží nebo nenáleží do Waldova 95% DIS pro  $p_j$ ).

2. Celý postup opakujte tentokrát pro parametr  $p = 0.79$ . Pozorujte, jak se změnila pravděpodobnost pokrytí.

| 1  | xj | pj     | dj      | hj     | P(pokryti) | pokryti |
|----|----|--------|---------|--------|------------|---------|
| 2  | 0  | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       |
| 3  | 1  | 0.0333 | -0.0309 | 0.0976 | 0          | 0       |
| 4  | 2  | 0.0667 | -0.0226 | 0.1559 | 0          | 0       |
| 5  | 3  | 0.1    | -0.0074 | 0.2074 | 0          | 0       |
| 6  | 4  | 0.1333 | 0.0117  | 0.255  | 0          | 0       |
| 7  | 5  | 0.1667 | 0.0333  | 0.3    | 0          | 0       |
| 8  | 6  | 0.2    | 0.0569  | 0.3431 | 0          | 0       |
| 9  | 7  | 0.2333 | 0.082   | 0.3847 | 0          | 0       |
| 10 | 8  | 0.2667 | 0.1084  | 0.4249 | 0          | 0       |
| 11 | 9  | 0.3    | 0.136   | 0.464  | 0          | 0       |
| 12 | 10 | 0.3333 | 0.1646  | 0.502  | 0          | 0       |
| 13 | 11 | 0.3667 | 0.1942  | 0.5391 | 0          | 0       |
| 14 | 12 | 0.4    | 0.2247  | 0.5753 | 0          | 0       |
| 15 | 13 | 0.4333 | 0.256   | 0.6107 | 0          | 0       |
| 16 | 14 | 0.4667 | 0.2881  | 0.6452 | 0          | 0       |
| 17 | 15 | 0.5    | 0.3211  | 0.6789 | 2e-04      | 0       |
| 18 | 16 | 0.5333 | 0.3548  | 0.7119 | 7e-04      | 0       |
| 19 | 17 | 0.5667 | 0.3893  | 0.744  | 0.0022     | 0       |
| 20 | 18 | 0.6    | 0.4247  | 0.7753 | 0.0064     | 0       |
| 21 | 19 | 0.6333 | 0.4609  | 0.8058 | 0.0161     | 1       |
| 22 | 20 | 0.6667 | 0.498   | 0.8354 | 0.0355     | 1       |
| 23 | 21 | 0.7    | 0.536   | 0.864  | 0.0676     | 1       |
| 24 | 22 | 0.7333 | 0.5751  | 0.8916 | 0.1106     | 1       |
| 25 | 23 | 0.7667 | 0.6153  | 0.918  | 0.1538     | 1       |
| 26 | 24 | 0.8    | 0.6569  | 0.9431 | 0.1795     | 1       |
| 27 | 25 | 0.8333 | 0.7     | 0.9667 | 0.1723     | 1       |
| 28 | 26 | 0.8667 | 0.745   | 0.9883 | 0.1325     | 1       |
| 29 | 27 | 0.9    | 0.7926  | 1.0074 | 0.0785     | 1       |
| 30 | 28 | 0.9333 | 0.8441  | 1.0226 | 0.0337     | 0       |
| 31 | 29 | 0.9667 | 0.9024  | 1.0309 | 0.0093     | 0       |
| 32 | 30 | 1      | 1       | 1      | 0.0012     | 0       |

Tabulka 1: Contingency table of absolute frequencies – Womac



|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
|             | p=0.8  | p=0.79 |
| pst.pokrytí | 0.9463 | 0.8876 |

Tabulka 2: Contingency table of absolute frequencies – Womac

**Příklad 18. Pravděpodobnost pokrytí – 2. část** Nechť  $X_i \sim \text{Bin}(N, p_i)$ . Vypočítejte pravděpodobnosti pokrytí

1. Waldova 95 % DIS,
2. skóre 95 % DIS,
3. věrohodnostního 95 % DIS

pro každé  $p_i$ , kde  $p_i$  náležící množině  $\mathcal{M}_I = \langle \frac{1}{N}, 1 - \frac{1}{N} \rangle$  jsou ekvidistantně vzdálené hodnoty ležící mezi  $\frac{1}{N}$  a  $1 - \frac{1}{N}$  a jejich počet je  $M = 1000$ . Nakreslete obrázek, kde na ose  $x$  budou  $p_i$  a na ose  $y$  bude pravděpodobnost pokrytí  $\text{Pr}_i(\text{pokrytí})$ . Zvolte (a)  $N = 30$ , (b)  $N = 100$  a (c)  $N = 1000$ .

*Poznámka:* Pravděpodobnosti pokrytí 95 % DIS pro  $p_i$  vypočítáme následovně

$$\text{Pr}_i(\text{pokrytí}) = \sum_j \Pr(X = Np_j : p_i \in 95\% \text{ DIS pro } p_j),$$

kde  $p_j \in \mathcal{M}_J = \{\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \dots, 1 - \frac{1}{N}\}$ , t.j. jde o součet takových funkčních hodnot pravděpodobnostní funkce v bodech  $Np_j$ , kde  $p_i \in 95\% \text{ DIS pro } p_j$ . Pro ty DIS, které mají pro  $p = 0$  a  $p = 1$  nenulovou šířku, můžeme použít  $\mathcal{M}_I = \langle \frac{0}{N}, \frac{N}{N} \rangle$

