

## Stavba živočišné buňky

J. Vondráček

## Náplň předmětu

- ▶ STAVBA ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY (základní přehled strukturních prvků živočišných buněk; variabilita živočišných buněk; přehled specializovaných buněčných organel živočišných buněk významných z pohledu fyziologických regulací – lysozomy, peroxizomy) – **J. Vondráček**

## Náplň předmětu

- ▶ BUNĚČNÉ JÁDRO A JEHO DYNAMIKA (opakování - přehled struktury buněčného jádra a chromatinu; komunikace mezi složkami buněčného jádra a ostatními buněčnými organelami; variabilita buněčného jádra v živočišných buňkách) – **J. Vondráček**


## Náplň předmětu

- ▶ ŽIVOTNÍ CYKLUS PROTEINŮ (základní principy životního cyklu proteinů a mechanismů regulujících dynamiku těchto procesů; post-translační modifikace proteinů; procesy syntézy, transportu a degradace proteinů) – *J. Vondráček*

## Náplň předmětu

- ▶ BUNĚČNÝ METABOLISMUS (základní dráhy energetického metabolismu buňky a dynamická podstata jejich regulací – glykolýza, citrátový cyklus a oxidativní fosforylace, pentózový cyklus, glukoneogeneze, syntéza a degradace glykogenu, syntéza a degradace mastných kyselin v kontextu živočišné buňky; mitochondriální metabolismus a jeho regulace na úrovni buňky a mitochondrií; struktura a dynamika mitochondrií) – **J. Vondráček**


# Architektura živočišné buňky



*Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 5th ed., New York, Garland Science, 2008*

## Množství buněk v těle


- lidské tělo – cca  $3,7 \pm 0,8 \times 10^{13}$  buněk (plus podobné množství bakterií) – zahrnují cca 200 různých buněčných typů;
- liší se svojí velikostí i v rámci uniformní buněčné populace;



distribuce velikostí buněk L1210 (myší lymfoblastom)

*Milo et al., Cell Biology by the Numbers, New York, Garland Science, 2016*

## Základní architektura – různé velikosti a tvary



| cell type           | average volume ( $\mu\text{m}^3$ ) | BNID           |
|---------------------|------------------------------------|----------------|
| sperm cell          | 30                                 | 109891, 109892 |
| red blood cell      | 100                                | 107600         |
| lymphocyte          | 130                                | 111439         |
| neutrophil          | 300                                | 108241         |
| beta cell           | 1,000                              | 109227         |
| enterocyte          | 1,400                              | 111216         |
| fibroblast          | 2,000                              | 108244         |
| HeLa, cervix        | 3,000                              | 103725, 105879 |
| hair cell (ear)     | 4,000                              | 108242         |
| osteoblast          | 4,000                              | 108088         |
| alveolar macrophage | 5,000                              | 103566         |
| cardiomyocyte       | 15,000                             | 108243         |
| megakaryocyte       | 30,000                             | 110129         |
| fat cell            | 600,000                            | 107668         |
| oocyte              | 4,000,000                          | 101664         |

Milo et al., *Cell Biology by the Numbers*, New York, Garland Science, 2016

(A) prvok Giardia lamblia, (B) rostlinná buňka, (C) pučící kvasinka, (D) červená krvinka, (E) fibroblast, (F) nervová buňka (G), tyčinka (sítnice)




## Velikosti buněčných organel

- pro stanovení velikosti organel není důležitý jen jejich objem, ale také jejich povrch

| intracellular compartment                | percentage of total cell volume |
|--|---------------------------------|
| cytosol                                  | 50–60                           |
| mitochondria                             | 20                              |
| rough ER cisternae                       | 10                              |
| smooth ER cisternae plus Golgi cisternae | 6                               |
| nucleus                                  | 6                               |
| peroxisomes                              | 1                               |
| lysosomes                                | 1                               |
| endosomes                                | 1                               |


*Milo et al., Cell Biology by the Numbers, New York, Garland Science, 2016*



| membrane type      | percentage of total cell membrane |                          |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                    | liver hepatocyte                  | pancreatic exocrine cell |
| plasma             | 2                                 | 5                        |
| rough ER           | 35                                | 60                       |
| smooth ER          | 16                                | <1                       |
| Golgi apparatus    | 7                                 | 10                       |
| mitochondria outer | 7                                 | 4                        |
| mitochondria inner | 32                                | 17                       |
| nucleus inner      | 0.2                               | 0.7                      |
| secretory vesicle  | -                                 | 3                        |
| lysosome           | 0.4                               | -                        |
| peroxisome         | 0.4                               | -                        |
| endosome           | 0.4                               | -                        |

## Velikost, tvar a množství buněčných organel

- se dynamicky mění během buněčného cyklu a dělení




*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.*

*Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

## Velikost, tvar a množství buněčných organel

- ▶ se dynamicky mění během buněčného cyklu a dělení





dynamika změn endoplazmatického retikula v průběhu dělení

*Milo et al., Cell Biology by the Numbers, New York, Garland Science, 2016*

## Velikost, tvar a množství buněčných organel

- ▶ se dynamicky mění vlivem vnějšího prostředí (např. parciální tlak  $O_2$ , množství živin), onemocnění, ve speciálních typech buněk apod. – např. kompaktní vs. retikulární (vláknité) mitochondrie:



část dendritu nervové buňky potkana

*Milo et al., Cell Biology by the Numbers,  
New York, Garland Science, 2016*


*J. Comp. Neurology, 2005, 492:50 – 65*

## Membrány oddělují buněčné kompartmenty s různými funkcemi....

- ▶ membrány uvnitř buňky mají dvojitý význam – 1) jsou nezbytné pro aktivitu řady proteinů, které jsou na ně navázané a díky své velké ploše umožňují průběh řady biochemických reakcí, a 2) zároveň vytvářejí uzavřené kompartmenty oddělené od cytosolu, ve kterých mohou být zachovány specifické podmínky pro optimalizaci biochemických reakcí (zakoncentrování proteinů, iontů a reaktantů);
- ▶ jednotlivé organely obsahují transportní systémy pro import a export metabolitů, i pro transport a inkorporaci proteinů unikátních pro danou organelu;
- ▶ za oddělené kompartmenty jsou považovány: jádro, cytosol, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, lysozomy, endozomy a peroxizomy



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.*

*Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*



## ...ale buněčné organely vytvářejí funkční celek!

- ▶ protože membrány oddělují cytosol a organely (i vzájemně), existují mechanismy umožňující transport proteinů přes membrány – vezikulární transport (mezi topologicky ekvivalentními kompartmenty), translokace proteinů (např. do mitochondrií a ER) a tzv. „gated“ transport (RNA, proteinů přes jaderné póry)




*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.*

*Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

## Endoplazmatické retikulum (ER)

- ▶ je přítomné ve všech eukaryotických buňkách, kde vytváří síť vzájemně propojených cisteren a válců; vnitřní prostor (kompartiment) ER je zároveň napojen na jadernou membránu (je tedy propojen s prostorem mezi vnitřní a vnější jadernou membránou);
- ▶ ER hraje zásadní roli zejména v syntéze lipidů a proteinů, a zároveň slouží jako skladovací prostor pro ionty  $\text{Ca}^{2+}$  (využívané pro vnitrobuněčnou signalizaci);
- ▶ v ER vznikají všechny transmembránové proteiny a lipidy pro většinu buň. organel – ER, Golgiho aparát, lysozomy, endozomy, sekreční vezikuly a plazmatickou membránu;
- ▶ vzniká v něm také většina lipidů pro mitochondrie a peroxizomy;
- ▶ je do něj transportována většina exkretovaných proteinů (+ ty, které jsou určeny pro ER, Golgiho aparát a lysozomy);

*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.  
New York: Garland Science; 2002.*





## Endoplazmatické retikulum (ER)

- ▶ základní funkce ER jsou podobné ve většině buněk, avšak v rámci ER rozlišujeme specializované oblasti plnící rozdílné funkce:
  - **drsňé ER** s navázanými ribozómy – většinou ještě před dokončením translace dochází k translokaci proteinu do ER (ko-translační proces);
  - oblasti ER bez ribozómů – **hladké ER** – jeho podíl závisí na typu buněk;
  - **přechodné (transitional) ER** – tvorba vezikulí transportujících proteiny a lipidy do Golgiho aparátu



## Drsné ER

- cytosolové ribozómy vs. ribozómy navázané na ER




drsné ER v exokrinní buňce pankreatu a polyribozómy připojené k ER

*Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*


## Hladké ER

- ▶ je abundantní ve specializovaných buněčných typech – např. v buňkách, kde probíhá intenzivní metabolismus lipidů (např. syntéza steroidů), v hepatocytech – tvorba lipoproteinů, detoxifikační reakce – na membráně ER jsou lokalizovány biotransformační enzymy, jako cytochromy P450;



(A)

Leydigova buňka ve varlatech tvořící testosteron




(B)

ER v hepatocytu

## ER a skladování $\text{Ca}^{2+}$


- rychlé uvolňování iontů  $\text{Ca}^{2+}$  z ER hraje významnou roli v rychlé odpovědi buněk na extracelulární signály – vápníkové ionty jsou skladovány ve specializovaných oblastech ER;
- svalové buňky obsahují specializovaný typ ER – sarkoplazmatické retikulum



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

## Golgiho aparát (GA)

- systém cisteren a váčků zodpovědný za syntézu sacharidů (např. glykosaminoglykany pro extracelulární matrix), sorting a transport proteinů (včetně některých typů post-translačních modifikací, zejména glykosylace);





rekonstrukce GA – cis strana je část GA nejbližší ER

*Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

## Golgiho aparát (GA)


- cisterny GA jsou uspořádané do funkčně odlišných vrstev (obvykle 4 – 6, výjimkou jsou někteří prvoci – až 20) – ty jsou propojené kanálky (tubules);
- v živočišné buňce je obvykle GA blízko buněčného jádra a centrozómu;
- během průchodu GA prochází transportované molekuly (proteiny) sérií kovalentních modifikací – vstupují přes *cis* Golgi síť a z *trans* Golgi sítě jsou odesílány dále;
- mezi důležité procesy patří především glykosylace proteinů, tvorba proteoglykanů, apod.



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

## Golgiho aparát (GA)


- GA hraje zásadní roli také v exocytóze –transportu materiálu ven z buňky;
- konstitutivní (ve všech buňkách) vs. regulovaná sekreční dráha (hormony, neurotransmitery, enzymy – ve specializovaných buňkách) – v ní jsou nejprve produkováné látky uloženy v sekrečních vezikulích, které jsou uvolněny na základě signálu;



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.  
Alberts B, Johnson A,  
Lewis J, et al.  
New York: Garland  
Science; 2002.*

## Lysozómy



- *trans* Golgi síť – sorting proteinů – transport do konečné destinace; jednou z významných destinací jsou **lysozómy**;
- lysozómy představují buněčné organely ohraničené jednoduchou membránou, obsahující rozpustné hydrolytické enzymy schopné degradovat makromolekuly;
- jsou to **kyselé hydrolázy** – buňky jsou proti jejich působení chráněny jednak membránou lysozomu, jednak tím, že i v případě úniku nejsou tyto enzymy při normálním pH aktivní;
- složení lysozomální membrány je unikátní – obsahuje vysoce glykosylované proteiny – chráněny před působením proteáz, a transportní proteiny přenášející finální produkty (aminokyseliny, cukry a nukleotidy) do cytosolu;



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.  
 Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.  
 New York: Garland Science; 2002.*

## Lysozómy

- ▶ lysozómy představují velmi heterogenní skupinu organel – liší se tvarem i velikostí – identifikovány pomocí specifických protilátek či na základě přítomnosti specifických enzymatických aktivit;
- ▶ heterogenita je dána různými funkcemi, které plní (odbourávání debris, destrukce fagocytovaných mikroorganismů, tvorba živin pro buňku) i důsledkem jejich vzniku;



200 nm


- ▶ fúzováním s pozdními endozómy dochází ke vzniku endolysozomu, z něž po rozkladu většiny pohlceného materiálu opět vzniká lysozóm – proces maturace lysozómů (cyklus);
- ▶ u některých typů buněk může probíhat i lysozomální exkrece (např. melanocyty takto uvolňují pigmenty z tzv. melanozómů); tvorba exozómů?

*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.  
New York: Garland Science; 2002.*



## Lysozomy


- materiál pro degradaci je do lysozómů „dopravován“ několika způsoby:
  - **endocytóza** (příjem extracelulárních makromolekul)
  - **fagocytóza** (specializované buňky – neutrofil, makrofág – velké částice, mikroorganismy)
  - **makropinocytóza** – nespecifický příjem tekutin, částí membrány či částic spojených s membránou
  - **autofagie** – degradace proteinů a organel přímo z cytoplazmy



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. New York: Garland Science; 2002.*

# Lysozómy


- ▶ pro funkci lysozómů je klíčová doprava lysozomálních hydroláz z trans Golgi sítě do lysozómů (prostřednictvím endozómů);
- ▶ poruchy – lysozomální onemocnění (lysosomal storage disease – cca 70) – skupina vzácných dědičných metabolických poruch – akumulace nerozložených substrátů v lysozómech; nejzávažnější je I-cell disease – v důsledku absence téměř všech hydrolytických enzymů;



*Molecular Biology of the Cell. 4th edition.  
Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.  
New York: Garland Science; 2002.*


## Propojení ER, GA a lysozómů

- ▶ přímé – prostřednictvím vezikulárního transportu i přímým propojením membrán;
- ▶ zároveň ale jeden kompartment může být zdrojem pro vznik dalších organel, nebo napomáhat při jejich proliferaci – např. ER může být zdrojem peroxizómů, nebo se podílet na proliferaci dalších organel (např. mitochondrií);



## Mikrotělíška - peroxizómy



- ▶ velmi malé organely ohraničené pouze jednou membránou; neobsahují DNA ani ribozómy (na rozdíl od mitochondrií);
- ▶ mají velmi různorodé složení enzymů – souvisí s plněním různých funkcí v různých typech buněk
- ▶ nemají výrazné strukturní rysy, ale (zejména v játrech některých živočichů ) mohou obsahovat tzv. nukleoid – enzym urikázu (přeměna kys. močové na alantoin)



*The Cell. Fawcett D.W.  
Philadelphia: W. B. Saunders Company; 1981*

## Úloha peroxizómů v buněčném metabolismu

- ▶ peroxizómy obsahují enzymy, které využívají kyslík k odebrání atomů vodíku za současné tvorby  $\text{H}_2\text{O}_2$ ;  
$$\text{RH}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{R} + \text{H}_2\text{O}_2$$
- ▶ díky tomu obsahují také velké množství katalázy – enzymu, který umožňuje účinné odstraňování  $\text{H}_2\text{O}_2$  – buď za spotřeby dvou molekul peroxidu, nebo katalyzováním reakce s dalšími substráty – kys. mravenčí, formaldehyd, etanol apod. (zejména v játrech a ledvinách);




- ▶ hlavní funkce peroxizómů – katabolismus mastných kyselin – beta oxidace mastných kyselin za tvorby acetyl CoA (u živočichů tato reakce probíhá také v mitochondriích);

## Úloha peroxizómů v buněčném metabolismu

► vedle  $\beta$ -oxidace probíhají v peroxizómech také další důležité reakce:

- syntéza fosfolipidu plazmalogenu – zásadní pro tvorbu myelinu a tedy pro izolaci neuronových vláken;




- anabolické funkce – syntéza žlučových kyselin, kys. dokosaheptaenová (DHA);

- tvorba a odbourávání kyslíkových radikálů – redoxní metabolismus;

# Úloha peroxizómů v buněčném metabolismu

➔ Hlavní metabolické dráhy v peroxizómech



H.R. Waterham et al. BBA 2016, 1863: 922–933

The main enzymes involved in the peroxisomal fatty acid beta-oxidation pathway are indicated in light orange. The peroxisomal fatty acid beta-oxidation pathway can handle different substrates (indicated by distinct colors), including very long chain fatty acids (sVLCFA, unVLCFA (green)), dicarboxylic acids (DCA (blue)), the bile intermediates DHCA and THCA (dark red), and pristanic acid (magenta), which are imported into peroxisomes by the different ABCD transporters as indicated. The peroxisomal enzymes involved in alpha-oxidation of phytanic acid (purple) are indicated in yellow. The peroxisomal enzymes involved in plasmalogen synthesis (black) are indicated in purple. The peroxisomal enzymes involved in bile acid synthesis (dark red) are indicated in bright and light orange. The peroxisomal enzyme involved in glyoxylate detoxification (brown) is indicated in red and catalase required for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> degradation in green. Abbreviations: ACAA1= 3-ketoacyl-CoA thiolase, ACOX1=Acyl-CoA oxidase 1, ACOX2=acyl-CoA oxidase 2, ABCD1=ABC transporter D1, ABCD2=ABC transporter D2, ABCD3=ABC transporter D3, AGPS=alkyl-dihydroxyacetonephosphate synthase, AGT = alanine-glyoxylate aminotransferase, AMACR = 2-methylacyl-CoA racemase, BAAT = bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase, brAcyl= branched-acyl, CA= cholic acid, CAT = catalase, CDCA= chenodeoxycholic acid, DBP = D-bifunctional protein, DCA = dicarboxylic acids, DHAP= dihydroxyacetone phosphate, DHCA=dihydroxycholestanic acid, GNPAT=dihydroxyacetone acyltransferase, HALCL1=2-hydroxyphytanoyl-CoA lyase, LBP=L-bifunctional protein, PHYH=phytanoyl-CoA 2-hydroxylase, PrDH=pristanal dehydrogenase, SCPx=SCPx, sVLCFA=saturated very long chain fatty acids, THCA=trihydroxycholestanic acid, unVLCFA = unsaturated very long chain fatty acids.


## Původ a tvorba peroxizómů

- ▶ otázka původu a vzniku peroxizómů není dosud zodpovězena zcela přesvědčivě;
- ▶ vedle mitochondrií představují hlavní buněčné organely, kde je spotřebováván kyslík – původně snižovaly vnitrobuněčnou koncentraci kyslíku? – jejich funkci převzaly mitochondrie, ve kterých je kyslík spotřebováván v souvislosti s tvorbou ATP oxidativní fosforylací – peroxizómy tak vykonávají především metabolické funkce, které neprobíhají v mitochondriích;




## Tvorba peroxizómů

- ▶ peroxizómy vznikají zejména růstem a dělením existujících peroxizómů;
- ▶ jinou možností je jejich tvorba *de novo* z prekurzorů peroxizómů vznikajících ze specializovaných částí ER – ty se postupně vyvinou ve zralé, metabolicky aktivní peroxizómy díky importu peroxizomálních proteinů z cytoplasmy;



## Transfer peroxizómů v průběhu buněčného dělení


- ▶ v průběhu rozdělení buněk dochází také k dělení peroxizómů – zprostředkováno jejich vazbou na cytoskelet – obě dceřinné buňky získávají část původních peroxizómů a není tak nutná jejich syntéza *de novo*;



## Peroxisómy v organismu živočichů

- ▶ množství peroxizómů v jednotlivých typech buněk se liší – velké množství se nachází zejména v buňkách, které jsou vysoce metabolicky aktivní nebo se podílejí na odbourávání škodlivin – např. hepatocyty;
- ▶ u některých druhů živočichů se navíc množství peroxizómů dynamicky mění s tím, jak potřebují využívat např. katabolismus mastných kyselin: např. u některých hlodavců může dojít k rychlé indukci proliferace peroxizómů působením ligandů receptorů pro peroxizómové proliferátory ( $PPAR\alpha$ ) – ty jsou aktivovány např. nenasycenými mastnými kyselinami;

játra kontrolní myši



játra myši po aplikaci ligandu  $PPAR\alpha$  – Wy-14,643

## Poruchy peroxizómů a vrozená onemocnění

- ▶ peroxizómy hrají klíčovou roli v metabolismu a jsou nezbytné pro normální fungování organismu;
- ▶ defekty genů kódujících peroxizomální proteiny mají za následek vrozené poruchy, rozdělované na poruchy peroxizomálních enzymů a poruchy tvorby peroxizómů – značná část vrozených metabolických poruch (kombinovaná incidence 1:5000);
- ▶ X-vázaná adrenoleukodystrofie (porucha oxidace nevětvených mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem (C25:0 a C26:0, VLFCA) v důsledku nedostatečnosti peroxizomálního enzymu lignoceroyl-CoA ligázy);
- ▶ Zellwegerův syndrom – mutace v genech pro peroxiny (PEX1 – 12) - snížená funkce či úplný deficit peroxizómů v buňkách mozku, jater a ledvin (postižení jedinci umírají do 1. roku);

## K zamyšlení

- ▶ živočišné buňky jsou rozrůzněny do stovek buněčných typů – dynamická proměna;
- ▶ stejně tak organely mohou mít velmi rozdílnou morfologii na základě toho jakou plní funkci a jak se mění okolí buňky;
- ▶ velikost vs. povrch organel;
- ▶ struktura a funkce endoplazmatického retikula;
- ▶ Golgiho aparát – „poštovní“ systém;
- ▶ lysozomy;
- ▶ peroxizomy jako příklad mikrotělísek – zanedbávaná energetická organela;

## Příští přednáška: Buněčné jádro

- BUNĚČNÉ JÁDRO A JEHO DYNAMIKA
- opakování - přehled struktury buněčného jádra a chromatinu;
- specializované struktury buněčného jádra;
- jaderná membrána;
- komunikace mezi složkami buněčného jádra a ostatními buněčnými organelami;
- variabilita buněčného jádra v živočišných buňkách