

Vegetace České republiky

6. Vegetace pramenišť a rašelinišť, verze 13. 4. 2014

Přednáší: Milan Chytrý, Ústav botaniky a zoologie PřF MU



Vegetace pramenišť

- maloplošný vývoj
- trvalý přísun vody
- relativně vyrovnané teploty
- výrazné zastoupení mechovrstů
- kolem vápnitých pramenů vznik pěnovců



Srážení pěnovce, Moravský kras, Josefovské údolí u jeskyně Jáchymka

Vegetace pramenišť

Syntaxonomie vegetace pramenišť'

Montio-Cardaminetea

- *Caricion remotae* (= *Cardaminion amarae*)
lesní prameniště bez tvorby pěnovců
- *Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati*
lesní pěnovcová prameniště
- *Epilobio nutantis-Montion fontanae*
subatlantská luční prameniště bez tvorby
pěnovců
- *Swertia perennis-Dichodontion palustris*
(= *Swertia-Anisothecion squarrosum*)
subalpínská prameniště

	bez pěnovce	pěnovec
lesní	<i>Caricion remotae</i>	<i>Lycopodo- Crato- neurion</i>
luční	<i>Epilobio- Montion</i>	
subal- pínská	<i>Swertia- Dicho- dontion</i>	

Poznámka: Luční pěnovcová prameniště mají v České republice vegetaci slatiništní (*Caricion davallianae*) nebo luční (*Calthion palustris*)

Vegetace pramenišť'

Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (*Caricion remotae*)



Carex remota, Českomoravská vrchovina, Domamil

Vegetace pramenišť'

Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (*Caricion remotae*)



*Cardamine amara, Chrysosplenium
alternifolium, Ficaria bulbifera, Brno-Líšeň*



Petasites albus, Javorníky

Vegetace pramenišť'

Lesní pěnovcová prameniště (*Lycopodo-Cratoneurion*)



Podbeskydská pahorkatina, Tichá, Tichavská hůrka

Vegetace pramenišť'

Luční prameniště bez tvorby pěnovců *(Epilobio nutantis-Montion fontanae)*

- podhorské oblasti
- voda s malým obsahem Ca
- zpravidla dominance zdrojovek (*Montia fontana*, *M. hallii*)
- mechy rodu *Philonotis*
- u nás vzácná vegetace, hojnější v západní Evropě



Philonotido-Montietum rivularis,
Karlova Studánka (foto P. Hájková)

Vegetace pramenišť'

Subalpínská prameniště (*Swertia perennis-Dichodontion palustris*)

- Krkonoše a Hrubý Jeseník
- nad lesní hranicí
- živinami chudá půda
- měkká, chladná, dobře prokysličená proudící voda
- *Allium schoenoprasum*, *Cardamine amara* subsp. *opicii*, *Epilobium alsinifolium*, *E. nutans*, *Swertia perennis*
- *Dichodontium palustre*, *Palustriella commutata*, *Philonotis fontana*, *P. seriata*, *Pohlia wahlenbergii*



Hrubý Jeseník, Velká kotlina

Vegetace pramenišť'

Subalpínská
prameniště

(*Swertia perennis-*
Dichodontion palustris)



Allium schoenoprasum,
Krkonoše

Molinia caerulea, Carex flava,
Pinguicula vulgaris,
Trichophorum alpinum,
Hrubý Jeseník, Velká kotlina

Podmínky pro vznik rašelinišť'

- **trvalé zamokření půdního povrchu**
 - v oblastech s vydatnými srážkami
 - v mělkých plochých sníženinách
 - v okolí pramenů
 - trvalé zamokření podporuje růst mechovostů
 - ve stagnující vodě se při rozkladu organických zbytků spotřebovává kyslík a další organické zbytky se ukládají nerozložené ve formě humolitu
- **nízký obsah živin (N, P) v prostředí**
 - zpomalení aktivity dekompozitorů => ukládání humolitu
 - znevýhodnění druhů rákosin
- **(relativně chladné klima)**
 - zpomalení aktivity dekompozitorů => ukládání humolitu
 - omezuje výpar vody

Ekologické typy rašelinišť'

slatiniště

- vznikají v zamokřených terénních sníženinách a v okolí pramenů
- relativně malý podíl organické hmoty v sedimentu
- jsou ovlivněna vysokou hladinou podzemní vody, často minerálně bohaté (minerotrofní rašeliniště)
- tvoří je hlavně *Cyperaceae* a mechy podtřídy *Bryidae*
- sedimentuje slatina

přechodová rašeliniště


- vznikají vývojem ze slatiniště postupným ukládáním humolitu a zvyšováním ložiska
- kvůli vyvýšení ložiska vzhledem k vodní hladině jsou minerálně chudší
- tvoří je různé druhy mechů včetně rašeliníků a *Cyperaceae*

vrchoviště

- vznikají z přechodových rašelinišť růstem některých druhů rašeliníků nad úroveň hladiny podzemní vody
- mírně vyklenutý, čočkovitý tvar
- zásobení pouze srážkovou vodou => minerálně chudé (ombrotrofní rašeliniště)
- tvoří je hlavně rašeliníky (*Sphagnidae*) a chamaefyty
- sedimentuje pravá rašelina

Rašeliniště


Ekologické typy rašelinišť'



Rašeliniště

Vývoj a stratigrafie rašelinišť'

- pozdní glaciál – vysokobylinná vegetace a slatiniště na vlhkých místech
- raný holocén – vznikají slatiniště a přechodová rašeliniště
 - paludifikací vlhkých míst
 - terestrializací jezer
- atlantik – místy vznik vrchovišť
- subboreál až subatlantik – eroze některých vrchovišť nebo jejich částí, jinde ale vznikají nová vrchoviště
- atlantik až subatlantik, zejména středověk – vznik slatiniště na vlhkých místech po odlesnění



Mikroreliéf rašelinišť

šlenky

- prohlubeniny zaplavené zpravidla 0–20 cm vody, někdy krátkokodobě vysychající
- rostou v nich játrovky, plovoucí koberce mechů z čeledi *Amblystegiaceae*, *Sphagnum cuspidatum*

flarky

- šlenky ve svažité části vrchovišť, protažené po vrstevnici

bulty

- kopečky s vodou ca 40 cm a více pod povrchem
- rostou na nich kryptogamy odolné vůči vyschnutí a chamaefyty

stringy

- bulty ve svažité části vrchovišť, protažené po vrstevnici

kolky / rašelinná jezírka

- větší a hlubší než šlenky, vznikají mineralizací rašeliny, sedimentace dy

Rašeliniště

Vrchovištní bulty



Sphagnum magellanicum, Vaccinium uliginosum



Vaccinium oxycoccus

Rašeliniště

Vrchovištní bulty

Foto M. Hájek



Slavkovský les, Tajga

- ←
- Červené:
Sphagnum magellanicum
 - Hnědavé:
S. papillosum
 - Zelené:
S. palustre
S. fallax
Polytrichum commune
Calliergon stramineum

Rašeliniště

Vegetační komplex subalpínských rašelinišť Krkonoše: stringy a flarky




Krkonoše, Pančavské rašeliniště

Rašeliniště

Rašeliná jezírka



Šumava: Chalupská slatě



Hrubý Jeseník, Rejvíz, Velké Mechové jezírko

Rašeliniště

Syntaxonomie rašelinišť'

Scheuchzerio palustris-
Caricetea nigrae

slatiniště a přechodová
rašeliniště

Oxycocco-Sphagnetea

vrchoviště



Slatiniště a přechodová rašeliniště


Syntaxonomie slatinišť a přechodových rašelinišť

Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae

- *Caricion davallianae*
vápnitá slatiniště
- *Sphagno warnstorpii-Tomentypnion nitentis*
slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
- *Caricion canescenti-nigrae*
(= *Caricion fuscae*; incl. *Caricion demissae*) – slatiništní louky
- *Sphagno-Caricion canescens*
oligotrofní přechodová rašeliniště
- *Sphagnion cuspidati*
(= *Leuko-Scheuchzerion palustris*) – vrchovištní šlenky a kolky

Slatiniště a přechodová rašeliniště

Vápnitá slatiniště (*Caricion davallianae*)



Slatiniště a přechodová rašeliniště

Vápnitá slatiniště (*Caricion davallianae*): polabské černavy



Carex davalliana, Všetaty



Schoenus nigricans
Lysá n. L., Hrabanovská černava



Juncus subnodulosus
Mělnická Vrutice

Slatiniště a přechodová rašeliniště


Vápnitá slatiniště (*Caricion davallianae*):
svahová prameništní slatiniště flyšových Karpat



Foto M. Kočí

Slatiniště a přechodová rašeliniště

Rozšíření nevápnitých slatinišť a přechodových rašelinišť
(*Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, kromě *Caricion davallianae*)



Slatiniště a přechodová rašeliniště

Rašeliniště s kalcitolerantními rašeliníky (*Sphagno warnstorffii-Tomentypnion*)



Carex dioica, Drosera rotundifolia, Aulacominium palustre, Sphagnum warnstorffii, Třeboňsko, Řeka (foto M. Hájek)

Slatiniště a přechodová rašeliniště

Slatiništní louky (*Caricion canescenti-nigrae*)

- slatiništní louky
- menší koncentrace minerálů
- chybějí bazifilní a vrchovištní druhy
- vyskytují se druhy luční a prameništní



Eriophorum angustifolium, Velké Meziříčí

Slatiniště a přechodová rašeliniště

Oligotrofní přechodová rašeliniště (*Sphagno-Caricion canescens*)



Slavkovský les, Tajga

Slatiniště a přechodová rašeliniště

Vrchovištní šlenky
a kolky
(Sphagnum cuspidati)




Hrubý Jeseník, Rejvíz
Malé Mechové jezírko



Syntaxonomie a rozšíření vrchovišť

Oxycocco-Sphagnetea

- *Sphagnum magellanicum* (= *Sphagnum medii*) – podhorská až horská vrchoviště
- *Oxycocco palustris-Ericion tetralicis* – subatlantská vrchoviště
- *Oxycocco microcarpi-Empetrium hermaphroditum* – boreální vrchoviště



Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnion magellanicum*)

nelesní vrchoviště se *Sphagnum recurvum* agg. (*S. fallax*, *S. flexuosum*)



Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, Hrubý Jeseník, Rejvíz

Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnum magellanicum*)

nelesní vrchoviště se *Sphagnum magellanicum*



Sphagnum magellanicum, Šumava, Modravská slať

Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnum magellanicum*)

nelesní vrchoviště se *Sphagnum magellanicum*



Andromedo polifoliae-Sphagnum magellanicici, Orlické hory, Jelení lázeň

Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnion magellanici*)

nelesní vrchoviště se *Sphagnum magellanicum*



Andromedo polifoliae-Sphagnum magellanicici, Slavkovský les, Tajga

Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnum magellanicum*)

vrchoviště s *Pinus mugo* a *P. xpseudopumilio*




Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo, Krušné hory, Rašeliniště Rolavy, Velký močál

Vrchoviště


Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnum magellanicum*)

Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť

- nížinná lesní vrchoviště s *Pinus sylvestris*
- hlavní rozšíření v nížinách od Polska na východ
- u nás v Chebské, Dokeské a Třeboňské páni



Katalog biotopů České republiky, 2. vyd. (2010)




Sphagno-Pinetum sylvestris,
Dokesko, Břehyňský rybník

Vrchoviště

Podhorská až horská vrchoviště (*Sphagnum magellanicum*)

Blatkové bory

- horská lesní vrchoviště s *Pinus uncinata* subsp. *uliginosa*
- endemická vegetace Českého masívu a nižších pohoří severně od Alp



Katalog biotopů České republiky, 2. vyd. (2010)



Ledo palustris-Pinetum uncinatae,
Šumava, Vltavský luh u Pěkné

Vrchoviště

Oceánická a suboceánická vrchoviště
(Oxycocco palustris-Ericion tetralicis)



Jizerské hory, Čihadla (foto P. Hájková)

Vrchoviště

Oceánická a suboceánická vrchoviště
(Oxycocco palustris-Ericion tetralicis)



Malá Jizerská louka (foto P. Hájková)

Boreální vrchoviště (*Oxycocco microcarpi-* *Empetrium hermaphroditii*)

- boreální vrchoviště
- kromě druhů společných se svazem *Sphagnion magellanici* také: *Sphagnum fuscum* (hnědý, vysoké bulty), *S. compactum*, *Betula nana*, *Vaccinium microcarpum*, *Rubus chamaemorus*
- u nás jen vyšší polohy Krkonoše, Jizerských hor, Krušných hor a Šumavy



Vrchoviště s *Trichophorum cespitosum* a *Sphagnum compactum*
Krkonoše, Úpské rašeliniště (foto P. Hájková)

Vrchoviště

Boreální vrchoviště (*Oxycocco microcarpi-Epetrion hermaphroditii*)



Vrchoviště se *Sphagnum fuscum*, Šumava, Vltavský luh (foto P. Hájková)

Vrchoviště

Boreální vrchoviště (*Oxycocco microcarpi-Epetrion hermaphroditii*)



Vrchoviště se *Sphagnum fuscum*, Krušné hory, rašeliniště Rolavy, Velký močál