

Primateologie 3




Doc. Václav Vančata

Antropologický ústav PřF MU Brno

Platyrrhina - širokonosé opice

Opice Nového světa



Základní charakteristiky širokonosých opic

Platyrrhina – jsou skupinou velmi starobylou skupinou vyšších primátů, velmi málo víme o jejich vzniku i o tom jak se dostali do oblasti jižní Ameriky






FIGURE 5.4 Skulls of a platyrhine and a catarrhine, showing some of the features distinguishing these two major groups of anthropoids.



Ekologické spektrum širokonosých opic

Velmi široké ekologické spektrum širokonosým primátů vzniklo v důsledku středně třetihorní migrace vyšších primátů na území dnešní jižní Ameriky

Primáti v té době něměli prakticky konkurenci, proto hrají dodnes klíčovou úlohu v rozsévání semen a do jisté míry i jako opylovači



Charakteristika čeledi *Callithrichidae*

2.1.3.3

Jedno mládě



Dvě mláďata o které se zpravidla stará samec

Systematika kosmanovitých

čeleď: **Callithricidae** - kosmanovití

podčeleď: **Callimiconinae** - kalimikové

kalimiko Goeldův - *Callimico goeldi*

podčeleď: **Callithricinae** – kosmani

Kosmani

kosman bělovousý - *Callithrix jacchus*

kosman černovousý - *Callithrix penicillata*

kosman bělouchý - *Callithrix aurita*

kosman běločelý - *Callithrix geoffroyi*

kosman žlutohlavý - *Callithrix flaviceps*

kosman Wiedův - *Callithrix kuhlii*

kosman zakrslý – *Callithrix (Cebuella) pygmaea*

kosman stříbrný – *Callithrix (Mico)argentata*

kosman šedý – *Callithrix (Mico) emiliae*

kosman černohlavý - *Callithrix (Mico) nigriceps*

kosman černoocasý - *Callithrix (Mico) melanura*

kosman zlatoocasý - *Callithrix (Mico) leucippe*

kosman rudonohý - *Callithrix (Mico) markai*

kosman stříbrokrký - *Callithrix (Mico) acariensis*

kosman manikorský - *Callithrix (Mico) manicorensis*

kosman bělopalcí - *Callithrix (Mico) humeralifer*

kosman Mauesův - *Callithrix (Mico) mauesi*

kosman bílozlatý - *Callithrix (Mico) chrysoleucus*

kosman prostřední - *Callithrix (Mico) intermedia*

kosman trpasličí - *Callithrix (Mico) humilis*

podčeleď: **Callithricinae** – kosmani

Tamaríni a Ivíčci

tamarín tmavohřbetý - *Saguinus nigricollis*

tamarín sedlový - *Saguinus fuscicollis*

tamarín zlatoplecý - *Saguinus tripartitus*

tamarín bělovousý - *Saguinus mystax*

tamarín vousatý - *Saguinus imperator*

tamarín bělohubý - *Saguinus labiatus*

tamarín žlutoruký - *Saguinus midas*

tamarín černoruký - *Saguinus niger*

tamarín hnědý - *Saguinus inustus*

tamarín černý - *Saguinus bicolor*

tamarín Martinsův - *Saguinus martinsi*

tamarín pinčí - *Saguinus oedipus*

tamarín Geoffroyův - *Saguinus geoffroii*

tamarín běloruký - *Saguinus leucopus*

Ivíček zlatý - *Leontopithecus rosalia*

Ivíček zlatoohlavý - *Leontopithecus chrysomelas*

Ivíček černý - *Leontopithecus chrysopygus*

Ivíček černolící - *Leontopithecus caissara*

Podčeled' kalimikové - *Callimiconinae*







FIGURE 5.20 A group of Goeldi's monkeys (*Callimico goeldii*) in a bamboo habitat.



Tři premoláry
starobylá stavba zubů
zpravidla jedno mládě



Podčeled' kosmani - *Callithricidae*







FIGURE 5.19 The unusual features of callitrichines.



Kosman trpasličí - *Cebuella pygmaea*



Cebuella pygmaea
je velmi výrazně gumivorní opice

Základní skupiny kosmanů



Callithrix
jihovýchodní Brazílie



Mico
centrální Brazílie - Amazonie



Kosmani z rodu *Mico* - centrální Brazílie - Amazonie





**Kosman
běloplecý**
*Callithrix
humeralifer*

Ochlupené uši



Kosman stříbrný
Callithrix argentata
Holé uši

Amazonští kosmani



Rozdíly v chrupu kosmanů a tamarínů

kosmani jsou mnohem více gumivorní a masožraví





FIGURE 5.24 The lower jaw and teeth of a marmoset (left) and a tamarin (right), showing the differences in proportion of the canines and incisors and the thickness of the enamel on the lower incisors.

Sympatricky žijící tamaríni sedloví a vousatí



Vousatí tamaríni žijí ve středních patrech pralesa, jedí převážně ovoce, malý hmyz a exudáty a nektar. Sedloví tamaríni dávají přednost nižším stromovým patrům. V období dešťů jsou výrazně plodožraví, v období sucha se pak zvyšuje podíl nektaru a exudátů, které doplňují ovocem a velkým hmyzem. V západní Amazonii žijí obě skupiny sympatricky. Sedloví tamaríni jsou dominantní.


Vousatí tamaríni



Tamarín vousatý
Saguinus imerorator



Tamarín bělohubý
Saguinus labiatus



Tamarín bělovousý
Saguinus mystax



S. m. pielatus




Tamarín sedlový
Saguinus fuscicollis

Sedloví tamaríni




Tamarín tmavohřbetý
Saguinus nigricollis




Tamaríni žijící severně od Amazonie




Tamarín černý
Saguinus bicolor




Tamarín zlatoruký - *Saguinus midas*



Skupina tamarína pinčího - nejseverněji žijící kosmanovití




Tamarín pinčí
Saguinus oedipus



Lvíček zlatý

Leontopithecus rosalia



Mirikiny - rod *Aotus*



Mirikina šedookrká
Aotus trivirgatus




Mirikina
Aotus nancymaae




Mirikina zlatokrká - *Aotus nigriceps*


Titiové jedna z nejvariabilněších skupin jihoamerických opic




Titiové - geografické rozšíření




všežraví



býložraví



Geografické rozšíření jednotlivých druhů rodu *Callicebus*



Titiové ze skupiny titi rezavého



Titi rudý
Callicebus cupreus



Titi rezavý
Callicebus moloch



Titi bolivijský
Callicebus donacophilus

Titi límcový - *Callicebus torquatus*



Titi maskovaný - *Callicebus personatus*




Malpy

středně velké
všežravé
až
plodožravé
kvadrupední



MULTIMALE GROUP



Cebus

Malpy a kotulové





FIGURE 5.17 Two platyrhines that live sympatrically throughout much of South America: above, the tufted capuchin (*Cebus apella*); below, the squirrel monkey (*Saimiri sciureus*).



Saimiri



MULTIMALE GROUP

Kotulové
malí
všežraví až
hmyzožraví
kvadrupední
skokani


Malpy rod *Cebus*



Malpa hnědá - *Cebus apella*



Malpa běločelá - *Cebus albifrons*




Malpy rod *Cebus*

Oba druhy jedí mnohem víc živočišné potravy než převážně plodožravá malpa hnědá



Malpa plačlivá
Cebus olivaceus

Malpa kapucínská - *Cebus capucinus*





Kotul veverovitý
Saimiri sciureus



Kotul černý
Saimiri vanzolinii




Kotul bolivijský
Saimiri boliviensis

Kotulové rod *Saimiri*





Kotul rudoohřbetý *Saimiri oerstedi*




Kotulové mají velmi široké potravní spektrum od téměř čisté plodožravosti až k výrazné hmyzožravosti – rozhodující je vysoká kvalita potravy

Sakiovití - *Pitheciinae*

Sakiové



Chvostani




semenožravost



Uakari

Sakiovití - ekologická diferenciace



Chvostani nejmenší,
nejméně semenožraví
sympatricky žijí s oběma rody



Sakiové



Uakari

Sakiové a uakari jsou větší,
značně semenožraví
oba rody žijí alopatricky

FIGURE 5.7 Two pitheciine primates that live sympatrically in Suriname and other areas of northeastern South America: above, the bearded saki (*Chiropotes satanas*); below, the white-faced saki (*Pithecia pithecia*).


Sakiové - rod *Chiropotes*



Saki černý
Chiropotes satanas



Saki bělonosý
Chiropotes albinasus




Chvostani - rod *Pithecia*



Chvostan šedý
Pithecia ironata



Chvostan bělolící
Pithecia pithecia




Chvostan rezavý - *Pithecia albinasa*


Uakari - rod Cacajao



Uakari černohlavý
Cacajao melanocephalus





Uakari červený
Cacajao rubicundus



Uakari šarlatolící
Cacajao calvus



Chápani a vřešt'ani - podčeled' *Atelinae*




Ateles



Vřešt'ani a chápani



Malé teritorium

Velký pohlavní dimorfismus



Velké teritorium

Malý pohlavní dimorfismus




Vřešťani - rod *Alouatta*



Vřešťan rezavý (*Alouatta seniculus* – vlevo nahore)
Vřešťan rezavoruký (*Alouatta belzebul* – vpravo nahore)
Vřešťan černý (*Alouatta caraya* – uprostřed)
(vlevo samice, vpravo samec),
Vřešťan hnědý (*Alouatta fusca* – vpravo dole)

Geografické rozšíření vřešt'anů



Středoameričtí vřešťani




Vřešťan mono -

Allouatta pigra



Žije pouze na Yukatánu
je to největší vřešťan



MULTIMALE GROUP




Vřešťan pláštíkový -

Allouatta palliata


Žije po celé sřední Americe



Distribution of *Ateles* in the Neotropics



Chápani - rod *Ateles* - jižní Amerika



Chápan
dlouhosrstý
Ateles belzebuth



Chápan černý - *Ateles paniscus*



Chápan černolícý - *Ateles chamek*




Chápan běločelý - *Ateles marginatus*

Chápani rod *Ateles* - střední Amerika

Chápan středoamerický - *Ateles geoffroy*



Chápani vlnatí - rod *Lagothrix*



Chápan vlnatý - *Lagothrix lagothricha*

Chápan hnědý
Lagothrix (Orreonax) flavicauda



Chápan pavoučí - rod *Brachyteles*



Chápan pavoučí
Brachyteles arachnoides



Chápan severní
Brachyteles hypoxanthus



Potravní spektrum jednotlivých rodů




Figura 8 (págs: 26 e 27): Gráficos representativos das médias percentuais da alimentação dos primatas neotropicais. MAT. ANIMAL: inclui invertebrados ou vertebrados. FRUTOS: inclui sementes; EXUDATOS: inclui néctar.

Fylogeneze jednotlivých skupin




FIGURE 5.28 A summary phylogeny of New World monkeys.