

# Hvězdná uskupení (v naší Galaxii)

❖ málopočetné skupiny hvězd - dvojhvězdy, trojhvězdy, čtyřhvězdy...

❖ hvězdokupy

- kulové
- otevřené
  - pohybové
- hybridní

❖ asociace

# Málopočetné skupiny hvězd – hvězdné soustavy (multiple stars)

**dvojhvězdy** – Sírius, Prokyon – hvězda hl. posloupnosti + bílý trpaslík

Mira Ceti – pulsující proměnná

$\delta$  Cep – cefeida;  $\varepsilon$  Aur - zákrytová dvojhvězda ...

**trojhvězda** - Polárka – trojhvězda, jedna složka velmi blízká k hlavní složce

$\alpha$  Cen – hlavní dvojhvězda – žlutí trpaslíci (A+B) + červený trpaslík Proxima;  
vzdálenost A-B = 11 AU, (A+B) - C ~15,000 AU

$\beta$  Per - Algol A,B,C

HD 188753 – trojhvězda (3 trpaslíci) 149 ly od Země



**čtyřhvězda** (quadruple) - 4 Cen

Mizar - Castelli a Galileo, později spektroskopie Mizaru A a B => obě dvojhvězdy

HD 98800,  $\varepsilon$  Lyr, V994 Her (zákrytová) ...

**pětihvězda** (quintuple) - 91 Aqr,  $\delta$  Ori,  $\sigma$  Ori

1SWASP J093010.78+533859.5 (zákr.), ...

**šestihvězda** (sextuple)


Castor (+YY Gem),  $\beta$  Tuc,  $\gamma$  Vel, ADS 9731 CrB,  
 $\kappa$  Tau, Alcor (je-li součástí systému Mizaru) ...

TIC 168789840 – 6násobně zákrytová


**sedmihvězda** (septuple)

$\nu$  Sco, AR Cas, DN UMa





## možné hierarchie soustav



katalog vícenásobných soustav:

[Tokovinin \(2018\)](#)

<http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/stars/>

neúplný - výběrové efekty  
výzkum pokračuje

skuteční sousedé:

V 994 Her ([Lee et al. 2008](#))

BV + BW Dra ([Batten & Hardie 1965](#); [Batten & Lu 1986](#))

KIC 4247791 ([Lehmann et al. 2012](#))

CzeV343 ([Cagas & Pejcha 2012](#))

V441+V442 UMa ([Lohr et al. 2015](#))

TIC 168789840 Eri ([Powell et al., 2021](#))

sousedé jen „na oko“ – příklady z pozorování:



DG + MZ Lac

CO + GX Lac

GU + EF Ori

QS + QT Cyg, QU + QX Cyg

# V994 Her




# CzeV343



GSC 02405-01886

5<sup>h</sup> 48<sup>m</sup> 24.008<sup>s</sup> +30°57'03.64" (J2000)


V ~ 13.5 mag




+	30.01.2012	C
○	31.01.2012	C
*	01.02.2012	C
•	02.02.2012	C
x	10.02.2012	C
□	12.02.2012	C
◇	26.02.2012	C
△	03.03.2012	C
▽	05.03.2012	C
∇	06.03.2012	C
△	21.03.2012	C
★	25.03.2012	C
+	09.04.2012	I
○	09.04.2012	V
*	17.04.2012	I
x	17.04.2012	V



# V442 UMa




GSC 03807-00759=  
=1SWASP J093010.78+533859.5



Pozorování 60cm dalekohledem  
Observatoře MU na Kraví hoře

# V441 UMa



# BV + BW Dra

čtverný systém!

BV Dra = ADS 9537 A




EW/KW

P = 0.3500671 d

ADS 9537 B = BW Dra (16.3")

EW/KW

P = 0.2921671 d



(měření dr. Liška)

# Dvojhvězdy



většina, více než 50 %, ... - úvod v knihách a článcích

o dvojhvězdách, např. J. Schombert - Univ. of Oregon - 85 % !

1983 – Abt – v okolí Slunce

~60-70% hvězd – dvojhvězdy nebo vícenásobné systémy

2006 – Lada – většina hvězdných soustav (až 2/3) vytvořených v Galaxii jsou samotné hvězdy!


typická hvězda v Galaxii – červený trpaslík (RD)

jen u 43 ze 171 RD jako primárních složek dvojhvězd do 10 pc (32.6 ly) od Slunce je RD nebo hnědý trpaslík

2010 – [Richichi et al.](#) – zákryty hvězd Měsícem s VLT

– ze 191 hvězd 16 dvojhvězd a 2 trojhvězdy

2011 – ze 184 hvězd 24 dvojhvězd nebo více  
-násobných soustav





# Dvojhvězdnost podle spektrálního typu

**O** – prakticky všechny hvězdy (Mason et al. 1998)

**B/A** – téměř všechny hvězdy (Shatsky & Tokovinin 2002; Koblunicky & Fryer 2007; Kouwenhoven et al. 2007b) ve dvojhvězdách a vícenásobných systémech


**F3–G2** – 55 % v systémech (Abt & Levy 1976)

**sluneční typ** – 44 % v soustavách 2- až 4-četných (Raghavan et al. 2010)

**F7–G9** – ~60 % CORAVEL spektroskopická studie (Duquennoy & Mayor 1991)

**M** - 30–40 % (Fischer & Marcy 1992; Leinert et al. 1997; Reid & Gizis 1997)

**pozdní M-typ a hnědí trpaslíci** - 10–30 % (např. Gizis et al. 2003; Close et al. 2003; Bouy et al. 2003; Burgasser et al. 2003; Siegler et al. 2005; Ahmic et al. 2007; Maxted et al. 2008; Joergens 2008).



# Rozmanitost světa dvojhvězd

## doba oběhu:


226 s - Swift J0525.6+2416 (16 mag V) ČT+BT, 321 s - HM Cnc (21 mag I) – 2 BT;  
9,5 min (V407 Vul), 18 min (AM CVn), 46 min (GP Com), 4.7 h (UX UMa)  
-> 27.2 roku ( $\epsilon$  Aur), 69.1 roku (AS LMi) a možná i WY Gem (64.5 roku)

**poloosa trajektorie:**  $a <$  řádově  $0.01 R_{\odot} \sim 10$  au a více

**excentricita:** 0.975 ! (2 dvojhv., které jsou součástí čtyřhvězd – GJ 586, 41 Dra)

**složky dvojhvězdy:** jakýkoli typ hvězd, mrtvé nebo „živé“, mladé nebo staré, PMS, neutronové hvězdy, černé díry, planety a hnědí trpaslíci

**zvláštnosti:** akreční disky, plynné proudy, společné obálky



# Rozdělení dvojhvězd





(viz 1. přednáška)

## podle metody pozorování

- **vizuální** – Galileo, Castelli (1616); Michell (1767), Herschel (1782)
- **astrometrické** – Bessel (1844), Clark (1862) – Síríus
- **spektroskopické** – Mauryová, Pickering (1887-9); SB1 x SB2
- **zákrytové** – Pigott, Goodricke (1782-3), Vogel (1889)

## podle konfigurace systému (Kuiper, Kopal)

- oddělené/detached
- polodotkové/semi-detached
- kontaktní/contact (overcontact)
- double-contact (Wilson)






# Rozdělení zákrytových dvojhvězd



podle světelných křivek

W UMa





algolidy



$\beta$  Lyrae



extrémy



# Základní parametry hvězd


obecný cíl – popis studovaných soustav = určení parametrů (hmotností a poloměrů složek, sklonu trajektorie...)

co k tomu potřebujeme?


- fotometrie – světelné křivky aspoň ve dvou barvách,
- spektroskopie – křivka radiálních rychlostí – SB2,
- interferometrie,
- astrometrie,
- dlouhé série okamžiků minim.

Řešení světelných křivek

– zhruba 25 programů  
([PHOEBE](#), [Nightfall](#), WD,  
FOTEL, Roche... BM3)




## Ukázka výsledků





jednoduchá varianta

- oddělený systém
- kruhová trajektorie



**Excentricita** = komplikace

ale řešitelná






# Změny v O-C diagramech

časy minima jasnosti:

O observed

C calculated





**Velmi hmotné hvězdy** – důležité např. pro emisi ionizujícího záření, chemický vývoj galaxie, energetické fenomény => potřebujeme dobrý popis jejich vývoje po opuštění hlavní posloupnosti nulového stáří (ZAMS)

*Problém:* zatím rozporuplné výsledky vnitřní stavby z modelování a astroseismologie

## Hvězdy s malou hmotností

*Problém:* teoretické modely neodpovídají pozorováním

Určené parametry z modelů:


- podhodnocené poloměry hvězd o cca 10%,
- nadhodnocené teploty o cca 5%

⇒ graf závislosti hmotnost-svítivost vypadá ok!

málo studovaných málo hmotných dvojhvězd

např. YY Gem, CM Dra, CU Cnc, GU Boo ...

*Pravděpodobné vysvětlení:* hvězdná aktivita




# Dvojhvězdy - indikátory vzdáleností

řada indikátorů – každý z nich je použit pro kalibraci následujícího

⇒ příčky kosmického žebříku

- Sluneční soustava,
  - okolní hvězdy a hvězdokupy,
  - místní skupina galaxií,
  - vzdálené galaxie.



2 způsoby:

- vizuální dvojhvězdy – **orbitální paralaxa** – z kombinace astrometrie a řešení křivky RVs,
- EBs – „**standardní svíčky**“ – z řešení světelných křivek a křivek RVs -> svítivosti/zářivé výkony složek -> vzdálenost (zářivý tok klesá se čtvercem vzdálenosti)

1940 – teoreticky Gaposchkinová ... 1996 Paczynski

od r. 1998 – určení vzdálenosti LMC, SMC, M31, M33 aj., u MCs i tvaru

2004 – Plejády - HD 23642; Munari a kol. ( $132 \pm 2$  pc), Southworth a kol. ( $139 \pm 4$  pc)

# Hvězdokupy

- hvězdná uskupení desítek až milionů hvězd
- společný původ
- gravitačně vázané

ale

méně početná uskupení (otevřené hvězdokupy, pohybové hvězdokupy, asociace) – dlouhodobě nestabilní, rozpadají se

Typy (v naší Galaxii):

- kulové
- otevřené
- hybridní?

jinak obecně hvězdokupy  
(star clusters)



# Kulové hvězdokupy


přibližně kulového tvaru

135-200 v Galaxii

počet hvězd – řádově  $10^4 - 10^6$


průměr – 10 - 400 ly => malé vzdálenosti mezi členy

stáří a vznik dosud zcela neobjasněny



kulové hvězdokupy v naší Galaxii; pozadí COBE

distribuce KH v Galaxii: symetricky kolem středu  
v kouli o  $r = 70000$  ly, více směrem ke středu



# Kulové hvězdokupy

stáří – 10 až 13 mld let

ale

zastoupení dvojhvězd => věk jen 9 mld?

dva typy – KH v kulové složce, menší metalicita, neúčastní se rotačního pohybu Galaxie x KH v disku, mladší


členové: hvězdy s vyšším Z => staré červené a žluté hvězdy

o hmotnostech  $< 2 M_{\odot}$  => populace II


výjimky – modří obři (blue stragglers, modří opozdilci) – různé teorie vzniku:





splynutí hvězd,


hvězdy zachycené hvězdokupou ...



modří opozdilci v NGC 6397







HRD 14 kulových hvězdokup (rozlišení metalicity) – měření z GAIA



47 Tuc

M13



KH v Galaxii, M31 vznik krátce po vzniku vesmíru x v LMC, SMC mnohem mladší




$\alpha, \beta$  Cen



$\omega$  Cen

Cru



# Otevřené hvězdokupy

tvar nepravidelný

počet hvězd – řádově desítky až stovky,  
výjimečně více

průměr – 5 - 50 ly (většinou do 20 ly)

slabě gravitačně vázané => rozpadají se

členové:

mladé modré (zářivé) hvězdy – žijí krátce, ale OH se dříve rozpadne  
hvězdy populace I

počet OH v Galaxii: cca 2100, ale jen několik set prozkoumaných! - [WEBDA](#)

umístění v Galaxii: galaktický disk

- třídy:
1. všechny hvězdy na HP (Plejády)
  2. většina hvězd na HP, ale malá část už na větví obrů (Jesličky)
  3. starší žlutí a červení obři (M67)



# K čemu jsou dobré hvězdokupy

- Rozdělení vzniku hvězd v čase v Galaxii a určení počáteční a dnešní funkce hmoty (statistika hvězd dle hmotností).
- Význam metalicity při zrodu a vývoji hvězd, výzkum gradientu metalicity v Galaxii.
- Korelace mezi věkem hvězd a jejich polohou v Galaxii.
- Přesnější určení závislosti perioda - zářivý výkon pro pulzující proměnné hvězdy, které jsou standardními svíčkami na kosmologických škálách.
- Statistická analýza astrofyzikálních procesů pro různé skupiny hvězd jako chemicky pekuliární hvězdy, hvězdy spektrálního typu B s emisními čarami a další.
- Detailní analýza kritérií členství hvězd v jednotlivých otevřených hvězdokupách.
- Vývoj gravitačně vázaných seskupení hvězd.
- Struktura a dynamika Galaxie

# Vznik a vývoj

**vznik** – v oblastech tvorby hvězd (GMCs), probíhá neustále, např. v HII oblasti mlhoviny v Orionu

**věk** – většinou řádově miliony let, jen výjimečně delší než 1 mld let (hybridy?)

**zánik** – rozpadem – vlastní pohyby, působení okolí (slapy, srážky s mračny...), vypařováním




## Open Clusters





h +  $\chi$  Persei  
(young double cluster)



M67  
(4 billion year old cluster)





NGC 6357

# Hybridní?

NGC 6791 - jedna z nejstarších a největších známých otevřených hvězdokup

ale !

počet hvězd – tisíce, jenže starých 8 miliard let!  
navíc s vysokým obsahem těžších prvků!

ale staré hvězdy by měly mít  $Z$  malé (v Galaxii se kovy hromadí jen pomalu)!

⇒ NGC 6791 jedna z nejstudovanějších  
hvězdokup

možné vysvětlení:  
pochází ze středu Galaxie...



# „Volnější“ hvězdná uskupení (v rámci Galaxie)

dvě možnosti

- hvězdokupy přestávají být gravitačně vázané a rozpadají se
- nově vznikající hvězdokupy – hvězdy mají podobné trajektorie v prostoru

=> hvězdné asociace nebo pohybové hvězdokupy

## pohybové hvězdokupy:

- ❖ Ursa Maior (Collinder 285) – hvězdy od Velkého Vozu, Cep až po TrA!  
Slunce uvnitř, ale není členem (jiná trajektorie, věk, chem. složení)
- ❖ Hyády
- ❖ Jesličky a další

## hvězdné asociace:

objev - Վիկտոր Համազասպի Համբարձումյան  
Viktor Amasaspovič Ambarcumjan

- ✓ O asociace – masivní hvězdy, např. v Orionu, středem Trapez
- ✓ OB asociace – nejbližší Sco-Cen asociace
- ✓ R asociace – hvězdy střední hmotnosti se zbytky původní látky (reflexní mlhoviny, např. Mon R2)
- ✓ T asociace – hvězdy s malou hmotností v původní mlhovině (T Tauri)




# Ursa Major Moving Group

Same Neighborhood  
Same Age  
Same Composition  
Same Direction



# Motions of Local Stellar Group Streams



Ara OB1