

## 22 Exponenciální a logaritmické funkce – met.

### Stručný přehled teorie


---

1) *Definice:*

Nechť  $a \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$ . Funkce  $f: y = a^x$  se nazývá exponenciální funkce se základem  $a$ .


2) *Vlastnosti:*

a) pro  $a > 1$



- $D(f) = \mathbf{R}$
- $H(f) = \mathbf{R}^+$
- Je rostoucí, a tedy prostá
- $f(0) = 1$
- $f$  je spojitá v  $\mathbf{R}$
- Je zdola omezená ( $a^x > 0$ ), není shora omezená
- Nemá ani maximum, ani minimum
- Osa  $x$  je asymptotou grafu  $f$

b) pro  $0 < a < 1$



- $D(f) = \mathbf{R}$
- $H(f) = \mathbf{R}^+$
- Je klesající, a tedy prostá
- $f(0) = 1$
- $f$  je spojitá v  $\mathbf{R}$
- Je zdola omezená ( $a^x > 0$ ), není shora omezená
- Nemá ani maximum, ani minimum
- Osa  $x$  je asymptotou grafu  $f$

### Logaritmická funkce

Logaritmus je exponent, na který musíme umocnit základ, abychom dostali dané číslo. Tedy:

Je-li  $3^2 = 9$ , pak  $\log_3 9 = 2$


1) *Definice:*

Nechť  $f: y = a^x$  je exponenciální funkce se základem  $a \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$ . Funkce  $g$ , inverzní k funkci  $f$ , se nazývá logaritmická funkce se základem  $a$ . Označujeme ji  $g: y = \log_a x$

Pro  $a = 10$  nazýváme hodnotu funkce **dekadický** neboli Briggsův logaritmus, pro  $a = e$  **přirozený logaritmus** ( $e \approx 2,718$  je Eulerova konstanta).


2) *Vlastnosti:*

a) pro  $a > 1$  (funkce  $g$  má zelený graf)



- $D(g) = \mathbf{R}^+$
- $H(g) = \mathbf{R}$
- Je rostoucí, a tedy prostá
- Nemá ani zdola omezená, ani shora omezená
- Nemá ani maximum, ani minimum
- Osa  $y$  je asymptotou grafu

b) pro  $0 < a < 1$  (funkce  $g$  má zelený graf)



- $D(g) = \mathbf{R}^+$
- $H(g) = \mathbf{R}$
- Je klesající, a tedy prostá
- Nemá ani zdola omezená, ani shora omezená
- Nemá ani maximum, ani minimum
- Osa  $y$  je asymptotou grafu

3) *Pravidla pro počítání s logaritmy:*

$$a^y = x \Leftrightarrow y = \log_a x$$

Pro každé  $a, b, c \in \mathbf{R}^+ - \{1\}$ , pro každé  $x_1, x_2 \in \mathbf{R}^+$  a pro každé  $r, n, y \in \mathbf{R}$  platí:

$$1) \log_a(x_1 \cdot x_2) = \log_a x_1 + \log_a x_2$$

$$2) \log_a \frac{x_1}{x_2} = \log_a x_1 - \log_a x_2$$

$$3) \log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$4) \log_a \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \cdot \log_a x$$

$$5) \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

---


**Met.:** S exponenciální i logaritmickou funkcí se studenti setkávají poprvé. V běžném životě jistě všichni zaslechli zmínku o „exponenciálním růstu“ nějaké veličiny, ale nejspíš s ním spojují pouze intuitivní představu strmého narůstání. Termín „logaritmus“ je pro drtivou většinu z nich zcela neznámý.

Učitel by měl studenty nejprve seznámit s exponenciální funkcí  $f: y = a^x$ , kde  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ . Může se nejprve krátce zmínit a zdůraznit zásadní rozdíl mezi funkcí mocninnou a exponenciální, kdy u mocninné funkce ( $g: y = x^k$ ) se argument nachází v základu mocniny, zatímco u funkce exponenciální je argument součástí exponentu mocniny.

Vzhledem k tomu, že se exponenciální křivky podstatným způsobem liší pro  $a > 0$  a pro  $a \in (0; 1)$ , měl by učitel rozvrhnout prostor na tabuli tak, aby umístil vedle sebe dvě souřadnicové soustavy, přičemž do jedné bude kreslit exponenciály funkcí s  $a > 0$ , do druhé pak s  $a \in (0; 1)$ . Kreslení grafů musí předcházet vytvoření tabulek, kterých využije nejen pro grafy, nýbrž i k nasměrování pozornosti studentů na skutečnost, že všechny funkční hodnoty základních exponenciálních funkcí jsou kladné.

## Exponenciální funkce

Exponenciální funkce je funkce typu  $f: y = a^x$ , kde  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ .



Po (či během) nakreslení všech grafů by se měla rozvinout diskuse o tom, jaké zákonitosti lze vyčíst:

- pro  $a > 0$  je exponenciální funkce rostoucí, pro  $a \in (0; 1)$  je klesající;
- každá exponenciální funkce typu  $f: y = a^x$  prochází bodem  $[0; 1]$ ;
- poloha každé exponenciální křivky v soustavě souřadnic je dána základem mocniny  $a$ . Učitel může následně zadat úkol vkreslit bez pomoci tabulky do příslušných souřadnicových soustav grafy např.  $h_1: y = 4,2^x$  nebo  $h_2: y = \left(\frac{1}{15}\right)^x$ . Pro studenty to bude sice snadný úkol, jistě ale přispěje k uvědomění si souvislosti mezi hodnotou základu mocniny  $a$  a polohou jedné exponenciály vůči ostatním.


## Logaritmická funkce

Logaritmická funkce je funkce typu  $h: y = \log_a x$ , kde  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ .

Učitel musí nejprve vysvětlit studentům, co je to logaritmus. K vysvětlení může použít např. zápis:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \text{exponent} \\ 9 = 3^2 \\ \text{dané číslo} \quad \text{základ} \end{array} & \iff & 2 = \log_3 9 \\ & & \text{Čteme: } \boxed{2 \text{ je logaritmus čísla 9 při základu 3}} \end{array}$$

**Logaritmus je exponent, na který musíme umocnit základ, abychom dostali dané číslo.**



Opět by měla proběhnout diskuse o souvislostech a zákonitostech:

- exponenciální a logaritmická funkce o stejném základu jsou vzájemně inverzní, jejich grafy jsou proto souměrné podle osy I. a III. kvadrantu;
- základ  $a$  logaritmické funkce musí splňovat stejné požadavky, jako základ funkce exponenciální - tedy  $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ ;
- pro  $a > 0$  je logaritmická funkce rostoucí, pro  $a \in (0; 1)$  je klesající;
- obě logaritmické křivky se nacházejí vpravo od osy  $y$ , odpovídají tedy pouze kladným argumentům - existují pouze logaritmy kladných čísel (neexistují logaritmy záporných čísel ani nuly)
- každá logaritmická křivka funkce typu  $h: y = \log_a x$  prochází bodem  $[1; 0]$ ;

Učitel opět může studentům zadat úkol, aby načrtli bez pomoci tabulky do jedné souřadnicové soustavy grafy dvou funkcí  $h_1: y = \log_3 x$  a  $h_2: y = \log_7 x$ , do další soustavy souřadnic pak grafy  $h_3: y = \log_{\frac{1}{2}} x$  a  $h_4: y = \log_{\frac{1}{5}} x$ . Ani tento úkol by studentům neměl dělat problémy.

## Základní poznatky

**Př. 1** Nakreslete grafy funkcí (můžete pro porovnání do jedné souřadnicové soustavy)

a)  $f_1: y = \left(\frac{5}{2}\right)^x$   $[0; 1] \in f_1, [1; \frac{5}{2}] \in f_1, [-1; \frac{2}{5}] \in f_1, \dots$

b)  $f_2: y = \left(\frac{2}{5}\right)^x$   $[0; 1] \in f_2, [1; \frac{2}{5}] \in f_2, [-1; \frac{5}{2}] \in f_2, \dots$

**Př. 2** Sestrojte grafy funkcí (můžete pro porovnání do jedné souřadnicové soustavy)

a)  $f_1: y = \log_{\frac{5}{2}} x$   $[1; 0] \in f_1, [\frac{5}{2}; 1] \in f_1, [\frac{2}{5}; -1] \in f_1, \dots$

b)  $f_2: y = \log_{\frac{2}{5}} x$   $[1; 0] \in f_2, [\frac{2}{5}; 1] \in f_2, [\frac{5}{2}; -1] \in f_2, \dots$

**Př. 3** Vypočítejte bez užití kalkulačky

a)  $\log_3 243 + \log_4 \frac{1}{256} + \log_{0,2} 0,04$  [3]

b)  $25^{\log_{25} 5} + 11^{\log_{11} 7}$  [12]

c)  $\log_2 \log_3 81$  [2]

**Př. 4** Vypočítejte bez použití kalkulačky

a)  $2 \log 4 + \log 3 - \log 6 + 1$  [ $\log 80$ ]

b)  $\ln 4 + \ln \frac{1}{3} - 2(\ln 2 + \ln \frac{1}{4})$  [ $\ln \frac{16}{3}$ ]

## Typové příklady standardní náročnosti


**Př. 5** Porovnejte s číslem 1 pomocí grafu vhodné funkce, tj. bez použití kalkulačky:

a)  $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{4}}$   $\left[\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{4}} < 1\right]$

b)  $\left(\frac{41}{40}\right)^{0,2}$   $\left[\left(\frac{41}{40}\right)^{0,2} > 1\right]$

c)  $\left(\frac{\pi+1}{4}\right)^{-2}$   $\left[\left(\frac{\pi+1}{4}\right)^{-2} < 1\right]$

**Met.:** b)



**Př. 6** Načrtněte grafy funkcí (určete definiční obor, obor funkčních hodnot, průsečíky grafu s oběma souřadnicovými osami:

a)  $f_1: y = 2^x - 4$

b)  $f_2: y = 2^{x+1} - 4$

c)  $f_3: y = 2^{|x+1|} - 4$

d)  $f_4: y = -\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} + 4$

e)  $g_1: y = \log_2(x + 4)$


f)  $g_2: y = |\log_2(x + 4) - 1|$

g)  $g_3: y = \log_2|x + 4| - 1$

h)  $g_4: y = \log_2(|x| + 4) - 1$

**Met.:** Při kreslení grafů těchto funkcí si studenti znovu zopakují a ověří, že parametry vkládané postupně do rovnic funkcí mají na tvar a polohu jejich grafů v souřadnicové soustavě analogický vliv jako u dříve probraných funkcí.

a), b)



$$f_1: y = 2^x - 4$$

$$D_{(f_1)} = R, H_{(f_1)} = (-4; \infty)$$


$$P_x[2; 0], P_y[0; -3]$$

$$f_2: y = 2^{x+1} - 4$$

$$D_{(f_2)} = R, H_{(f_2)} = (-4; \infty)$$

$$P_x[1; 0], P_y[0; -2]$$

e), g)



$$g_1: y = \log_2(x + 4)$$

$$D_{(g_1)} = (-4; \infty), H_{(g_1)} = R$$

$$P_x[-3; 0], P_y[0; 2]$$

$$g_3: y = \log_2|x + 4| - 1$$

$$D_{(g_3)} = R - \{-4\}, H_{(g_3)} = R$$

$$P_{x_1}[-6; 0], P_{x_2}[-2; 0], P_y[0; 1]$$

- Pozn.: ▫ Určení definičních oborů i oborů funkčních hodnot i výpočty souřadnic průsečíků s osami jsou u těchto zadání tak jednoduché, že je lze provést z paměti;
- Obratnost v kreslení podobných grafů je nesmírně důležitá např. i pro budoucí řešení exponenciálních a logaritmických nerovnic!!!

**Př. 7** Určete, pro která  $r$  je funkce rostoucí:

$$f: y = \left(\frac{r-3}{r+2}\right)^x \quad [r \in (-\infty; -2)]$$

**Met.:** Základ exponenciální funkce  $f$  je  $a = \frac{r-3}{r+2}$ . Víme, že exponenciální funkce je rostoucí pro  $a > 1$ . Musíme tedy vyřešit nerovnici  $\frac{r-3}{r+2} > 1$ . ...

**Př. 8** Určete definiční obor funkce

a)  $f_1: y = \log(x^2 - 5x + 6)$   $[D(f_1) = (-\infty; -3) \cup (-2; \infty)]$

b)  $f_2: y = \sqrt{\log \log x}$   $[D(f_2) = (10; \infty)]$

**Met.:** a) Argumentem logaritmické funkce musí být kladné číslo. Proto  $x^2 - 5x + 6 > 0$ . ...

b)  $f_2$  je složená funkce:  $f_2(x) = f(g(h(x)))$ , kde  $\boxed{1}$   $y = h(x) = \log x$ ,

$\boxed{2}$   $z = g(y) = \log y$ ,  $\boxed{3}$   $f_2(x) = f(z) = \sqrt{z}$ .

Pro každou funkci musí být splněny podmínky:

1)  $\boxed{x > 0}$

2)  $y > 0 \rightarrow \log x > 0 \rightarrow \boxed{x > 1}$

3)  $z \geq 0 \rightarrow \log y \geq 0 \rightarrow y \geq 1 \rightarrow \log x \geq 1 \rightarrow \boxed{x \geq 10}$

Všechny podmínky jsou splněny pro  $x \geq 10$ . Proto  $D(f_2) = (10; \infty)$ .

Pozn.: Je velmi důležité takto precizně zpracovat řešení úlohy 8b), případně úloh podobných.

*Učitel musí využít každé příležitosti, aby studenty učil nespokojovat se s polovičatými a nepřesnými řešeními, aby je učil systematické, do detailu promyšlené, úplné a do všech podrobností dokončené, precizní práci.*

**Př. 9** Určete definiční obor, obor hodnot a načrtněte graf funkce

a)  $f_1: y = \log(x + 3) - 2$

$$\left[ \begin{array}{l} D(f_1) = (-3; \infty), H(f_1) = R \\ [0; 0] \rightarrow [-3; -2], [1; 0] \rightarrow [-2; -2] \end{array} \right]$$

b)  $f_2: y = \log(-x + 3) + 4$


$$\left[ \begin{array}{l} D(f_2) = (-\infty; 3), H(f_2) = R \\ [0; 0] \rightarrow [3; 4], [1; 0] \rightarrow [2; 4] \end{array} \right]$$

## Rozšiřující cvičení

**Př. 10** Určete definiční obor, obor hodnot a načrtněte graf funkce

$$f: y = \log \sin x$$

$$[D(f) = (2k\pi; \pi(2k + 1)), H(f) = (-\infty; 0)]$$



### Poznámka:

Pro případné zadání exponenciálních nebo logaritmických funkcí v programech typu Geogebra nebo Wolframalpha.com a další použijte do příkazového řádku následující syntaxi:

- Exponenciální funkce  $f: y = 2^x$   $f: y = 2^x$
- Exponenciální funkce  $f: y = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 3$   $f: y = (1/2)^x - 3$
- Logaritmické funkce  $f: y = \log(x + 1)$   $f: y = \lg(x+1)$
- Logaritmické funkce  $f: y = \log_3 x + 1$   $f: y = \log(3, x) + 1$
- Logaritmické funkce  $f: y = 2 \ln x$   $f: y = 2 \ln(x)$

Ve Wolframalpha si nastavte funkci reálné proměnné, tj. Real-valued plot, nikoliv Complex-valued plot.