

EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ


7

Rostliny a mikroorganismy




- interakce nejen mezi mikroby, ale i mezi mikroby a okolím – rostlinami
 - **Zásadní je rhizosféra** - zóna převážně komensálních a mutualistických vztahů mezi mikroby a rostlinami
 - ekto- a endomykorrhizní houby poskytují rostlinám minerální látky a vodu
 - rostliny jim poskytuje fotoasimiláty
 - asociace mezi fixátory dusíku a rostlinami
 - kolonizace nadzemních povrchů rostlin převážně komensálními mikroby
 - negativní vztahy - virové, bakteriální a houbové choroby
-
- mutualismus – vysoce specializované interakce
rostliny poskytují uhlíkaté látky bakteriím pro růst
 - Baterie i houby zvyšují příjem minerálů
-
- komenzalismus – kořenové exudáty poskytují živiny bakterím rostoucím na povrchu nebo v bezprostřední blízkosti - bežnější než mutualismus
-
- parazitismus

Model indicating various plant–microbe interactions



Plant-microbe interactions



Move Over, Bacteria! Viruses Make Their Mark as Mutualistic Microbial Symbionts

Marilyn J. Roossinck

Department of Plant Pathology and Environmental Microbiology, Department of Biology, and Center for Infectious Disease Dynamics, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, USA

Viruses are being redefined as more than just pathogens. They are also critical symbiotic partners in the health of their hosts. In some cases, viruses have fused with their hosts in symbiogenetic relationships. Mutualistic interactions are found in plant, insect, and mammalian viruses, as well as with eukaryotic and prokaryotic microbes, and some interactions involve multiple players of the holobiont. With increased virus discovery, more mutualistic interactions are being described and more will undoubtedly be discovered.

While viruses have long had a very bad name as pathogens, and there are certainly many devastating human, animal, and plant diseases attributed to viruses, viruses are not all bad (1). Recent studies highlight the amazing intricacy of virus-host interactions that have evolved over long periods of time and involve interactions between the hosts and other entities, including other

separate entities any longer, and this could be considered an example of mutualistic symbiosis in the process of becoming symbiogenetic.

In some cases, entire viruses genomes are integrated into the host genome, but these can exogenize and establish infections under some conditions. The badnavirus *Banana streak virus*, a para-

Symbióza

- symbióza s mnoha organismy - lepší přežívání v asociaci s dalším partnerem
- rozsivky, obrněnky, mořské houby, lišeňíky, mechy, Geosiphon, Gunnera, Azolla...



Rozsivka *Epithemia turgida* a endosymbiotické sinice v cytoplazmě.

Symbióza se sinicemi *Nostoc* a *Anabaena*

- Jaterníky
- Mechy (Bryophyta)
- Kapradiny (Pteridophytes)



Nostok pruniforme - kolonie

Cykasy

- rod *Cycas* - „coralloid roots“ - vzniká ještě před invazí sinic
- jediné nahosemenné rostliny se symbionty fixující dusík
- i cévnaté rostliny s kořenovými hlízkami, kde je prokaryotickým partnerem sinice




Fig. 8.18. *Cycas revoluta*. T.S. coralloid root.

Gunnera – noduly (*Nostoc*) na stonku

- krytosemenná rostlina
- dusík fixující sinice v nodulech -kapsách na bázi řapíku
- sinice vytváří filmy na listech i jiných tropických krytosemenných rostlinách
- J a stř. Americe, kde se nazývá „nalca“
- mladé řapíky se často loupou a jí




Nostoc punctiforme

<https://botanicalgarden.berkeley.edu/glad-you-asked/gunnera>



Azolla a Anabaena

- kapradina *Azolla* - vody v tropech/subtropech
- spod. strana listů - dutiny obsahující sinice *Anabaena*
- ta produkuje neurotoxiny – ochrana rostliny před spásáním...?
- *Anabaena* může fixovat několik kg N za den, ročně 50-150 kg/ha – rýžová pole
- fixace není potlačena ani dusíkatým hnojením, není citlivá k pH a salinitě



<http://theazollafoundation.org/azolla/the-azolla-superorganism/>

<https://www.youtube.com/watch?v=OrFJ9-Kuqq4>

<https://www.youtube.com/watch?v=gW0fmf23Se0>


Kořeny rostlin

- výborné prostředí pro růst mikroorganismů
- na kořenech a v okolí velké množství
- interakce mezi mikroby a kořeny uspokojuje nutriční požadavky obou partnerů

rhizoplan - plocha kořenů s tenkou vrstvičkou půdy

rhizosféra - tenká vrstva půdy, která zůstane na kořenech po jejich otřepání

- velikost záleží na druhu rostliny (strukturu kořenů)
- kořenové vlášení značně zvyšuje plochu kořenů v porovnání s kulovým kořenem



Př. jedna rostlina pšenice :

- přes 200 m kořenů
- průměrný průměr kořenů 0.1 mm
- povrch kořenů pak přes 6 m²
- jen 4-10% plochy kořenů (rhizoplanu) v přímém kontaktu s mikrobami
- více mikrobů je pak v celé rhizosféře



rhizosheath

- modifikace rhizosféry – relativně tlustý cylindr půdy lpící na kořenech typický u pouštních trav
- zrnka písku spojené extracelulárním „mucigelem“ – konzervace vláhy
- zvýšená mikrobiální činnost, zvýšená fixace dusíku
- interakce v rhizosféře založené na hospodaření s vodou, uvolnění org. látek kořeny, mikrobiální produkce rostlinných růstových faktorů, minerálních živin




mucigel

- slizovitá viskózní substance- hydratované polysacharidy
- lubrikuje kořenovou špičku při pronikání půdou
- půdní částice se tu přichytí – zlepšení příjmu vody a živin - podnícení růstu prospěšných hub a bakterií fixujících N




rhizosferní efekt

- v rhizosféře až 100x víc mikrobů než ve volné půdě
- dle rostliny a jejího fyziologického stavu
- víc G- tyčinkovitých bakterií
- méně G+ tyček, koků a pleomorfních b. než ve volné půdě
- více pohyblivých bakterií jako *Pseudomonas*
- organismy s vyšší rychlosťí růstu




Co se děje ve rhizosféře

- Vzniká zde směs polysacharidů a glykoproteinů původem z **rhizodepozic** rostlin produkovaných i rhizosférními mikroorganismy, kterému říkáme souhrnně **mucigel**, který je materiálním základem tvorby mikrobního biofilmu na povrchu kořenů.
- Tato mikrobní konsorcia, vytvářející organizovaná společenstva s kolektivní funkcí tzv. **biofilmu**, v němž se rozvíjí složité vzájemné vazby a vztahy.
- Tyto společenstva **zprostředkují kořenům rostlin příjem důležitých, často nedostatkových živin**. Mikroorganismy produkují i další pro rostliny aktivizující látky a stimulanty, jako jsou např. auxiny, gibereliny, etylen, antibiotika atd.
- Dochází k produkci tzv. **informačních molekul** pomocí kterých dochází k vzájemné komunikaci mezi rostlinou a mikroorganismy.



Procesy v rhizosféře jsou determinovány vzájemným působením rostliny, půdy a půdních mikroorganismů. Jedná se o obrovský komplex vzájemně provázaných dílčích reakcí...



- kořeny obklopené mikroby uvolňují mnohokrát víc látek než sterilní kořeny
- některé inhibují, ale většina stimuluje růst mikrobů
- mikroorganismy v rhizosféře mají jiné požadavky na výživu než mikrobi z volné půdy
- mnohé vyžadují AK k růstu – pravděpodobně z kořenových exudátů
- sukcese na kořenech dle růstových fází rostliny
- během vývoje rostliny se výrazná rhizosferná sukcese odrazí ve vývoji mikrobiální populace rychle rostoucích mikrobů vyžadujících růstové faktory

Kořenové exudáty

- AK
- ketokyseliny
- vitamíny
- cukry
- taniny
- alkaloidy
- fosfatidy




. Povrch kořene je nejzajímavějším a nejintenzivnějším místem rozhodujícím o tom jak bujná a druhově bohatá bude vegetace, ale také v jaké míře budou distribuovány asimiláty získané při fotosyntéze do nadzemní nebo podzemní části.

. Produkci rhizodepozic stimuluje rostliny množení rhizosférních mikroorganismů a i jejich aktivitu vedoucí k větší produkci enzymů důležitých pro dekompozici a uvolňování stěžeňních živin z půdy.


To znamená, že pro rostlinu není tak důležité „vyživovat“ kořeny pro jejich aktivitu a vlastní růst, ale „vykrmovat“ si rhizosférní mikroorganismy. Obecně se uvádí, že se takto do půdy dostává asi **20 až 50 %, někdy až 60-80 % uhlíku fixovaného fotosyntézou**.

. Ukazuje se, že kořeny nejsou jen pasívním příjemcem živin nebo bezbrannou obětí patogenů, ale naopak hrají velice aktivní roli při vlastní ochraně a atrahování prospěšných příslušníků edafonu. Samy totiž mohou cíleně řídit aktivity půdních mikroorganismů stimulací kořenovými exsudáty.



Sukcese mikrobiálních společenstev na kořenech

- odráží to změny ve složení látek uvolňovaných kořeny
- nejprve karbohydráty a slizovité látky podporující růst velké bakteriální populace ve žlábcích epidermálních buněk na povrchu kořenů a slizové vrstvě
- s dozráváním kořenů dochází k lyzi části kořenového materiálu a uvolňuje se jednoduché cukry a AK
- *Pseudomonas* a další rychle rostoucí bakterie
- stárnutí rostliny – úbytek bakterií
- 4-týdenní rostlinky kukuřice – 7% fotosyntetátů uvolněno v kořenových exudátech (z celk. 25% fotosyntetátů doručených do kořenů)



Fixace N₂ v rhizosféře

- v rhizosféře tropických trav *Digitaria* (listy plazící se po zemi), *Panicum* (spíš vysoké travy) a *Paspalum* se pravidelně nachází mikroaerofilní *Azospirillum* i aerobní *Azotobacter paspali*
- v polních pokusech až 40 kg N/ha
- *Azospirillum* i v mírném pásmu (trávy, kukuřice) – fixace zanedbatelná
- vedlejší produkt může být i vodík
- některé rody *Rhizobium* a *Bradyrhizobium* mají hydrogenázu, která vodík využije
- někdy zde *Acinetobacter* využ. H₂
- mělké mořské pobřeží – trávy *Zostera marina* (vocha mořská) v mírném pásmu, *Thalassia testudinum* (želví tráva) v tropech



Spartina alterniflora

- invazní rostliny - tichomořské pobřeží USA, zde se rozšířila slanomilná travina *Spartina alterniflora* dovezená z Evropy v 19. století
- fixace N₂ ve slaniskách s trávou - zřejmě směs bakterií a sinic – epifytně na mrtvých stoncích trávy
- ze záplavového ekosystému učinila hustě porostlou slanou bažinu
- zmizelo mnoho míst, kde hledali potravu migrující ptáci
- některé vodní toky se zcela zanesly sedimenty, kterým hustý porost brání v odplavování



Efekt rhizosférní populace na rostliny

- zesílený růst rostlin
- zvýšená recyklace a rozpouštění minerálních látek
- syntéza vitamínů, AK, auxinů, cytokininů, giberelinů
- antagonismus k patogenům - založený na kompetici a vývoji amensálních vztahů – produkce antibiotik

Záplavové půdy

- v anaerobních podmírkách nedostatek O₂, přebytek H₂S
- rýže (a možná i další) je chráněna mutualistickou asociací s *Beggiatoa* (gamma Proteobacteria)
- ta využívá kyslík a enzym katalázu z kořenů rýže
- na oplátku oxiduje sirovodík na síru nebo sulfát
- tím chrání cytochromových systémů v kořenech
- látky produkované mikroby podporují bujný růst kořenů
- auxiny a gibereliny zvyšují rychlosť klíčení a rozvoj kořenového vlášení
- *Arthrobacter, Pseudomonas, Agrobacterium* (IAA)
- rhizosféra – produkce IAA (indolil octová kyselina) zvyšuje růst kořenů pšenice



Copyright © APS Press

Alelopatické (antagonistické) látky

- produkované mikroby v rhizosféře jedné rostliny mohou bránit růstu rostliny jiné
- rhizosferní mikroflóra mladé pšenice brání růstu hrachu a salátu
- při dozrávání ústup této mikroflóry
- a náhrada mikroflórou produkující růst podporující látky podobné giberelinům

Mikroflóra zlepšuje příjem


- fosfátů – mikrobiální org. kyseliny rozpustí apatit
- železo a mangan – chelatační mikrobiální látky
- vápník – díky zvýšenému obsahu CO₂ – zvýší rozpustnost Ca
- transport těžkých kovů

Někdy ale naopak poutání minerálů

- bakteriální imobilizace zinku (nemoc „malých listů“ ovocných stromů)
- oxidace mangantu – šedé skvrny dubu
- Někdy jsou si kompetitoré - imobilizace N (do biomasy, ale i ztráty – denitrifikací)

Mykorrhiza


- symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin – mutualismus (až parazitismus)
- až 90% rostlin, tráva – až 100m mycelia/1 g půdy
- pronikání houbových vláken do kořenových buněk primární kůry (**endomykorrhiza**)
- vlákna jen v mezibuněčném prostoru (**ektomykorrhiza**)
- mycelium nezasahuje do středního válce kořenu rostliny
- jde o specifický vztah – specializace
- zvýšený příjem vody a živin, především P a N
- houby stimulují rhizosférní mikrofloru a její enzymatické aktivity
- významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin



Typy mykorhizních symbióz

- arbuskulární mykorhizní symbióza
- orchideoidní mykorhizní symbióza
- erikoidní mykorhizní symbióza
- ektomykorhizní symbióza
- ektdomymkorhizní symbióza
- arbutoïdní mykorhizní symbióza
- monotropoidní mykorhizní symbióza

Typy mykorhiz schematicky znázorněné v příčném řezu kořenem



(E) - ektomykorrhiza (kořen je obalen hustým hyfovým pláštěm, hyfy nevstupují do buněk, ale prorůstají mezibuněčnými prostory a tvoří tak Hartigovu síť)

(A) - arbuskulární mykorhiza (v buňkách jsou keříčkovité arbuskuly, mezi buňkami váčkovité vezikuly)

(O) - orchideoidní mykorhiza (hyfy tvoří charakteristické smotky v primární kůře, v některých buňkách jsou již tyto smotky odumřelé a zvolna se ztrácejí)

(Er) - erikoidní mykorhiza (hyfy tvoří také smotky, ale převážně v krycích vrstvách kořene)

(M), (At), (Ee) - přechodné typy mezi endo- a ektomykorrhizami: (M) - monotropoidní mykorhiza

(At) - arbutoïdní mykorhiza

(Ee) – ektendomycorrhiza

Všimněte si chybějících kořenových vlásků u ektomykorrhizy, erikoidní a všech přechodných (Ee, At, M) mykorhiz.

Ektomykorhiza

- zevní pseudoparenchymatická pochva víc než $40\mu\text{m}$ silná
- 40% suché hmoty kořenů
- hyfy v mezibuněčných prostorách epidermis a kortexu, ale nikdy v buňce!
- změněná morfologie kořenů – kratší a dichotomické větvení



Kořenové špičky muchomůrky (*Amanita*) v mykorrhizním svazku

Ektomykorhiza


- nachází se u nahosemenných i krytosemenných (kvetoucích) rostlin
- většina stromů mírného pásma má ektomykorhizu
- ascomycetes a basidiomycetes – acidofilní pH 4-6 (3)
- houby někdy vyžadují vitamíny
- naopak uvolňují auxiny, gibereliny, cytokininy, vitamíny, antibiotika, mastné kyseliny
- někdy i enzymy – celulázy – ty ale v symbióze potlačeny


Přínos pro rostlinu

- prodloužený růst a životnost kořenů
- lepší příjem živin z půdy – větší plocha kořenů
- rezistence k patogenům (fyzická bariéra + antibiotika)
- zvýšená tolerance k teplotě, suchu, pH

Houba – fotosyntetáty (unikne kompetici o živiny)


- bez rostliny často netvoří plodnice (i když roste)
- dichotomické větvení a prodloužený růst koříneků
- tvorba vlasových koříneků potlačena - nahrazeny hyfami
- zvýšený příjem P a K (primární hromadění v mycéliu)
- někdy kořeny uvolňují těkavé org. kyseliny s fungistatickým účinkem
- rovnováha s mycorh. houbou i ochrana proti houbovým patogenům





Příčný řez ektomykorrhizním kořenem jeřábu ptačího (*Sorbus aucuparia*), s paraepidermálním typem Hartigovy sítě. Povrch kořene je kryt silnou vrstvou hyf houbového pláště (HP). Z něj vrůstají hyfy do mezibuněčných prostor jednovrstevné kořenové epidermis (=rhizodermis, Ep) a vytváří paraepidermální typ Hartigovy sítě (Hs). Další vrstvy primární kůry (PK) jsou již prosty kolonizace, stejně tak jako celý střední válec (SV).

Příčný řez ektomykorrhizním kořenem vrby, na jehož obvodu je zvláště patrný několikavrstevný hyfový plášť tvořený symbiotickou houbou





© Jaroslav Malý


www.naturfoto.cz


© Jaroslav Malý

www.naturfoto.cz

Endomykorrhiza

- hyfy vnikají do buněk
- unikátní postavení v symbióze - buňky jsou vně i uvnitř hostitele
- nevytváří se pochva kolem kořenů






SR – buněčná stěna rostlinné buňky, **MR** – cytoplazmatická membrána rostlinné buňky, **CR** – cytoplazma rostlinné buňky, **CH** – cytoplazma buňky houby, **MH** – cytoplazmatická membrána buňky houby, **SH** – buněčná stěna buňky houby, **PM** – periarbuskulární membrána, **MP** – mezilehlý prostor

VAM vesikulo- arbuskulární mykorhiza

- přítomnost arbuskulárních mycelií hub v půdě či v kořenech rostlin není - na rozdíl od hub ektomykorhizních - rozpoznatelná pouhým okem (mikroskop)
- arbuskulární mykorhizní houby vstupují do kortikálních buněk kořenů hostitelské rostliny a vytvářejí zde typické útvary – arbuskuly a vesikuly
- krátkověké arbuskuly, jsou místem intenzivní výměny živin mezi hostitelskou rostlinou a houbovým symbiontem
- vesikuly, kulovité nebo oválné ztlustliny hyf, plní zásobní funkci



VAM

- až 240 tis druhů rostlin může mít mykorhizu s 6tis druhy hub
- tři čeledi: *Glomaceae*, *Acaulosporaceae*, *Gigasporaceae*
- tyto houby se objevily zhruba před 383-462 milióny let a asi pomohly rostlinám kolonizovat zemi
- VAM typ nezmění strukturu kořenu, proto hůře detekovatelný
- častý u pšenice, kukuřice, brambor, bobu, sóje, rajčat, jahod, jablek, pomerančů, hroznů, bavlny, tabáku, čaje, kávy, kakaa, cukrové třtiny, javoru, gumovníku, a různých bylin
- kvetoucí rostliny, konifery, mechy, kapradiny a většině důležitých zem. plodin
- VAM houby se nepodařilo pěstovat v čisté kultuře
- mycelium odolnější stresům než kořeny (sucho, kovy, pH)
- zvýšený růst rostlin - zvýšený příjem P, Zn, sulfátů, amonného iontu





Fig. Illustrated are the internal structures of vesicular-arbuscular mycorrhizae
<http://www.biosym.eu/endo-mykorrhiza-en.php>



VAM

- důležité zvláště v tropických půdách deficitních na P – problémy po vykácení tropických pralesů
- bujnosc tropických pralesů založena na mykorhize
- téměř žádný humus, opad a téměř žádné minerální soli – vše vymyté tropickými dešti
- po vyklučení pralesa jedna nebo maximálně pár úrod a pak vše vyplaveno a bez hnojiv nic neporoste – opuštění půdy, eroze
- klučení může fungovat jen v malém měřítku (nízká hustota populace), kdy prales po 2-3 plodinách opět zaroste malé polička (na desítky let)



- endomykorhiza mnohem méně nápadná než ektomykorhiza
- endomykorhiza – na stále rostoucích i dočasně rostoucích kořenech
- hyfy endomykorrhizy pronikají stěnu buněk kortexu- vesicle a arbuscule
- ektomykorhiza – jen na dočasně rostoucích bočních krátkých kořenech
- ale ani jedna mykorhiza neproniká cytoplasmatickou
- ektomykorhiza - dub, borovice, eukalyptus, bříza, dipterocarpus či oliva
- jen pár stromů v mírných oblastech jsou jen endomykorhizní (douglaska, osika, liliovník tulipánovitý, javor cukrový)
- několik těchto druhů (douglaska, osika) mohou vytvářet oba typy



Erikoidní endomykorhiza

- hyfy pronikají do buněk rostliny, nejde o typ vesicular-arbuscular
- najdeme u pár řádů rostlin, například vřesovcotvaré (borůvka, drchnička, rododendrony) – rašeliniště, vřesoviště
- houba kolonizuje buňky rhizodermis
- v buňkách klubka a smyčky – výměna látek
- houba nefixuje N₂, ale rostlina má lepší přístup k N, P a ostatním minerálům – významné v půdách s nízkým obsahem minerálních látek a nízkým pH
- houba čerpá živiny z odumřelých houbových hyf i živočichů (chitinázy, proteázy)



Kultura erikoidní houby izolovaná z rostliny *Woollsia pungens*

Orchideoidní mykorhiza

- téměř všechny orchideje - je to obligátní
- zcela mykotrofní jsou nezelené heterotrofní orchideje
- např. *Neottia nidus-avis* (hlístník) a klíční stádia všech druhů orchidejí – semena malá s málo živinami
- často *Armillaria mellea*, *Rhizoctonia solani*
- houba proniká do buněk vnějšího kortexu, později zaniká (využita rostlinou) – vytváří zde tzv. **klubíčka hyf** (smotky, pelotony).
- ale houby mohou být i parazité hostitelů a naopak hostitel může kolaps klubíček
- přesně vyvážený vzájemný parasitismus




Orchidejové louky Bílé Karpaty



Význam mykorhizních symbióz

- zlepšují příjem vody a živin do rostlin (P, N, K)
- podporují růst a vývoj rostlin Přítomnost houby navíc stimuluje mikrobní život v rhizosféře, z čehož rostlina obvykle také těží. Je experimentálně i z praktických pokusů prokázáno, že po vzniku mykorhízy se oběma symbiontům lépe daří.
- omezují napadení rostlin kořenovými patogeny (*Pythium ultimum*, *Fusarium oxysporum*)
- omezují vstup těžkých kovů do rostlin
- podporují tvorbu strukturních půdních aggregátů - glomalin
- zvyšují odolnost rostlin proti působení biotických a abiotických stresových faktorů Houbové mycelium funguje vlastně jako prodloužení rostlinných kořenů, přičemž toto prodloužení je mnohonásobné ve srovnání s kořenem rostliny.
- hyfový internet Mycelium lesních hub může mít délku i v řádech kilometrů a může fungovat fakticky jako „potrubí“ a transportovat živiny z jednoho konce lesa na druhý, či jako internet a přenášet informace např. o výskytu škůdců.



Fixace dusíku

Průmyslová fixace dusíku

- v průběhu 19. století se postupně zvyšovala poptávka po dusičnanech a amoniaku - hnojivo a výbušniny
- zjevným zdrojem byl atmosférický dusík (N_2), který tvoří téměř 80 % vzduchu
- vzdušný N_2 je velmi stabilní a nereaguje přímo s jinými chemikáliemi
- Haber-Boschův proces - umělý proces fixace dusíku - v současnosti hlavním postupem pro průmyslovou výrobu amoniaku
- proces přeměňuje atmosférický dusík (N_2) na amoniak (NH_3) reakcí s vodíkem (H_2) za vysokého tlaku a teploty a za přítomnosti kovového katalyzátoru



- množství dusíku z průmyslové fixace je podobné biologické fixaci, cca 100 mil tun N hnojiv/rok

Biologická fixace dusíku

- diazotrofie
- je schopnost prokaryot redukovat trojnou vazbu v molekule atm. dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny (amoniaku)
- proces - pomocí enzymu nitrogenázy a za dodání energie (ATP)
- diazotrofové - klíčové v koloběhu dusíku v přírodě, protože umožňují fixaci atmosférického N do organiky
- tzv. hlízkové bakterie, protože žijí v specializovaných orgánech-hlízkách
- mnoho dusík fixujících bakterií však nemá tendence asociovat se s kořeny vyšších rostlin (žijí volně)
- velké množství energie nutné k fixačním reakcím- největší význam autotrofové (zejména sinice)
- heterotrofní bakterie většinou vstupují do relativně úzké symbiózy s rostlinou, která jim energii dodává


- reakce se odehrává v několika krocích:



- amoniak je kvůli své jedovatosti (při vyšších koncentracích) ihned zabudováván do neškodných aminokyselin (např. glutaminu) a v této formě dále rozváděn po těle
- obrovské množství energie - 16 molekul ATP, nutné k redukci jediné molekuly N₂
- údajně až 20% veškeré energie produkované při fotosyntéze v hostitelské rostlině se spotřebovává v hlízkách k hlízkové fixaci
- s každým fixovaným N₂ je také vytvořen H₂ a může být redukován substrát jako acetylén na etylén (detekce fixace N)
- jen některé kmeny rhizobií a bradyrhizobií mají hydrogenázu a mohou využít vytvořený vodík
(jinak uvolňován jako odpad)

Typy diazotrofů

- diazotrofové - v mnoha bakteriálních taxonomických skupinách, ale pár i v *Archaea*
- i u druhů, které fixují N₂, mohou být kmeny nefixující (Postgate, 1998)
- fixace je zastavena, pokud je k dispozici jiný zdroj N i za přítomnosti většího množství kyslíku
- různé mechanismy ochrany před kyslíkem




Diazotrofní organismy se dají obecně rozčlenit do několika skupin:

- žijící volně v půdě - rody *Azotobacter*, *Azomonas*, *Azotococcus*, *Beijerinckia*
- žijící v asociaci s kořeny rostlin - aerobní (nebo mikroaerofilní) spirily - například rod *Azospirillum*
- žijící v symbióze s kořeny bobovitých rostlin - rody *Rhizobium*, *Bradyrhizobium*, *Sinorhizobium*, souhrnně hlízkové bakterie
- dále jsou fixace vzdušného dusíku schopné některé sinice (*Nostoc*, *Anabaena*) a aktinomycety (*Frankia*), některé bakterie oxidující síru a enterobakterie (*Escherichia*)


Mechanismy ochrany proti kyslíku

- exprese enzymů jen v anaerobních podmírkách
- exprese enzymů v oddělených tkáních od fotosyntetických (některé sinice)
- časové oddělení fotosyntézy a fixace dusíku den – noc – u některých sinic
- využití proteinů odstraňujících kyslík – leghemoglobin - jenž je nezbytný při plnění funkce enzymu nitrogenázy




Volně žijící diazotrofové

- méně prozkoumané, často obligátní anaerobové netolerující kyslík i když nefixují N₂
- půdy, rozkládající se organická hmota (*Clostridium*)
- SRB – důležité v mořských sedimentech (e.g. *Desulfovibrio*)
- některé methanogenní Archaea – fixace dusíku v bahně a zažívacím traktu zvířat
- často rychlosť respiracie kyslíku odpovídá rychlosti jeho doplňování – výsledkem je nízká koncentrace volného kyslíku
- *Klebsiella pneumoniae*, *Bacillus polymyxa*, *B. macerans* a *Escherichia intermedia*



- aerobové – vyžadují kyslík k růstu ale jejich nitrogenáza je stále ke kyslíku citlivá
- *Azotobacter vinelandii* – vysoká rychlosť respirace a ochranné sloučeniny
- další druhy používají stejný způsob, ale rychlosť respirace je nižší
- fototrofové - fotosyntetické bakterie – produkce O₂ při fotosyntéze
- některé i tak fixují N₂ – heterocysty - nemají část fotosyntézy produkovující kyslík - *Anabaena cylindrica* a *Nostoc commune*
- jiné sinice nemají heterocyty a fixují N₂ jen za nízké úrovně osvětlení a kyslíku (např. *Plectonema*)




Hlízková symbióza

- především v čeledi bobovitých , citlivkovitých a sapanovitých
- bobovité rostliny se často sázejí na polích za účelem zvýšení obsahu dusíku v půdě
- bakteriálním symbiontem (fixátorem dusíku) jsou G- tzv. hlízkové bakterie (rhizobia)
- 57 druhů v 12 rodech, nejznámější jsou rody ***Rhizobium*, *Bradyrhizobium* či *Sinorhizobium***
- tvoří vnitrobuněčnou symbízu s rostlinami
- rostliny obsahují váčky s bakteriemi, kterým jsou dodávány energeticky bohaté organické látky
(např. kyselina jablečná a sukcinát) a ionty železa, molybdenu a síry
- rostlina naopak přijímá amonný kationt (NH_4^+) (mutualistické soužití)
- silná hostitelská specifita, jež je realizována lektiny - proteiny na povrchu kořene, které jsou rozpoznávány bakteriálními receptory produkovanými geny Nod



Hlízka (nodul)

- uměle vytvořený orgán v kořeni - soubor interakcí mezi bakteriemi a hostitelskou rostlinou
- vysoký obsahu proteinu leghemoglobinu- růžové zbarvení
- bakterie najdou svou rostlinu po směru koncentračního spádu flavonoidů
- sek. metabolity, které aktivují některé bakteriální geny (tzv. Nod geny)
- díky nimž bakterie začne syntetizovat vlastní lipooligosacharidy
- na tyto látky zareaguje rostlina diferenciací speciálních dělivých pletiv (hlízkové meristemy), které zahájí tvorbu hlízky
- bakteriálními signály dochází k ohnutí kořenového vlásku, narušení BS a kontaktu bakterie s endopl. retikulem hostitele
- prorůstáním membrány infikovaným kořenovým vláskem
- vzniká infekční vlákno, které proniká do dalších rostlinných buněk
- kde se odškrcují váčky s jednotlivými bakteriemi
- bakterie (nyní již nazývané bakteroidy) se následně zvětšují a mění tvar



Rhizobium - leguminózy, čeled' *Fabaceae*

- kyslík je vázán na leghemoglobin v kořenových hlízkách a dodáván v množství, které nepoškodí nitrogenázu

Frankia – hlízkám podobné struktury – v nich frankie vytváří struktury podobné heterocystám – fixace N₂

- Frankie také produkují hemoglobiny, ale jejich role méně prozkoumaná než u rhizobií
- na první pohled se může zdát, že infikují skupiny nepříbuzných rostlin
(olše, přesličník přesličkovolistý, latnatec, vřesna bahenní, dryádky)
- revize fylogeneze kvetoucích rostlin prokázala těsný vztah těchto druhů a leguminóz



Sinice – existují i symbiotické sinice – některé s houbami (lišejníky), s játrovkami, kapradinami a cykasy

- nevytváří hlízky, mnohdy tyto rostliny ani nemají kořeny
- asociace s kapradinami jsou i významné ze zemědělského hlediska - *Azolla* s *Anabaena* - rýže





Neleguminózní dusík fixující mutualistické vztahy

- s rhizobiemi, sinicemi a aktinobakteriemi
- *Rhizobium* a tropický strom *Trema* – pionýrská rostlina
- v tropických a subtropických oblastech *Frankia alni* – také tvoří hlízky na kořenech stromů
- *Frankia* fixující dusík vytváří vezikula i bez rostliny v čisté kultuře
- s rody: *Alnus*, *Hippophae* - rakytník rešetlákový (10x víc C než v pomerančích)



Casuarina – v tropické a subtropické oblasti Austrálie
s Frankia






Frankia and actinorhizal nodules
a Frankia in pure culture; nitrogen-fixing
vesicles 2-6 mm (v) and sporangia (s) can
be observed.

b Actinorhizal multilobed nodules on the
root system of the actinorhizal plant
Allocasuarina verticillata.

c Pseudolongitudinal section of a
nodular lobe from *A. verticillata*; the
nitrogen-fixing zone contains large cells
filled with Frankia (f), and the infection
zone (iz) is located in the apex of the
nodular lobe.

Dryas – dryádka


- trvalka (bylina) arktických a alpinských oblastí
- hyfy aktinobakterie pronikají kořenem, stimulace buněk kortexu – dělí se
- klastry a formují vezikula na koncích hyf
- v okolí infikovaných buněk je indukováno kořenové primordium, které roste do kortexu
- aktinobakterie vnikne do meristematických buněk primordia a skrz produkované látky stimulují další vývoj primordia
- dichotomické dělení vrcholu meristému vytvoří klastry laloků zvaných rhizothamnoion



A cortex swelling called « prenodule », that constitutes the first step in the establishment of the nodule, longitudinal cut of an alder nodule, stained with cotton blue in order to visualize cortical cells full of Frankia vesicles.
<http://www.ecologiemicrobiennelyon.fr/spip.php?article677&lang=en>

Symbiotická fixace dusíku


- jeden z nejdůležitějších symbiotických vztahů mezi bakteriemi a rostlinami
- bakteriální buňky proniknou do kořenů vhodné rostliny a vytvoří zde nádoru podobné struktury – hlízky
- nitrogenázový enzymový systém: dinitrogenáza (MoFe protein) a dinitrogenáz-reduktáza (Fe protein)
- chemotaxí ke kořenovým vláskům – rostlinné lektiny (specificita)
- tryptofan z kořenových exudátů rhizobii přeměněn na IAA – ohyb nebo rozvětvení k. vlásku kolem bakterií
- polygalakturonáza depolymerizuje a změkčí buněčnou stěnu kořenových vlásků
- rhizobia do rostlinných buněk – tvorba infekčního vlákna (rostlinný materiál)
- infekční vlákno do kortexu a infikuje tetraploidní buňky, které se začnou množit a vytvoří tkáň hlízky
- rhizobia uvolněna z infekčního vlákna, ztrácí tyčinkovitý tvar, vytvoří bakteroidy a začne fixace dusíku

**Figure 4.8**


Interactions between rhizobia and leguminous plant roots leading to infection and nodule formation. (A) Rhizobia are chemotactically attracted to root hair. Mediated by lectins, some attach to the root hair cell wall. Tryptophan is a component of the root hair exudate. (B) Tryptophan is transformed by the rhizobia to indoleacetic acid (IAA). This plant growth hormone causes the root hair to curl or branch around the attached rhizobia. Polygalacturonase, secreted by the rhizobia or possibly by the plant, depolymerizes and softens the root hair cell wall. (C) Rhizobia gain entry into the root hair cell. The root hair cell nucleus directs the development of the infection thread. (D) The infection thread, a tube consisting of cell membrane and surrounding cellulosic wall, grows into the root cortex and infects some tetraploid cells that proliferate and form nodule tissue. The rhizobia are released from the infection thread, lose their rod shape, become irregularly formed bacteroids, and commence nitrogen fixation. (E) Nodulated leguminous plant.

Vztah *Rhizobium* – hostitelská rostlina


- oboustranně specifický vztah
- rhizobia a bradyrhizobia přitahována AK a dikarboxylovými kyselinami v kořenových exudátech a také velmi nízkými koncentracemi látek - flavonoidy
- lektiny -rostlinné proteiny s vysokou afinitou ke karbohydrátovým skupinám na povrchu vhodných rhizobií – specifické mediátory - přichycení rhizobií k kořenovým vláskům
- flavonoidy a isoflavonoidy vylučované rostlinou indukují expresi nod genů v rhizobiích – enzymy biosyntézy substituovaných lipooligosacharidů, Nod faktorů
- exkretovány, způsobí ohnutí kořenových vlásků a dělení meristematických buněk vedoucí k vytvoření hlízky
- v hlízce buňky s bakteroidy jsou tetraploidní, mezi nimi i normální buňky které spojují hlízky s kořenovým cévním systémem
- při přeměně rhizobiální buňky na bakteroid dochází k degeneraci bakteriálního chromozómu – bakteroid se nemnoží



- tvorba nitrogenázy v bakteroidu – rostlina hraje roli v zahájení a kontrole její syntézy
- hlízky – červenohnědé - díky leghemoglobinu – nosič elektronů
- zásobuje bakteroid kyslíkem pro tvorbu ATP a zároveň chrání nitrogenázu proti kyslíku
- hemová část kódována rhizobiem, globinová část rostlinou



- fixace N i ve fylosféře terestriálních rostlin včetně konifer
- část N fixovaného v „phylloplane“, zůstane v korunách stromů a je recyklována zdejší mikroflórou
- část se spláchne do půdy, část přijata přímo listy, část zkonzumována býložravci
- některé bakterie mohou infikovat listy čeledi *Myrsinaceae* a *Rubiaceae*, vytvořit na nich listové hlízky, některé schopné fixace N



Interakce mikroorganismů se vzdušnými částmi rostlin

- stonky, listy a ovoce – epifytní mikroflóra
- heterotrofní a fotosyntetické bakterie, houby (především kvasinky), lišeňíky a některé řasy
- fylosféra – habitat/prostředí přiléhající k povrchu listů
- fyloplán – přímo povrch listů

- na jehličnanech – *Pseudomonas (fluorescens)*
- populace bakterií z jehličnanů využívají jako zdroje C cukry a alkoholy
- ve srovnání s mikroflórou opadanky – zde víc lipolytické a proteolytické aktivity

žito – sezónní změny

- květen – xantomonady a růžové chromogeny
- červenec – xantomonady a pseudomonady
- září – xanthomonady
- říjen – listerie, stafylokoky

kvasinky jsou častou mikroflórou listů

- *Sporobolomyces roseus*
- *Rhodotorula glutinis*
- *R. mucilaginosa*
- *Cryptococcus laurentii*
- *Torulopsis ingeniosa*
- *Aureobasidium pullulans*



- mikroflóra listů včetně kvasinek bývá často pigmentovaná – ochrana proti UV
- mikroflóra odolnost stresu – sucho, teplo – specializované ochranné buněčné stěny
- speciální způsoby rozšiřování na další listy – např. hmyz přenáší mikroorganismy z plodu na plod (octomilka a kvasinky)

někdy i těsný synergický vztah mezi mikroorganismem, hmyzem a rostlinou:

- jeden druh fíkovníku (*Calimyrna*) musí být opylen speciální fíkovou vosou (*Blastophaga psenes*)
- ta infikuje fík kvasinkou *Candida guilliermondii* var. *carpophila* a bakterií *Serratia plymuthica*
- které se zde pomnoží, ale nezpůsobují kažení fíku

<https://www.youtube.com/watch?v=oSuoH72jpeo>



Mikroflóra květů

- krátkodobý habitat pro epifytní mikrofloru
- zde často *Candida reukaufii* a *C. pulcherrima*, *Torulopsis*, *Kloeckera*, *Rhodotorula*
- po opylení a během zrání se podmínky a s nimi i mikrobiální populace mění – často pak dominantní *Saccharomyces*


Pozitivní a negativní vztahy mezi mikrobiálními populacemi na rostlinném povrchu:

- osmofilní kvasinky sníží koncentraci cukrů a připraví prostředí pro jiné mikroorganismy
- nenasycené mastné kyseliny produkované kvasinkami inhibují G+ bakterie
- bakterie na ovoci závislé na růstových faktorech (thiamin, kyselina nikotinová) produkovaných kvasinkami
- kvasinky závislé na růstových faktorech produkovaných bakteriemi
- mikroorganismy rostou na kůře stromů – lišejníky a houby (*Myxomycetes* – *Licea*, *Trichia*, *Fuligo*)



Houby na listech


- *Sporobolomyces* - asi nejúspěšnější houba na povrchu listů
- produkce ballistospor – střílí z listu na list
- mnoho dalších hub izolováno z fylosféry: *Ascomycota*, *Basidiomycota*, *Deuteromycota*
- některé alochtonní (normálně se nachází v půdě)
- některé patogenní (*Alternaria*, *Epicoccum*, *Stemphylium* – dobře rostou pouze za příznivých podmínek)
- **počet a druhové složení mikroflóry dle ročního období (sezónnost) a věku listů**
- *Ascochytula*, *Leptosphaeria*, *Pleospora*, *Phoma* – saprofyti – začne víc růst až na začátku senescence listů



Sporobolomyces

Některé houby mohou růst intercelulárně v travách čeledi Poaceae a chránit je proti herbivorům

- kostřava rákosovitá (*Festuca arundinacea*) a jílek vytrvalý (*Lolium perenne*) s houbami *Acremonium coenophialum* a *A. Lolii*
- endofyt nezpůsobuje žádné příznaky nemoci, získává fotosyntetáty a syntetizuje alkaloidy jako ergopeptidy, loliny, lolitremy a peraminy
- jsou jedovaté nebo alespoň odpudivé pro nematody, mšice a další hmyz a býložravce
- **Lolitremy** jsou zvlášt' silné neurotoxiny - mohou způsobit ztráty na dobytku



Kostřava rákosovitá




Jílek vytrvalý



Acremonium

- není známá volně žijící forma, není infekční
- není známé sexuální stádium – *Deuteromycota*
- množí se (udržuje se) semeny trav – tyto obsahují endofyta
- endofyt se dá odstranit skladováním semen při vyšší teplotě
- je velice podobné *Epichloe typhina* - plíseň dusivá, parazituje na stéblech a pochvách trav
- také asymptomatický endofyt až do kvetení trávy – zde se projeví, mycelium se objeví vně a zastaví kvetení
- možná se *Acremonium* vyvinulo z tohoto parazita



Snět kukuřičná - 1970

(*Helminthosporium maydis*) – *Ustilago maydis*

Destrukce 10 mil akrů kukuřice (4 mil. ha – 40 tis km² – ½ ČR)

ARTICLES

The Southern Corn Leaf Blight Epidemic

L. A. Tatum 1

A dramatic shift in the genetics of host-parasite interaction and balance occurred

in the U.S. corn crop in the 1970 growing season. Southern corn leaf blight incited

by *Helminthosporium maydis* Nisikado & Miyake evolved from a minor disease

that causes an average annual loss of less than 1 percent, to one that caused

more than the 12 percent average expected from all diseases of corn in the United States.

In 1970 the losses to corn leaf blight approaches 710 million bushels (cca 36 litrů).

Reserves of corn and other grains ease the impact on the economy and food supplies but there are important domestic and foreign effects of the loss.

The epidemic illustrates the vulnerability of our food crops to pests.




Bakterie způsobující tvorbu ledových krystalů na rostlinách

- některé kmeny *Pseudomonas syringae* a *Erwinia herbicola* produkují povrchový protein, který může zahájit tvorbu ledových krystalů
- při teplotě -2 - - 4 oC se formují ledové krystaly-poškození a bakterie pak zkonzumují rostlinu
- při nahrazení jinou mikroflórou krystaly až při teplotách -7 - -9oC
- genetické inženýrství „ice-minus“ *P. syringae*
- https://www.youtube.com/watch?v=hKT_SGK2qtY



Přenos patogena na rostlinu

- patogenní mikroorganismus se dostane do styku s rostlinou bud' v rhizosféře nebo častěji fylosféře
- většina houbových patogenů se šíří vzduchem – kontakt s listy nebo stonkem/kmenem
- viroví patogeni přenášeni především hmyzem
- také půdní fauna (nematoda)
- pohybliví bakteriální (*Pseudomonas*) a houboví (*Oidium*) patogeni přítomní v půdě také vstupují kořeny (chemotaxe)
- přichycení houbových spor přenášených větrem - konidiospóry askomycety *Magnaporthe grisea* (zničí tolik rýže, co by stačilo k obživě 60 mil. lidí)
- přichytí k hydrofobním povrchům jako je listová kutikula pomocí slizu ve vrcholu spory
- vlhký vzduch nebo rosa způsobí bobtnání slizu, vrchol spory praskne a přilepí sporu ke kutikule



konidiospory *Botrytis cinerea* ve dvou fázích:

- hydratovaná ale neklíčící konidiospora se přichytí povrchu listů slabými hydrofobními interakcemi
- hydrofobnost povrchu podporuje toto počáteční uchycení (surfaktanty jej silně inhibovaly)
- za několik hodin konidiospory začnou klíčit a je vylučována látka (glukóza, galaktózamin, proteiny) přilnavá k hydrofobním i hydrofilním povrchním (odolává i silných chemických činidlům)




Další možnosti vstupu patogenů

- poraněními
- přirozenými otvory – stomata – jak rozeznají otvor?

Uromyces appendiculatus (rez na fazolích)

- používá topografický signál – 0,5 μm vysoký hřeben buněk stomatu
- model stomata z polystyrenu – dojde k morfologické diferenciaci a vytvoří se ploché hyfy (appresoria) nezbytné k proniknutí do stomatu
- pokud hřeben nižší než 0.25 μm nebo vyšší než 1 μm , k diferenciaci nedojde



- mnohé viry vstupují ranami způsobenými hmyzem přenášejícím tyto viry
- některé vstupují kořeny s vodou
- někteří patogeni jsou schopni překonat kutikulu bez cizí pomoci
- často atakována enzymaticky, změkčena (padlí – *Erysiphe sp.*, *Botrytis cinerea* – plíseň šedá, ušlechtilá plíseň na vinné révě, *Fusarium solani* – suchá hniloba hlíz)
- po vstupu do hostitele naruší normální funkci rostlin produkcí degradativních enzymů, toxinů a růstových regulátorů
- půdní patogeny produkují pektinázy, celulázy, hemicelulázy jejichž výsledkem jsou hnily a jiné poranění
- destrukce rostlinných růstových regulátorů má za následek trpasličí formy rostlin, produkce IAA, giberelinů a cytokininů, tvorbu nádorů (puchýřů) a nadměrný růst stonků do délky





• *Plasmodiophora brassicae* - Nádorovka kapustová



1563332

- produkce toxinů narušuje metabolismus rostliny
- někdy jde o nízkomolekulární cyklické peptidy a lineární polyketoly – narušují mitochondrie a buněčné membrány – umožní šíření infekce
- rezistence bývá založena na modifikaci receptoru
- rostliny vykazují různé morfologické nebo metabolické abnormality
- častá reakce na mikrobiální atak je tvorba papillae





© M. Sedlářová, 2004


Taphrina deformans
červené zduřeniny na listech se
později pokrývají vrstvou bílých vřecek



© I. Petrželová, 2004

Monilia laxa

haustoriální výběžek



Obr. IV/9 Stavba haustoria vřetenatky révové *Plasmopara viticola* (podle KUDELY 1989)

Phytophthora infestans - Plíseň bramborová -
příznaky plísně na listu rajče



Plant Cells under Attack: Unconventional Endomembrane Trafficking during Plant Defense

by  Guillermo Ruano ^{1,*}  and  David Scheuring ^{2,*} 


¹ School of Plant Sciences and Food Security, Tel Aviv University, Tel Aviv 6997801, Israel

² Plant Pathology, University of Kaiserslautern, 67633 Kaiserslautern, Germany


* Authors to whom correspondence should be addressed.

Plants **2020**, *9*(3), 389; <https://doi.org/10.3390/plants9030389>

Received: 26 February 2020 / Revised: 16 March 2020 / Accepted: 19 March 2020 / Published: 21 March 2020



DĚKUJI ZA POZORNOST



Peter Staněk

<https://www.youtube.com/watch?v=dWPwLATVAhY>