

NOVOSVĚTSKÉ OPICE (PLATYRRHINA): SYSTEMATIKA, BIOGEOGRAFIE, MORFOLOGIE, SOCIÁLNÍ STRUKTURA, CHOVÁNÍ A EKOLOGIE

Barbora Pafčo
269851@muni.cz

Hominoids

Prosimians



Lemurs and
lorises

Tarsiers

New World
monkeys

Old World
monkeys



Gibbons



Orangutans



Gorillas





Chimpanzees



Hominids


Anthropoids






VYŠŠÍ PRIMÁTI - ANTHROPOIDEA

- úplně uzavřená očnice
- nemají *tapetum lucidum*
- nemají rhinarium
- nemají specializované pachové žlázy
- relativně velký a rozvinutý mozek
- komplikovanější sociální struktury
- Novosvětské opice (*Platyrrhini*)
- Starosvětské opice (*Catarrhini*)






PLATYRRHINI

- široká nosní přepážky
- zuby 2133
- srůst tibie a fibuly v oblasti kotníku
- charakteristická stavba středního ucha
 - chybí kostěný zvukovod
- nemají sedací mozoly
- samicím během ovulace nezduřuje anogenitální oblast




New World Monkeys

Old World Monkeys



PLATYRRHINI
NEW WORLD



CATARRHINI
OLD WORLD

PLATYRRHINI

- Jižní Mexiko, Střední a Jižní Amerika - stromové prostředí
- všichni nadčeled' Ceboidea
- Malpovití (Cebidae) – malpy, kotulové, drápkaté opičky, mirikiny
- Chvostanovití (Pitheciidae) – titiové, chvostani
- Chápanovití (Atelidae) – vřešt'ani, chápani



PLATYRRHINI

- západní polokoule
- téměř úplně stromoví
- vyvinuté dlouhé končetiny s drápy podobnými nehtům
- malý sexuální dimorfismus
- prehensilní ocas se vyvinul u některých druhů
- různé velikosti od asi 100 g – 12 (15) kg
- všechny druhy jsou denní kromě mirikin (soví opice)
- primáti nového světa vykazují velký rozsah ve velikosti, stravě a celkových ekologických adaptacích




NEW WORLD MONKEYS

- většinou stromoví
- konzumují ovoce a hmyz nebo listy
- menší primáti jedí více hmyzu, větší primáti jedí více listů



© Brian Lally

clamber/suspensory
arboreal quadruped
leaper



MALPOVITÍ (CEBIDAE)

- velmi různorodá skupina primátů - obtížné zobecnit
- jižní Mexiko, střední a jižní Amerika
- některé druhy mají chápavý ocas
 - stabilizace, krmení a lokomoce
- malpy, kotulové, drápkaté opičky, mirikiny




MALPOVITÍ – MALPY (CEBINAЕ)

- rod **Cebus** a nově vytvořený rod **Sapajus** (2011)
 - cca 6, 2 mil. let, přírodní bariéra - Amazonka
- částečně chápavý ocas
- mnohosamco-samicové skupiny
- mimořádné kognitivní schopnosti
- vysoce rozvinuté manipulační schopnosti ruky



Cebus capucinus (Malpa kapucínská)



Sapajus apella (Malpa hnědá)

DĚSIVÉ MALPY



MALPOVITÍ – KOTULOVÉ (SAIMIRIINAE)

- **Kotul rod *Saimiri*** (velmi malí ~ 0,75 kg)
- tvoří největší tlupy mezi novosvětskými opicemi
 - až 200 opic obou pohlaví
 - periferní postavení samců
 - pokud existuje hierarchie – samci podřízení
 - sezónní změny v chování samců
 - v období říje extrémně zmohutní a zesílí
 - sezónní dimorfismus



Kotul veverkovitý (*Saimiri sciureus*)



Kotul rudohrbetý (*Saimiri oerstedii*)

MALPOVITÍ - DRÁPKATÉ OPIČKY (CALLITHRICHINAE)

- kosmani a tamaríni
- fylogenetický dwarfismus
 - největší *Leontopithecus* (lvíček; 560 g), nejmenší *Callithrix pygmeus* (kosman zakrslý; 110 g)
- pouze jižní Amerika
- negyrifikovaný mozek
- morfologie – drápky místo nehtů (kromě palce nohy)
 - ztráta pseudoopozice palce ruky (prsty pracují unisono)
- dvojčata – tendence k monogamii, častá otcovská péče

DRÁPKATÉ OPIČKY

- redukce zubů – 2123
- kosmany a tamaríny lze odlišit - rozdíly v dolních zubech
- kosmani - řezáky jsou úměrné špičákům
 - dietní adaptace
- Tamaríni - typičtější antropoidní vzor
 - špičáky větší než řezáky




FIGURE 5.19 The unusual features of callitrichines.

DRÁPKATÉ OPIČKY - ZÁSTUPCI



Callithrix pygmeus
(Kosman zakrslý)



Callithrix jacchus
(Kosman bělovousí)



(Callimoco goeldii)
kalimiko



(Saguinus midas)
Tamarín žlutoruký



*(Leontopithecus
rosalia)*
Lvíček zlatý

- ovoce, nektar a exsudáty, pryskyřice
- stromová čtyřnohá, skákající lokomoce

hmyz, ovoce, pryskyřice

DRÁPKATÉ OPIČKY

Reprodukce

- kromě kalimika je typické rození dvojčat – ojedinělé mezi opicemi
- dvojvaječná dvojčata, ale společná placentace, propojení krevních oběhů a genetický chimerismus
- extrémní poměr váhy matky a váhy vrhu
 - výdaje na nošení a kojení mláďat musí být rozděleny mezi více pečovatelů
- primární pečovatel je otec, kromě kalamika hned po porodu, matka jen kojí
 - příbuzní i nepříbuzní, obojího pohlaví
- není laktační amenorhaea
 - ale zpozděná implantace blastocysty (prodloužená březost)

DRÁPKATÉ OPIČKY

Sociální život

- v podstatě monogamní, ale s řadou individuálních odchylek
- častý polyandridický systém, kdy se s matkou páří a o mládě pečeje několik samců (tamaríni)
- feromonální suprese ovulace u podřízených samic dominantní samicí
 - pokud zabřezne některá další samice, může dominantní samice vyvolat potrat nebo zabít narozená mláďata
- mezidruhové asociace – pouze tamaríni, nikdy kosmani
 - většinou druhy, co využívají různá patra lesa
 - snazší lokalizace predátorů? Snazší nalezení potravy?


MALPOVITÍ – MIRIKINY (AOTIDAE)

- **jediný rod *Aotus*, s řadou druhů (až 12)**
- obsazení noční niky, asi souvisí s kompeticí s titiema
 - *A. azarae* (Mirikina Azaraova) katemerální
 - v oblasti, kde nežijí titiové
 - v zoo mohou být denní i noční (v nocturnáriích)
 - noční aktivita sekundární
 - černobílé vidění, chybí *tapetum lucidum* – velké oči
 - prozatím známá jen striktní monogamie, ale méně intimní než u titiú (například nezpívají duety)
 - I mládě o které peče zprvu matka, ale později hlavně otec



CHVOSTANOVITÍ – TITIOVÉ (CALICEBINAE)

- **Titi, rod *Callicebus*** – 2016 rozdělen na 3 druhy
 - ***Cheracebus*, *Plecturocebus*, *Callicebus***
- dříve jen tři druhy, dnes jeden z druhově nejbohatších rodů primátů
 - *C. bernhardi*, *C. stephennashi* – objeveni 2002 v centrální Amazonii (Brazílie)
- striktně monogamní, silné partnerské pouto
 - vzájemné ovívání ocasů, důležité vzájemné čištění
 - velikostí téměř monomorfní
 - silně teritoriální, patrolování hranic, hlasité duetové volání
- I mládě, nošeno otcem, matka ho jen kojí
 - i později se mláděti věnuje víc otec, než matka



TITIOVÉ - ZÁSTUPCI



Titi maskovaný
(*Callicebus personatus*)



Titi rezavý
(*Plecturocebus moloch*)



Titi Bernhardův
(*Plecturocebus bernhardi*)



Titi peruánský
(*Plecturocebus oenanthe*)



Titi Nashův
(*Plecturocebus stephennashi*)



Titi límcový
(*Cheracebus torquatus*)

CHVOSTANOVITÍ – CHVOSTANI (Pitheciinae)

- 1 mládě, peče jen matka
- nechápavý ocas
- býložraví
- **Chvostan rod *Pithecia***
 - monogamní
 - Fission-fussion – několik hodin přespávají společně
 - pohlavní dichromatismus – mláďata zbarvená jako samice



Chvostan bělolící
(*Pithecia pithecia*)

CHVOSTANOVITÍ - CHVOSTANI

- **Saki rod *Chiropotes***
 - vícesamčí-vícesamičí tlupy
 - pohlavní monochromatismus
 - 2 druhy



Saki bělonosí (*Chiropotes albinasus*)

CHVOSTANOVITÍ - CHVOSTANI

- **Uakari rod *Cacajao***
 - pohlavní monochromatismus
 - 2 druhy
 - obrovské tlupy tvořené možná harémovými jednotkami
 - ojedinělé mezi jihoamerickými primáty





Uakari šarlatolící
(*Cacajao calvus*)



CHÁPANOVITÍ – VŘEŠŤANI (ALOUATINAE)

- **Vřešťan rod *Alouatta*** - nejrozšířenější rod amerických opic
 - chápavý ocas s holou ploškou na konci
 - zavěšování (při sběru potravy), uchopování objektů, škrábání
- hlasité volání obou pohlaví
 - rezonanční vak zasahuje do zvětšené jazylky
 - volání je zvukovou konfrontací sousedních tlup, hlavně jedinců stejného pohlaví



CHÁPANOVITÍ – VŘĚŠŤANI

- pomalu se pohybující, stromový čtyřnožec
- nejčastěji se nachází v horním stromovém patře
- chápavý ocas - přidržování
- suspensory movement - zavěšování

Vřešťan rezavý
(*Alouatta seniculus*)



90397278 © Mark Bowler / NPL / Minden Pictures


CHÁPANOVITÍ – VŘĚŠŤANI

- folivorní
- trávení probíhá v tlustém střevě (caeco-colic fermentation)
- nejsou morfologické/anatomické adaptace na folivorii
- nemají velkou velikost těla (např. jako gorily)
- trávení usnadňuje pomalý pohyb
- bakterie



CHÁPANOVITÍ – VŘEŠŤANI

- silná tendence k vytváření harémů, ale také tlupy s více samci
 - tlupy velmi malé, kromě vřešťana pláštíkového (*A. paliata*), kde bývají větší tlupy s více samci
 - transfer samic mezi tlupami, ale také takeovery – hlavně ve větších harémech
 - velký pohlavní dimorfismus
 - pohlavní dichromatismus u vřešťana černého (*A. caraya*) – samci černí, samice a juvenilové slámoví



Vřešťan pláštíkový (*Allouatta palliata*)

Vřešťan černý (*Alouatta caraya*)

CHÁPANOVITÍ – CHÁPANI (ATELINAE)

- častá redukce palce
- chápavý ocas s hmatovou plochou s papilárními liniemi
- semibrachiátoři - zavěšování za ruce a ocas s podporou nohou
- promiskuitní
- *Brachyteles* - největší novosvětská opice
 - (12-15 kg)
 - 2 druhy




© ChrisDixonStudios.com



Chápan pavoučí
(*Brachyteles arachnoides*)

CHÁPANOVITÍ - CHÁPANI

- **Lagothrix** – 1 druh (Chápan vlnatý)
- **Oreonax** – 1 druh (Chápan žlutoocasý)
 - reliktní areál v horském mlžném lese v Peru
 - považován za vyhynulého, znovuobjeven roku 1974
- **Ateles** – více druhů,
 - prakticky úplná redukce palce



Chápan černý (*Ateles paniscus*)



Chápan vlnatý (*Lagothrix lagotricha*)



Chápan žlutoocasý (*Oreonax flavicauda*)

CHÁPANOVITÍ - CHÁPANI

- závislost na ovoci je činí zranitelnými vůči změnám stanoviště
- vyžaduje větší domovský okrsek



CHÁPANOVITÍ – CHÁPANI (ATELINAE)

Sociální život

- fission-fussion vícesamčí-vícesamičí komunita, podobná jako u šimpanzů
 - dávána do souvislostí s podobnou specializací na zralé plody, existuje ale i u folivorních rodů *Brachyteles*
 - samčí filopatrie, větší sociabilita, koalice (jako u šimpanzů)
 - pohlaví monomorfismus
 - samci nedominují samicím, nebojují o ně
 - pohlavní výběr asi na bázi kompetice spermií
 - výrazný dimorfismus špičáků – u samic jen 2/3 samčí délky
 - extrémní zvětšení klitorisu u rodů *Ateles*, *Oreonax* a *Lagothrix*
 - delší než penis samců

