



EKOLOGIE MIKROORGANISMŮ

4

**Ekosféra mikroorganismů –
atmosféra, litosféra**



Atmosféra

Charakteristiky a stratifikace atmosféry:

- 78% N, 21% O₂, 0,034% CO₂ a stopy dalších plynů
- do různé míry saturovaná vodou, může obsahovat kapky vody, krystalky ledu, částice prachu

Rozdělena na oblasti definované teplotními maximy a minimy:

Troposféra



- rozhraní s hydrosférou i litosférou (9 km na pólech, 17 km na rovníku)
- teplota troposféry klesá s nadmořskou výškou

Stratosféra (10-50 km)

- teplota zde vzrůstá s nadmořskou výškou

Ionosféra

- v oblastech **mezosféry a termosféry**
- spodní okraj ionosféry je ve výšce asi 60 km (den), 95 km (noc)
- v horní části pak ionosféra ve výšce cca 700–1000 km
- obsahuje elektricky nabitě částice (ionty)
- umožňuje odraz rádiových vln




Celkově chemické a fyzikální parametry atmosféry nejsou příznivé pro růst a přežití mikrobů:

- teplota se snižuje se zvyšující se výškou v troposféře
- atmosférický tlak klesá s výškou
- koncentrace kyslíku se snižuje až na úroveň vylučující aerobní respiraci
- koncentrace organického uhlíku není dostačující pro heterotrofní růst
- dosažitelnost vody je nízká a limituje možnost autotrofního růstu
- mikrobi vystaveni intenzivnímu světelnému záření
- se zvyšující se výškou přibývá UV záření – letální mutace a smrt



Stratosféra

- vrstva ozonu (90% veškerého ozónu)
- absorpce UV záření (jen 1% dopadne na Zemi)
- fluorokarbony, nadměrné hnojení (uvolnění N_2O)
- stratosféra – bariera transportu mikrobů z a do troposféry, pomalé míchání plynů
- organismy pomalu transportovány a déle vystaveny ozónu a UV
- jen organismy chráněné proti těmto vlivům by mohly přežít cestu ze zemské atmosféry
- aerosol kyseliny sírové - oxid siřičitý a sulfan (sopečná činnost) se zapojuje do chemických reakcí ve stratosféře
 - perzistence 2 až 3 let
 - až 10x větší schopnost blokovat dopadající sluneční záření (zvyšuje odrazivost Země) - albedo





Atmosféra jako habitat a médium (prostředí) pro rozptyl mikrobů

- nepřátelské prostředí, v nižší troposféře je značné množství mikrobů
- termální gradienty - míchání vzduchu
- pohyb vzduchem - významná cesta rozptylu mikrobů
- i speciální adaptace pro přežití a rozptyl atmosférou
- mnoho virových, bakteriálních a houbových chorob se šíří vzduchem
- propuknutí nemoci často sleduje převládající větry



Dočasná lokalizace v troposféře může poskytnout habitat pro mikroby:

- nejčastější výskyt v aerosolu nebo na pevných částicích
- oblaka mají koncentraci vody, která umožňuje množení mikrobů
- nízké koncentrace CO_2 ve vrstvě mraků jsou dostatečné pro podporu růstu fotoautotrofů
- kondenzační jádra mohou poskytnout některé minerály
- v průmyslových oblastech může v atmosféře dokonce být dostatečná koncentrace organických chemikálií pro růst heterotrofů
- toto vše jen teoretická možnost, chybí důkazy, že takový život v oblacích opravdu existuje a jeho význam se zdá být zanedbatelný



Aererosol s mikroby izolované z prasečáku a slepičárny

Atmosféra – šíření mikrobů


- mikrobi z hydrosféry i litosféry se mohou dostat do vzduchu
- neexistují opravdoví „vzdušní“ mikrobi – jde jen o cestu do nového vodního nebo terestriálního habitatu
- někteří mikrobi se do vzduchu dostanou jako vegetativní buňky, ale častěji jako spory
 - soredia (lišejníky), cysty a jiné nevegetativní rezistentní struktury méně metabolicky aktivní a lépe přizpůsobené přežití v atmosféře
- spory s primární funkcí rozptýlu – xenspory (malé, šíření a okamžité klíčení)
- houby, řasy, lišejníky, některé protozoa a bakterie (zvl. aktinobakterie) produkují spory, které se objevují v atmosféře
- viry – neaktivní , vně hostitele
(pohyb a šíření atmosférou jako neaktivní částice podobně jako spory)




Spory

Vlastnosti spor, které přispívají k jejich schopnosti přestát transport atmosférou:

- nízká metabolická aktivita (nepotřebují externí živiny a vodu)
- produkovány ve velkých množstvích (u některých hub více jak 10^{12} spor na jednu plodnici) –přežije jen pár
- některé spory extrémně tlusté stěny – ochrana proti desikaci
- některé pigmentované – UV
- malá velikost a nízká hustota – ve vzduchu dlouho než sedimentují
- obvykle spory lehké, někdy obsahují plynové vakuoly
- různé tvary – některé aerodynamicky přizpůsobené dlouhému laterálnímu transportu v atmosféře



- mikroorganismy produkující suché spory na vzdušném mycéliu
- pasivní uvolnění spor do vzduchu proudem vzduchu (aktinobakt., houby)
- čím vyšší rychlost větru (proudění vzduchu) a nižší vlhkost vzduchu, tím větší pohyblivost spor
- šíření větrem je důležité u mikrobů vyskytujících se na povrchu rostlin (patogeny)
- některé spory uvolněny, když se srazí vodní kapka se s plodnicí hub



Spory plísňí ze vzduchu

Vstup mikrobů do atmosféry

Spory a někdy i vegetativní mikrobi vstupují do atmosféry jako aerosol z:

- rozstřík dopadající kapky deště
- sprej z tříštících se vln
- rychle se pohybující proud vody tříštící se o překážku
- pohyb plynu skrz vodní sloupec (bubliny stoupající ze sedimentů)
- proud vzduchu v čistírnách odpadních vod
- kašláni, kýchání (patogenní bakterie, viry)
- řada adaptabilních aktivních mechanismů mikroorganismů, které uvolňují spory do atmosféry



čičenka rýhovaná

- dešťová kapka uvolní spory do atmosféry
vibrační struktury, ke které jsou spory
připevněny
- „splash cups“ u hub – využívá sílu dopadající
kapky k uvolnění spor
- později se z peridiol uvolní spora, případně je
spasena býložravci a tak se šíří dál







Figure 9.4

Splashing of peridiol from a basidiocarp of *Cyathus striatus*. (A and B) Raindrop landing in cup. (C) The peridiol splashing out with hapteron extended. (D) Hapteron sticking to a plant as the peridiol is carried forward by its momentum and the funiculus is extended by a pull. (E) Peridiol jerked backward when the funiculus is extended to its full length. (F) Peridiol swinging around the plant stem as another raindrop falls. (Source: Brodie 1951. Reprinted by permission of National Research Council Canada.)






Pilobolus (Měchomršť krystalický)


- roste na výkalech býložravců
- zachycuje vzdušnou vlhkost, natačí se za světlem
- pod sporou se zvyšuje turgor – (často 7 atm a více)
- dojde k vystřelení sporangia – na pár centimetrů až 2 m (150-600 km/h)
- klastr spor je vystřelen, když vakuola ve sporangiu zduří při zvýšení osmotického tlaku, který způsobí prasknutí struktury
- spory jsou odnášeny pryč proudem vody a uvolněny směrem k nejvyšší intenzitě světla tedy do otevřeného vzduchu, kde je nejpravděpodobnější, že proud vzduchu způsobí další disperzi



Tento vystřelovací mechanismus je využíván parazitickými hlísticemi (nematoda) - (plicnivky – *Dictyocaulus* – parazitují v průdušnicích a plicích různých býložravců) – larvy vyloučené jedním býložravcem vylezou na sporangia *Pilobolus* a jsou vystřelena spolu s ním...




- u většiny **ascomycet** jsou askospory aktivně uvolňovány
- ascus při zrání zduří a praskne na vrcholu vystřelující spory do vzduchu
- na vzdálenost několika milimetrů až centimetrů
- prasknutí je způsobené změnou osmotického tlaku při přeměně glykogenu na cukry
- některé askomycety „bafají“ – současné rozbití velkého počtu asků s uvolněním viditelného oblaku spor
- bafnutí může být způsobeno změnami environmentálních podmínek (světlo, vlhkost, teplota)



Basidiomyceta *Sphaerobolus* (hrachovec)

- roste následně na hnoji (trusu) po *Pilobolus* a askomycetách
- basidiospory uvolněny, když vnitřní zduřelá vrstva vegetativní hyfy švihne zevnitř
- ven vystřeluje masu spor několik metrů nahoru



Přežívání ve vzduchu

- po uvolnění do vzduchu spory i vegetativní buňky bojují o přežití
- většina mikrobů přežije krátký transport atmosférou – do několika mm
- jen málo přežije delší transport – desikace (extrémní vysušení)
- někteří mikrobi mají adaptace umožňující delší expozici desikačním podmínkám
- expozice UV záření
- organismy přenášené vzduchem na prachových nebo půdních částicích mohou být chráněné pigmenty, *M. luteus*– absorbuje UV)
- (buňka nebude usmrcena za nepřítomnosti kyslíku - smrt ozářením je fotooxidační proces vyžadující kyslík)





- mnohé mikroorganismy transportovány na velké vzdálenosti - *Puccinia graminis* (rez travní)
- některé viry, bakterie a houby – přežijí transport přes oceán
- to, že některé mikroorganismy jsou téměř všudypřítomné, je především z důvodu efektivního vzdušného transportu



Puccinia graminis

Houba u nás přezimuje zimními výtrusy ve slámě a na jaře vytváří basidiospory. Ty mohou napadnout pouze meziphostitele a na něm vznikají aecidiospory, které znovu přecházejí na obilniny a trávy. Uredospory, které vznikají na obilnině, jsou ihned klíčivé a přenášejí se vzdušnými proudy na velké vzdálenosti. Na zrajícím obilí se tvoří zimní výtrusy



342 Chapter 9 Microorganisms in Their Natural Habitat

Table 9.4
Dissemination of *Puccinia graminis*

Distance from source (km)	Concentration relative to source (%)
0	100
300	5
560	6
840	2
970	0.2

Source: Stakman and Hamilton 1939.

Table 9.2


Survival times of some bacterial and archaeal species in the air-dried state

Survival time	Organism
10 ⁶ years	Coryneforms, gram-positive non-spore-forming bacilli, cocci
10 ⁴ –10 ⁵ years	Cocci, actinomycetes, gram-negative bacilli, spore-forming bacteria
10 ³ years	<i>Gloeocapsa</i> , <i>Hormathonema-Gloeocapsa</i> , <i>Chroococcidiopsis</i>
200 years	<i>Bacillus</i> sp., <i>Clostridium</i> sp.
140 years	<i>Nostoc commune</i>
10–70 years	<i>Bacillus anthracis</i>
15 years	<i>Thermoplasma acidophilum</i>
3 years	<i>Listeria monocytogenes</i>
0.6–1.5 years	<i>Nocardia asteroides</i>
1.1 years	<i>Haloarcula</i> sp., <i>Halobacterium</i> sp., <i>Sulfolobus</i> sp., <i>Halococcus</i> sp., <i>Haloferax</i> sp.
120–200 days	<i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> , <i>Corynebacterium diphtheriae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Brucella suis</i> , <i>Franciscella tularensis</i>
60 days	<i>Mycobacterium avium</i>
40–50 days	<i>Coxiella burnetti</i>
12–40 days	<i>Campylobacter fetus</i> , <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Proteus morganii</i>
3.8–10 days	<i>Serratia marcescens</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Moraxella bovis</i>
12–48 hours	<i>Streptococcus salivarius</i> , <i>Cowdria ruminatum</i> , <i>Eperythrozoon coccoides</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Escherichia coli</i>
2–4 hours	<i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i>
18–40 minutes	<i>Treponema pallidum</i> , <i>Leptospira interrogans</i>
6–10 minutes	<i>Salmonella typhi</i>
2–6 minutes	<i>Vibrio cholerae</i>

Source: Potts 1994.

Kvantifikace mikroorganismů ve vzduchu

- buď kultivace na miskách – zvýhodňuje bakterie, kvasinky a některé houby
- nebo přímé počítání (mikroskopické sklo s lepkavým povrchem na letadle při proletu atmosférou) – zvýhodňuje spory hub
- filtrování určitého objemu vzduchu přes filtry s póry 0,5 μm a méně - přímý počet mikrobů
- Impingerová metoda -prosátí vzduchu tryskou ponořenou do kapaliny, v níž dochází k zachycení mikroorganismů obsažených ve vzduchu




- Pro kultivační metody - filtr vložit na vhodné médium a kultivace
- časté je *Cladosporium*
- typicky – do výšky 3000m je $10^1 - 10^4$ mikrobů/m³

Sezónní změny:

- v severní hemisféře – houby čtenější červen – srpen
- bakterie dominují na jaře a na podzim

Mikrobi odstranění z atmosféry různými způsoby:

- usazení z důvodu gravitace
- odstranění deštěm nebo jinými srážkami (po bouřce redukce mikrobů ve vzduchu)



Litoekosféra

- **skály/horniny, půdy, sedimenty**
- **půda** – habitat pro organismy
- **skály** – vyvřelé (žula, čedič), sedimentární (vápenec, pískovec, břidlice), metamorfované (para/ortorula, mramor)
- povrch poskytuje vhodný habitat pro omezené množství mikrobů
- bakterie, řasy, houby a lišejníky kolonizují povrch skal
- mnohé rozpouští minerály působením organických kyselin a chelatačními činidly
- bakterie a houby často ve štěrbinách zadržujících vodu
- na pobřežních skalách sinice a řasy




Půda

- vytváří se z matečné horniny (podkladový skalní masív) fyzikálními, chemickými a biologickými silami - zvětráváním
- nejprve se vytvoří regolit (nezpevněný horninový materiál) a pak půda

5 faktorů uplatňujících se na vytváření půdy:

- matečný materiál/hornina
- klima
- topografie
- biologické aktivity
- čas



Půda

- **Neobnovitelný a nenahraditelný přírodní zdroj**
- Klíčová složka krajiny
- Základní článek potravního řetězce a cyklů prvků a látek v terestrických ekosystémech (počátek i konec).

Interakce s atmosférou a hydrosférou


- **Množství nenahraditelných funkcí v terestrických ekosystémech**

Základní funkce půdy

- **Ekologické**
 - **Produkční**
 - Filtrační, pufrovací, **retenční**
 - Hygienická
 - Prostředí pro rozvoj organismů (biodiverzita)
- **Ostatní**
 - Fyzické medium
 - Zdroj surovin
 - Kulturní dědictví

Fyzikální vlastnosti půdy


- při vývoji z regolitu se vytváří oddělené horizonty:



- O – organický horizont nad minerální půdou – humus
- O1 – zbytky rostlin a živočichů jsou rozeznatelné
- O2 – už nerozeznatelné
- A1 – minerální složka promíchána s humusem
- A2 – maximální vymývání křemičitých jílů
- A3 – přechod do spodního B horizontu
- E – eluviální horizont – minerální horizont blízko povrchu půdy, maximální vymývání/vyluhování
- B - iluviální horizont – místo depozice, maximální akumulace oxidů železa, hliníku a křemičitých jílů
- C horizont – není příliš ovlivněn biologickou aktivitou – možná akumulace Ca/MgCO_3
- Pod C je regolit a matečná hornina

Z čeho se skládá půda?

- **Pevná fáze**
- Minerální podíl – přes 90% pevné fáze půdy
 - písek
 - prach
 - jíl
- Organický podíl půdy – asi do 10% pevného podílu půdy (kromě organických půd)
 - organická hmota
 - živé půdní organismy
- **Kapalná fáze** – půdní voda, půdní roztok
- **Plynná fáze** – půdní vzduch



Půda - složení

- bez ohledu na horizonty půda obsahuje různé množství **jílových, prachových a písčitých částic**
- **textura půdy** – významná vlastnost pro ekologii mikroorganismů
- určuje povrchovou plochu - habitat pro růst mikrobů
- jílovité půdy mají mnohem větší povrchovou plochu než písčité půdy


Table 9.8

Comparison of size range, particle number, and surface area per gram of sand, silt, and clay. The calculations assume spherical particles with the maximum diameter within the size range.

Soil component	Diameter (mm)	No. of particles/g	Surface area (cm ² /g)
Sand	2.00–0.05	90	11
Silt	0.05–0.002	5.78×10^6	454
Clay	0.002	9.03×10^{10}	8,000,000


Textura půdy

- důležitá pro rostliny i mikroby
- půdy s dominancí jílových částic mají vysokou vodní kapacitu a kationtovou výměnnou kapacitu
- těžké půdy – tendence k zamoření a anoxickým podmínkám
- naopak u písčitých půd
- ovlivňováno obsahem SOM- soil organic matter (mikrobiální biomasa, opad, humus)







Jíl (Ton)
 $< 2 \mu\text{m } \emptyset$



Prach (Schluff)
 $2 - 63 \mu\text{m } \emptyset$



Písek (Sand)
 $63 - 2\,000 \mu\text{m } \emptyset$



Prach

Písek

určuje
půdní druhy

Jíl

- jílové minerály – produkt zvětrávání primárních minerálů
- koloidní vlastnosti
- velký povrch obsahující nabitě funkční skupiny umožňuje výměnu iontů
- umožňuje zadržování vody v půdě
- stmelování půdních částic, tvorba agregátů

Jílové částice

- důležitá je ale i povaha jílových částic – koloidy (1-1000 nm) se značně liší fyz-chem vlastnostmi
- toto rozhoduje kolik a jakých druhů mikrobu může okupovat daný půdní habitat

Table 9.9

Selected properties of major clay colloids

Property	Montmorillonite	Illite	Kaolinite
Size (μm)	0.01–1.0	0.1–2.0	0.1–5.0
Surface (m^2/g)	700–800	100–200	5–20
Cation exchange capacity ($\text{mEq}/100\text{g}$)	80–100	15–40	3–15



- vliv na půdní strukturu má také složení půdních koloidů
- půdní koloidy jsou tvořeny jílovými částicemi a humusovými látkami
- jílové minerály i humusové látky mají rozdílné schopnosti oddisociovat vodík



Quartz Particle

Clay Flakes

10 μm

This is kaolinite, a 1:1 non-expanding clay

http://lh5.ggpht.com/_6LWjP0sZ22w/S4stSjBMHI/AAAAAAAHfQ/1-WpzNFDdCE/s1600/Kao%20electron%20view%5B9%5D.jpg



Quartz Particle

Clay Flakes

10 μm

This is smectite (specifically montmorillonite), a 2:1 expanding clay

Složení půdy



Organický podíl půdy

Organická hmota

- především zbytky odumřelých rostlin a půdních organismů a produkty jejich aktivity v různé fázi rozkladu
- váže se na minerální částice v půdě
- zásobárna živin
- velký povrch a přítomnost funkčních skupin (-COO⁻, O⁻) umožňuje výměnu iontů
- permanentní rezervoár organického C a chemicky vázaných živin
- SOM – určována jako úbytek hmotnosti při žíhání

Organický podíl půdy

- spolu s jílem působí jako tmel, který pomáhá vytvářet půdní agregáty
- velikost a uspořádání agregátů vytváří strukturu půdy
- společně s jílem také organická hmota vytváří sorpční komplex
- sorpční komplex je systém, který vyměňuje ionty s půdním roztokem

Půdní organická hmota



je tvořena směsí odumřelých či shořených zbytků rostlin a živočichů v různém stádiu rozkladu, humusem vzniklým mikrobiálními a biosyntetickými procesy z meziproduktů rozkladu organických zbytků a dále živými i odumřelými buňkami půdních mikroorganismů a živočichů.



Význam živých organismů v půdě

- **Organická hmota** se významně podílí na tvorbě agregátů, udržování struktury půdy, zadržování vody a živin
- **Živé organismy organickou hmotu neustále transformují, rozkládají a doplňují**
- Proto mají biologické procesy transformace organické hmoty značný dopad na vlastnosti a funkce půdy

Organická hmota jako zdroj živin

- V půdě probíhá mineralizace a stabilizace organické hmoty
- Mineralizace a imobilizace živin
- Minerální živiny jsou využívány autotrofy
- Stabilní formy organické hmoty jsou zásobárnou živin, které se postupně uvolňují


Imobilizace versus mineralizace

- **Imobilizace** ... proces, kdy je část minerálních živin včleněna do organické hmoty, např. při růstu zelených rostlin, ale stejně tak i při příjmu živin mikroorganismy.
V biomase mikroorganismů může být v různých obdobích dočasně vázáno 5 až 15 % N, 1 až 3 % S, 2 až 5 % P z celkového množství v půdě.
- **Mineralizace** ... proces postupného rozkladu organických látek až na minerální látky **výchozí**. Nejrychleji je organická hmota mineralizována za maximálního přístupu vzduchu. **poměr C : N = 25 : 1**
- **(Humifikace)** ... neúplná mineralizace

-Role půdní bioty při dekompozičních procesech je zásadní.

BIOLOGICKÉ PŘEMĚNY ROSTLINNÉ HMOTY

- POSTUPNÝ ROZKLAD SLOŽITÝCH LÁTEK NA LÁTKY JEDNODUŠŠÍ
(ÚPLNÝ ROZKLAD = MINERALIZACE)
- HUMIFIKACE – RESYNTÉZA A POLYMERACE MEZIPRODUKTŮ ROZKLADU ZA VZNIKU HUMUSOVÝCH LÁTEK



POLOČAS ROZKLADU RŮZNÝCH TYPŮ ORGANICKÝCH LÁTEK V PŮDĚ

KOŘENOVÉ EXUDÁTY	2 - 3 DNY
KOŘENOVÉ VLÁŠENÍ	1 – 3 TÝDNY
POSKLIZŇOVÉ ZBYTKY	3 – 30 MĚSÍCŮ
ZELENÉ HNOJENÍ	1 – 4 MĚSÍCE
HUMUS	
FULVOKYSELINY	2 - 40 LET
HUMINOVÉ KYSELINY	200 LET

BIOLOGICKÉ

FUNKCE HUMUSU ORGANICKÉ HMOTY

- ZDROJ UHLÍKU, ENERGIE,
ŽIVIN A BIOLOGICKY AKTIVNÍCH
LÁTEK PRO PŮDNÍ ORGANISMY
(A ROSTLINY)

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ

- TMELÍCÍ ÚČINEK, VLIV NA
PUFROVITOST, pH, TEPLITU PŮDY,
SORBCE TOXICKÝCH SLOUČENIN

-Úbytek půdní organické hmoty vede k degradaci půdy.


-Za posledních šedesát let se v půdách mírného pásu v důsledku kultivace snížil obsah uhlíku v organických látkách o 20 až 40 %. Správná agrotechnika by měla tedy směřovat k tomu, aby se alespoň zachoval obsah organické hmoty, lépe však k tomu aby se zvyšoval její obsah.

POM

Particulate organic mater




MAOM


mineral associated OM



Energy, Openness


Nutrients, Persistence

	POM	MAOM	References
			
chemical constituents	celluloses, hemicelluloses, fungal-derived xylanase)	compounds of microbial (e.g., saccharides, muramic acid) and plant origin	(2016), Christensen (2016), Kögel-Knabner et al. (2016), Sanderman et al. (2014), Six et al. (2014)
			
	Plant / microbial		
	Lavallee, JM, Soong, JL, Cotrufo, MF. Conceptualizing soil organic matter into particulate and mineral-associated forms to address global change in the 21st century. <i>Glob Change Biol.</i> 2020; 26: 261– 273. https://doi.org/10.1111/gcb.14859		









Struktura půdy


- Uspořádání částic v půdě do agregátů různé velikosti a různého tvaru
- Struktura půdy ovlivňuje vzdušný a vodní režim půdy
- Optimální struktura umožňuje vsakování vody do půdy a výměnu plynů
- Struktura rozhoduje o pórovitosti půdy

Pórovitost půdy



- Póry kapilární – zadržují vodu
- Póry nekapilární – umožňují zasakování vody do půdy a výměnu plynů

Složení půdní atmosféry

- se velmi liší půda od půdy vzduch
- půdní atmosféra se nachází v pórech mezi půdními částicemi
- objemová hmotnost je měřítkem stěsnání půdních částic a určuje rozsah prostoru, který může být zaplněn půdním vzduchem
- někdy mohou být póry zaplněné vodou, která pak nahrazuje vzduch
- některé vrstvy půdy jsou aerobní, jiné anaerobní
- i v aerobních vrstvách jsou oblasti bez volného kyslíku




- obsah kyslíku v půdním vzduchu určuje do značné míry typ metabolismu, který zde může probíhat
- i chemických transformací, které může půdní mikroflóra provádět
- koncentrace CO_2 v půdním vzduchu jsou obecně o 1-2 řády vyšší než v přiléhajícím vzduchu
- koncentrace CO_2 a O_2 v půdním vzduchu jsou závislé na difúzi plynů a mikrobiální respiraci
- koncentrace CO_2 se zvyšuje a koncentrace O_2 snižuje s hloubkou půdního sloupce
- v půdách deficitních na kyslík se ve větší koncentraci vyskytují další plyny jako CH_4 (metanogeneze), H_2S (anaerobní redukce sulfátů)



Význam mikroorganismů v půdě




- Stěžejní v cyklech živin a energie
- Jsou na počátku potravních řetězců
- Rozklad organické hmoty (mineralizace)
- Uvolněné minerální živiny jsou využívány autotrofy – rostlinami
- Fixátoři vzdušného dusíku
- Syntéza nových sloučenin (imobilizace)
- Tvorba stabilních forem půdní organické hmoty
- Udržování půdní struktury
- Prospěšný vliv na vodní a vzdušný režim půdy
- Zvyšují rezistenci rostlin proti chorobám a škůdcům
- Degradace kontaminantů
- **Pozitivní vliv na půdní úrodnost - tedy pro růst rostlin**




Indikátory půdní kvality:

- Fyzikální
- Chemické
- Biologické

Terestrický ekosystém






**Společenstva půdních
biot a rostlinného kořene**



EDAFON
 SVĚŽÍ HMOTNOST 4-20 t.ha⁻¹
 SUŠINA 1-5 t.ha⁻¹
 100%





FYTOEDAFON
 75%

ZOOEDAFON
 25%

FYTOEDAFON 100%	
BAKTERIE	4%
AKTINOMYCETY	13%
MIKROMYCETY	79%
SINICE, ŘASY	4%

ZOOEDAFON 100%	
MIKROFAUNA 0,002-0,2 mm	12%
MEZOFAUNA 0,2-2,0 mm	12%
MAKROFAUNA 2-2,0 mm	13%
MEGAFAUNA NAD 20 mm	63%



vytváří chodbičky v půdě, jejichž souhrnná délka na jednom hektaru může činit až 4 000 km. Tím napomáhají lepšímu vsakování srážkové vody, ale také k většímu provzdušnění, což umožňuje lepší přístup vzduchu například k fixátorům vzdušného dusíku.



Určení jednotlivých druhů mikroorganismů je mnohem složitější než u rostlinných či živočišných druhů. Pojetí druhu nelze použít např. u bakterií, kde dochází k **rychlé výměně genů při tzv. horizontálním genetickém přenosu**, a při stanovování nepřímými metodami kultivace zjišťujeme, že většinu mikroorganismů v půdě tvoří tzv. **nekultivovatelné druhy (až 99 %)**, což ztěžuje identifikaci.


Při stanovení biologické diverzity se používají moderní metody (PCR atd.), které umožňují přibližné určení počtu vyskytujících se druhů. Při jednom stanovení při využití kinetiky asociace DNA **bylo nalezeno zhruba 4 000 mikrobiálních genomů v 1 g půdy, což by mohlo odpovídat přibližně 13 000 různých druhů.**

Distribuce edafonu v půdě


- Sledujeme-li **vertikální distribuci** v prostoru dle údajů různých autorů, najdeme bez ohledu na různé půdní druhy a typy nejvíce organismů ve vrstvě půdy zhruba **do 10 cm**, maximálně do 30 cm. Organismy, vyskytující se v této vrstvě představují zhruba 75 % až 90 % veškeré biomasy organismů v půdě, do hloubky 50 cm je to až 95 %. Avšak některé bakterie lze nalézt i ve velkých hloubkách (stovky metrů), jde především o sulfát-redukující a metanogenní archae či bakterie.
- Podobně nerovnoměrná je i **horizontální distribuce** mikroorganismů. Jiné množství mikroorganismů najdeme na půdních agregátech, jiné v půdním roztoku, **několikanásobně více půdních organismů najdeme v bezprostředním okolí kořenů v tzv. rhizosféře** než v ostatních partiích půdy. (Německý přírodovědec Lorenz Hiltner, ředitel Bavorského zemědělsko-botanického ústavu. 1904 - část půdy ovlivněná přítomností kořenového systému – rhizosféra.)

Hlubší vrstvy litoekosféry

- mikrobiálně nejaktivnějších je vrchních 15 cm půdy (ornice), pak klesá – nedostatek živin (není fotosyntéza a málo se vyluhuje)
- dříve se předpokládalo, že litoekosféra končí na matečné hornině
- v 80.letech minulého století se tento názor změnil
(v souvislosti v výzkumem těchto vrstev jako možného úložiště nebezpečných odpadů)




- výzkum náročný – vrtné soupravy je třeba modifikovat, aby se zabránilo
- mikrobiální kontaminaci kvůli anaerobům je třeba do vrtů aplikovat argon
- **vyvrtané vzorky** je třeba skladovat a zpracovávat za speciálních podmínek kvůli prevenci kontaminace a deteriorace
- mikrobi objeveni ve všech hloubkách, kde byla také voda a teplota ve vhodném rozsahu
- nejhlubší vzorky s mikroby byly získány z hloubek kolem 4km – termofilní
- fermentativní bakterie; nejčastěji šlo o anaerobní sulfát redukující a metanogenní archea



Mikrobi v aquiferní vodě

- artézské studně – voda vytéká pod tlakem, což umožní vypláchnutí vrtu před odběrem vzorku
- mnoho mikrobů získáno z vod více než 10.000 let starých
- není vyřešena otázka, na jakých zdrojích energie a živin zde přežívají – často zde až 10^6 - 10^8 /ml
- většinou heterotrofové – organický C se zde může vyskytovat - plynné a jiné rozpuštěné organické látky se sem mohou dostávat do aquiferů z fosilního plynu, ropy, nebo ložisek lignitu
- spodní voda reaguje s redukčními bazaltickými horninami za vzniku vodíku – ten podporoval metanogenní komunity

Btw... aquifer není tvořen volným prostorem naplněným vodou, ale horninou, která je propustná a pórovitá



Extrémní půdní habitaty

- Polární kruh. půdní teploty v polárních oblastech nízké
- tundra – po většinu roku pod bodem mrazu
- permafrost
- Arktické oblasti - dominantní lišejníky a jiné organizmy adaptované pomalému růstu
- často hlavní pokryv půd a zdroj potravy pro zvířata

- Antarktické oblasti – ještě extrémnější – chlad a sucho
- mnohé organismy jsou endolitické – rostou v horninách – zde částečně chráněny
- často se zde nacházejí kvasinky (vysoká koncentrace lipidů) a bakterie tvořící endospory
- bakterie s endosporami i v horkých pouštních oblastech



- *Picrophilus* rostou v suchých extrémně kyselých prostředích (pH pod 0,5), půdy v Japonsku zahříváné solfatarickými plyny (sopečný výron) nad 55°C
- acidofilní bakterie – *Thiobacillus thiooxidans* – chladnější ale kyselé habitaty
- pH pod 2,0

- alkalická jezera a půdy (NaCO_3) – pH nad 9,0 (někdy i vysoká koncentrace soli)
- archea: *Natronobacterium*, *Natronococcus* – pH 10 a výš
- salinní archea – *Halobacterium*, *Halococcus*, *Haloarcula*, *Haloferax* – slaná jezera a půdy s neutrální reakcí – vyžadují ale nejméně 1,5M NaCl
- **habitaty bez kyslíku, s nízkou koncentrací živin, vysokou koncentrací těžkých kovů nebo intenzivní radiací** – zde podmínky značně limitující – ale i zde přežívají některé mikrobiální populace




Co se děje ve rhizosféře

- Vzniká zde směs polysacharidů a glykoproteinů původem z **rhizodepozic** rostlin a produkovaných i rhizosférními mikroorganismy, kterému říkáme souhrnně **mucigel**, který je materiálním základem tvorby mikrobiálního biofilmu na povrchu kořenů. Tato mikrobiální konsorcia, vytvářející organizovaná společenstva s kolektivní funkcí tzv. **biofilmu**, v němž se rozvíjí složité vzájemné vazby a vztahy. Tyto společenstva naopak **zprostředkují kořenům rostlin příjem důležitých, často nedostatkových živin**. Mikroorganismy produkují i další pro rostliny aktivizující látky a stimulanty, jako jsou např. auxiny, gibbereliny, etylen, různá antibiotika atd.
- Dochází k produkci tzv. **informačních molekul**, pomocí kterých dochází k vzájemné komunikaci mezi rostlinou a mikroorganismy.
- V rhizosféře **dochází také vlivem působení rhizosférních mikroorganismů k inhibici růstu půdních patogenů napadajících rostliny** (např. *Fusarium*) a naopak ke stimulaci klíčení spor a růstu hyf hub, které jsou antagonisty patogenních organismů.


. **Povrch kořene** je nejzajímavějším a nejintenzivnějším místem rozhodujícím o tom jak bujná a druhově bohatá bude vegetace, ale také v jaké míře budou distribuovány asimiláty získané při fotosyntéze do nadzemní nebo podzemní části.


. **Produkcí rhizodepozic stimulují rostliny množení rhizosferních mikroorganismů a i jejich aktivitu vedoucí k větší produkci enzymů důležitých pro dekompozici a uvolňování stěžejních živin z půdy.** To znamená, že pro rostlinu není tak důležité „vyživovat“ kořeny pro jejich aktivitu a vlastní růst, ale „vykrmovat“ si rhizosférní mikroorganismy. Obecně se uvádí, že se takto do půdy dostává asi **20 až 50 %**, někdy až **60-80 % uhlíku fixovaného fotosyntézou.**

. Ukazuje se, že kořeny nejsou jen pasívním příjemcem živin nebo bezbrannou obětí patogenů, ale naopak hrají velice aktivní roli při vlastní ochraně a atrahování prospěšných příslušníků edafonu. Samy totiž mohou cíleně řídit aktivity půdních mikroorganismů stimulací kořenovými exsudáty.











Prvok - predátor mikrobů - omezuje jejich počet a produkuje exkrementy důležité pro výživu rostlin

-  Hlenovité látky mikrobiálních biofilmů
-  Přisedlé mikroorganismy spolupracující s rostlinou
-  Mikroorganismy závislé na produktech jiných mikrobů
-  Rozkladné enzymy produkované mikroorganismy
-  Minerální a organické formy živin pro výživu mikrobů




Obr. J. Záhora


Interakce půdních MO a rostlin ve rhizosféře



Plant community composition



Litter and root trait diversity






Minerální dusík v půdě


Je přítomen

Chybí




*Biodiversity, litter and exudates inputs, root strategy, ... →
→ food web diversity, drought and pathogen resistance*

Zásadní význam mikroorganismů na vznik půdních agregátů a pórů



Stmelením **adheziny** bakterií a hyfami hub se minerální částičky zvětralé matečné horniny a půdní organická hmota pospojují v **půdní agregáty**. Mezi agregačními bakteriemi dominují *Pseudomonas* sp. a *Bacillus* sp.

srážková voda




póry



agregáty

Dobře se vsakuje srážková voda. Dochází k naplňování jedné z důležitých funkcí půdy – retenční!

Voda stéká po povrchu - vodní eroze



Při nedostatečném množství organické hmoty a mikroorganismů se **agregáty rozpadají**, póry mizí, **půda slehává**. Srážková voda se nezasakuje!




Společenstva půdních biot a rostlinného kořene

Úbytek půdní organické hmoty vede k **degradaci půdy**.

Za posledních padesát let se v půdách mírného pásu v důsledku kultivace snížil obsah uhlíku v organických látkách o 20 až 40 %. Správná agrotechnika by měla tedy směřovat k tomu, aby se alespoň zachoval obsah organické hmoty, lépe však k tomu aby se zvyšoval její obsah.

Agregáty jsou důležité pro zlepšení kvality a zdraví půdy, pórovitosti, zábraně eroze a agronomické produktivity zlepšením klíčení semen a růstu kořenů. Mezi agregačními bakteriemi dominují *Pseudomonas* sp. a *Bacillus* sp.



Jemná vlákna hyf půdních hub dokážou udržet pohromadě i tak syký materiál jako je agropelit

„Zemědělci si zvykli hospodařit v krajině v podstatě společensky nebezpečným způsobem.“ (Petr Havel, agrární analytik a novinář, 10.07.2009)

V posledních desetiletích se na Zemi velmi zvýšila intenzita procesů degradace zemědělské půdy. To má zásadní vliv na další oblasti společného zájmu, jako je ochrana vody, lidského zdraví, změna klimatu, ochrana přírody a biologické rozmanitosti a také bezpečnost potravin.

Proces degradace zemědělské půdy probíhá i v České republice. Na **jednoho obyvatele ČR připadá v průměru 0,41 ha zemědělské půdy** (z toho 0,29 ha orné půdy). Od roku 1927 jsme ztratili jednu pětinu veškeré zemědělské půdy a přitom **polovina ze zbývajících půdy je ohrožena erozí, kontaminací či jiným způsobem.**

Vodní eroze ohrožuje více než polovinu ploch zemědělské půdy. Podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy se odhaduje, že je poškozeno kolem 1,4 mil. ha, z toho je přibližně 450 tis. ha poškozeno výrazně. Různým stupněm větrné eroze je v Čechách ohroženo potenciálně 23 %, na Moravě a ve Slezsku 41 % orné půdy.

Zhutněním je ohroženo kolem 30–50 % všech zemědělských půd. Ve zranitelných oblastech se nachází 44 % z celkové výměry zemědělské půdy v ČR (49 % z orné půdy).

Velká část půd v ČR náleží do kategorie půd s velmi nízkou a nízkou retenční vodní kapacitou (dle: Situační a výhledová zpráva MZe, Národní strategický plán rozvoje venkova ČR za období 2007–2013).

Když se podíváte na pole, zejména na svažité plochy, najednou uvidíte, že černoze jsou bílé. Je to dáno tím, že v důsledku několik desetiletí trvající eroze byl onen černozemní půdní horizont, který bývá mocný 40-70 centimetrů, odplaven, odnesen a na povrch se dostává matečný substrát. U černoze to jsou především spraše, a ty mají žlutavou až bělavou barvu. V takovém případě už se nehospodaří na půdě, ale vlastně na půdotvorném substrátu, který leží pod půdou.

Oněch 40-70 centimetrů půdy tedy ubylo za posledních přibližně 60.

Zdeněk Vašků: Půda je nenahraditelná

25.4.2008 17:20 | PRAHA (Ekolist.cz)

Tento pohled platí i dnes a ještě se prohlubuje

K čemu vede klasické – konvenční hospodaření

První kapky přívalových dešťů na orné půdě rozbijí veškerou povrchovou půdní strukturu, v důsledku čehož dochází k zatemování všech hydrologicky významných makropórů, kterými voda proniká do půdy. **To vede až k vytvoření nepropustné povrchové vrstvy, po níž následně všechny srážky odtečou.**

U půd přírodě blízkých stanovišť existuje nejenom horizont nadložního humusu, ale žijí v nich i různé rostliny s hlubokými kořenovými systémy a bohatá společenstva půdních organismů, což všechno napomáhá mimořádně intenzivnímu přijímání vody půdou.

Během měření na jižní Moravě jsme třeba zjistili, že některé chodbičky žížal na spraších mají až 1,5 cm v průměru a vedou až do šestimetrové hloubky - to už jsou miniaturní vodní potrubí! Když jsem pak porovnával intenzity přívalových srážek se schopností přijímat vodu na těchto přírodě blízkých stanovištích, došel jsem k závěru, že v ČR neexistuje přívalová srážka takové intenzity, že by na dřevinno-bylinných pásmech vyvolala povrchový odtok. Nejenomže to vždy dokážou zachytit a vsáknout, ale ještě jsou schopné do značné vzdálenosti přerušit povrchový odtok z okolních pozemků.

Riziko sekundárního znečištění vlivem používání agrochemikálií a atmosférického znečištění.

Interakce patogenů a mikrobiomů v půdě jsou citlivé na půdní kontaminanty, které mohou blokovat aktivity jedinečných skupin mikrobiálních komunit.

- Poukazuje se na problematiku používání chemických hnojiv v zemědělství (**53 mld tun NPK hnojiv za 1 rok**). Problém závislosti na chemických hnojivech - toxické pro lidské zdraví, vysoké výrobní náklady.

- Nabízí se řešení v podobě „**biohnojiv**“ na bázi prospěšných půdních mikroorganismů.

- **Nové objevy vlivu půdních mikroorganismů na faktory jako je výnos, rezistence vůči patogenům a reakce na biotické a abiotické stresy u rostlin poukazují na důležitou roli mikroorganismů jako součásti udržitelného zemědělství.**
- **Může jít např. o mikroorganismy fixující dusík, solubilizující síru, mykorhizní houby, mikroby solubilizující draslík atd.**
- Vliv **biohnojiv** na výnos, fotosyntézu a půdní živiny
- *Rhizobium leguminosarum*, *Rhizobium* spp. a *Bradyrhizobium* spp. zvyšují produkci rostlinné biomasy, výnos a obsah chlorofylu.
- *Rhizobium* spp. zvyšují plochu povrchu kořenů, rychlost fotosyntézy, kapacitu příjmu vody, výnos a průduchovou vodivost inokulovaných rostlin.
- Bakterie *Pseudomonas*, *Bacillus lentus* a *Azospirillum brasiliense* zvyšují obsah chlorofylu v rostlinách a expresi antioxidantních enzymů za stresu.
- Aplikace biohnojiv u špenátu – zvyšuje růst, obsah chlorofylu, antioxidantní aktivitu, výnos a fenolické sloučeniny (fenolické sloučeniny až o 58 % vyšší než u neočkovaného špenátu).
- Sója – zvýšení výnosu o 80 % při naočkování *Rhizobium* a *Bradyrhizobium*.
- Kukuřice – vyšší výnos při aplikaci *Actinomyces* spp.
- <https://www.mdpi.com/2077-0472/11/2/163/html>
- <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS.000621967300001>

PŮDNÍ MIKROORGANISMY PRODUCENTI BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK

FYTOHORMONY

AUXINY (IAA)

**RHIZOBIUM, PSEUDOMONAS
FUSARIUM**

GIBERELLINY

**AZOTOBACTER, BACILLUS
ACTINOMYCES**

CYTOKONINY

ASPERGILLUS, FUSARIUM

ETHYLEN

AZOTOBACTER, AGROBACTERIUM

MUCOR, ASPERGILLUS

PSEUDOMONAS

ANTIBIOTIKA

CEPHALOSPORIN

CEPHALOSPORIUM

CHLORAMPHENICOL

STREPTOMYCES

STREPTOMYCIN

NEOMYCIN

PENICILIN

PENICILLIUM

FYTOTOXINY

BAKTOTOXINY

8-26% PŮD. BAKTERIÍ

MYKOTOXINY

➤ AFLATOXINY

ASPERGILLUS

PENICILLIUM

PŮDNÍ MIKROORGANISMY- PRODUCENTI BIOPESTICIDŮ

MO

➤ BAKTERIE

➤ AKTINOMYCETY

➤ PLÍSNĚ



Pythium oligandrum

ÚČINNÝ METABOLIT

BIOHERBICIDY(FYTOTOXINY)

BIOHERBICIDY

➤ STREPTOMYCES
HYGROSCOPICUS
(BIALAPHOS)

➤ STENOTROPHOMONAS
MALTOPHILIA

MYKOHERBICIDY

➤ GLIOCLADIUM VIRENS

BIOFUNGICIDY

➤ PYTHIUM OLIGANDRUM
PARAZIT P.ULTIMUM
→

➤ TRICHODERMA HARZIANUM
PARAZIT RHIZOCTONIA
→ SOLANI

Conclusion

Bakterie podporující růst rostlin (PGPB) jako možné řešení problémů
**Zlepšují úrodnost půdy a produktivitu plodin, aniž by zatěžovaly
životní prostředí**

Zvyšují dostupnost důležitých makroživin

Pomáhají snížit obsah těžkých kovů v kontaminovaných půdách
(několikafázové přes rostlinné hyperakumulátory)

Produkují kyselinu indolactovou (IAA), která reguluje buněčné dělení a
diferenciaci buněk

Zpřístupňují rostlinám fosfor rozpouštěním fosfátů

Spouštějí obranné mechanismy rostlin a tím zlepšují obranu rostlin vůči
patogenům a škůdcům

Vliv globální klimatické změny

Půdní mikrobiom řídí biogeochemický koloběh živin a dalších prvků důležitých pro růst rostlin a živočichů

Půdní mikroorganismy mají klíčovou roli především v koloběhu půdního organického uhlíku (a dusíku), vliv na klima (spotřeba x produkce skleníkových plynů)

Reakce půdních MO na očekávané změny klimatu (vyšší koncentrace oxidu uhličitého, vyšší teplota, častější sucha, záplavy a požáry)

Vyšší teplota → větší mineralizace → uvolňování uhlíku z půdy do atmosféry

V půdě je uloženo přibližně 5x více uhlíku než je v současnosti v atmosféře

Rostoucí teplota: _

Teplota určuje rychlost růstu čistých kultur MO

Oteplení lesní půdy o 5°C vedlo nejprve k rychlé ztrátě uhlíku způsobené respirací, poté došlo ke změně mikrobiální komunity směrem k rozmanitější, která měla větší respiraci na ohřátých pozemcích oproti kontrole na pozemcích s původní teplotou.

Odhad ztráty uhlíku z půdy do konce století: 710 g na čtvereční metr (odpovídá emisím z fosilních paliv za poslední 2 desetiletí)

Změna ve složení komunity – více bakterií, méně hub

Tání permafrostu

Zvýšení mikrobiální aktivity, produkce skleníkových plynů

Zvýšené srážky

Zaplnění půdních pórů vodou → anaerobní podmínky → podmínky pro metanogenezi a denitrifikaci

Naopak sucho:

Rostoucí sucho povede ke snížení mikrobiálních funkcí důležitých pro udržitelný ekosystém.

Více jak 40 % suchých oblastí je pokryto biologickými půdními krustami (biokrustami), které fixují uhlík a dusík. Biokrusty také stabilizují povrch půdy.

Bakterie jsou citlivější na sucho než houby (houby mohou pomocí hyf získávat vodu ze vzdálenějších míst).

Snížení rozkladu půdní organické hmoty


Požáry

Snížení zásoby půdního organického uhlíku a dusíku, zničení půdních agregátů.

Pokles mikrobiální biomasy v důsledku vyčerpání zdrojů podporujících mikrobiální růst.

Přímá úmrtí MO způsobená denaturací proteinů či lýze buněk.

Vliv globální klimatické změny





Antibiotics in the Soil Environment – Degradation and Their Impact on Microbial Activity and Diversity

Mariusz Cycoń^{1*}, Agnieszka Mroził² and Zofia Piotrowska-Seget³

¹ Department of Microbiology and Virology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine, Medical University of Silesia, Sosnowiec, Poland, ² Department of Biochemistry, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice, Poland, ³ Department of Microbiology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia, Katowice, Poland

European Journal of **Soil Science**

European Journal of Soil Science, January 2018, **69**, 181–195


doi: 10.1111/ejss.12494

Special issue article

Antibiotics and antibiotic resistance from animal manures to soil: a review

W.-Y. XIE, Q. SHEN & F. J. ZHAO

Jiangsu Key Laboratory for Organic Waste Utilization, Jiangsu Collaborative Innovation Center for Solid Organic Waste Resource Utilization, College of Resources and Environmental Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China






Zdroje a osud antibiotik v půdním prostředí

Nadužívání veterinárních antibiotik v živočišné výrobě a následná aplikace hnoje do půdy přispívá ke zvýšené antibiotické rezistenci v půdním prostředí.


Přibližně 58 % spotřebovaných veterinárních antibiotik je vylučováno do životního prostředí, více než polovina z nich končí v půdě.

Riziko zpětné infekce lidí a zvířat





The data were re-analysed from the work by Xie *et al.* (2016).
 Hojnost genu antibiotické rezistence (ARG) v hnoji a komposty na bázi hnoje. CM, dobytčí hnůj; PM, drůbeží trus; CC a PC, termofilní kompostový produkt z hnoje dobytka a drůbežního hnoje;



Potenciální účinky antibiotik na půdní mikrobiální společenstva a jejich možné reakce.



Půdní mikrobiální komunity

- vhodný habitat pro mikroby – kolonie na půdních částicích
- zde **více než ve vodních ekosystémech** – běžně 10^6 - 10^9
- viry, bakterie, houby, řasy, protozoa
- všeobecně dostatek organické hmoty – **heterotrofové**
- v horním horizontu bohatém na organické zbytky – autochtonní mikroflóra toleruje a roste za vysokých koncentrací organických látek
- vysoká růstová rychlost a aktivita na jednoduchých lehce využitelných substrátech – rostlinné a živočišné zbytky a exkrementy – tyto charakterizovány přerušovanou aktivitou s neaktivními odpočinkovými stádii – *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Aspergillus*, *Mucor*



- **autochtonní** mikroflóra - která je schopná využívat i odolné huminové látky
- pomalá, ale konstantní aktivita – většinou G- tyčinky a aktinobakterie
- ryze **allochtonní** – např. humánní a zvířecí patogeni – nenachází v půdě dobré růstové podmínky
- je těžké popsat rysy adaptace na půdní podmínky v půdě mnoho mikrohabitátů a na jednom místě může být více environmentálních situací, které zvýhodňují různé populace



Actinobacteria

<https://www.scottchimileskiphotography.com>

Allochtonní organismy

- do půdy z různých zdrojů ze vzduchu, hydrosféry
- nebo s rostlinnými a živočišnými zbytky
- ***Agrobacterium***, ***Corynebacterium***, ***Erwinia***, ***Pseudomonas***, ***Xanthomonas*** – s infekčním rostlinným materiálem
- s trusem zvířat nebo s odpadní vodou
- za normálních podmínek allochtonní organismy rychle eliminovány, ale někdy mohou přežít delší dobu (endospóry)



- půda - mnoho mikrohabitátů
- bakterie mohou být obligátní aerobové, fakultativní anaerobové, mikroaerofilové, obligátní anaerobové
- jednotlivé půdy mohou zvýhodňovat bakteriální populace s určitými metabolickými schopnostmi
(zaplavené půdy– fakultativní a obligátní anaerobové)
- podmínky v některých půdách značně omezují výběr mikrobiálních populací, které zde mohou růst
- extrémy v pH, polární půdy, pouštní půdy
- v půdě se nachází více G+ bakterií než v akvatických habitatech




Table 9.11

The average number in viable counts of major groups of microorganisms in different soil types of the USSR

Zone	Soils	Total number of microorganisms ($\times 10^6/g$)	Non-spore-forming bacteria (%)	Bacilli (%)	Actinomycetes (%)	Fungi (%)
Tundra and taiga	Tundra-gley and gley-podzolic	2.1	94.9	0.7	1.5	2.9
Forest meadow	Podzols and soddy-podzolic	1.1	77.2	12.0	8.1	2.7
Meadow steppe	Chenozems	3.6	42.4	21.4	35.4	0.8
Dry steppe	Chestnut	3.5	45.4	19.4	34.6	0.6
Desert steppe and desert	Brown and sierozems	4.5	45.7	17.7	36.1	0.5

Source: Mishustin 1975.





Běžné bakteriální rody v půdě:

- *Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Brevibacterium,*

O členech rodu *Bacillus* je známo, že mají řadu prospěšných vlastností, které pomáhají rostlinám přímo nebo nepřímo prostřednictvím získávání živin, celkového zlepšení růstu produkcí fytohormonů, ochrany před patogeny a dalšími abiotickými stresory.

- Tento funkčně všestranný rod je jednou z nejvíce komerčně využívaných bakterií v agrobiotechnologickém průmyslu.
- **rhizobakterie** podporující růst rostlin (PGPR) - volně žijící prospěšné bakterie, které prospívají kulturním rostlinám
- rody *Azospirillum, Pseudomonas, Azotobacter, Klebsiella, Enterobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Burkholderia, Bacillus* a další
- *B. megaterium, B. circulans, B. coagulans, B. subtilis, B. azotofixans, B. macerans, B. velezensis*
- *B. cereus, B. circulans, B. firmus, B. pumilus, B. licheniformis, B. megaterium, B. subterraneus, B. aquimaris, B. vietnamensis* a *B. aerophilus* jsou schopny vázat atmosférický dusík

Caulobacter, Cellulomonas, Clostridium, Corynebacterium, Flavobacterium,

- *Micrococcus, Mycobacterium, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, Xanthomonas*

- velké rozdíly v zastoupení jednotlivých rodů v jednotlivých půdách

velké rozdíly v zastoupení jednotlivých rodů v jednotlivých půdách

Table 9.12

Relative proportions of aerobic, facultatively anaerobic bacterial genera commonly found in soils

Genus	Percentage
<i>Arthrobacter</i>	5–60
<i>Bacillus</i>	7–67
<i>Pseudomonas</i>	3–15
<i>Agrobacterium</i>	1–20
<i>Alcaligenes</i>	1–20
<i>Flavobacterium</i>	1–20
<i>Corynebacterium</i>	2–12
<i>Micrococcus</i>	2–10
<i>Staphylococcus</i>	<5
<i>Xanthomonas</i>	<5
<i>Mycobacterium</i>	<5

Source: Alexander 1977.






Aktinobakterie



- mohou tvořit 10-33% všech bakterií v půdě - nejčastější rody jsou *Streptomyces* a *Nocardia*; *Micromonospora* a *Actinomyces* jsou také původní půdní bakterie, ale mají nižší zastoupení
- jsou relativně odolné vysychání, přežijí i období sucha v pouštních půdách
- mají raději alkalickou nebo neutrální reakci, citlivé na kyselé pH

Myxobakterie



- hlavně v půdách - najdeme je na organické hmotě v lesních půdách: *Myxococcus*, *Chondrococcus*, *Archangium*, *Polyangium*



- *Azotobacter* – fixace N₂, ale i *Clostridium*
- význam rhizobií a bradyrhizobií




- v půdě i mnoho rodů řas – na povrchu i v půdě samé: *Chlorophycophyta*, *Rhodophycophyta*, *Euglenophycophyta*, *Chrysophycophyta*
- většina se nachází na povrchu nebo v několika povrchových milimetrech půdy
- zde až $10^6/g$; většinou jsou malé a jednobuněčné



Důležité fotoautotrofní bakterie – sinice





- *Anabaena, Calothrix, Chroococcus, Cyndrospermum, Lyngbya, Microcoleus, Nodularia, Nostoc, Oscillatoria, Phormidium, Plectonema, Schizothrix, Scytonema, Tolypothrix*
- některé (*Nostoc*) poskytují fixovaný N i organický C
- sinice tvoří krustu na půdách bez vegetace a tak ji stabilizují





Houby

- tvoří významnou část půdní mikroflóry – většinu typů hub je možné najít v půdě
- buď zde jako volně žijící, nebo součást mykorhizy
- nejvíce v horních 10 cm půdy, méně pod 30 cm
- nejvíce v dobře provzdušněných kyselých půdách

- nejčastěji houby nedokonalé: *Aspergillus*, *Geotrichum*, *Penicillium*, *Trichoderma*,
- ale i četné askomycety a bazidiomycety
- často obtížná izolace a identifikace (zvl. u mykorhízy)
- **kvasinky** časté v půdě (většinou Deuteromycota): nejčastěji *Candida*, *Rhodotorula*, *Cryptococcus*





- některé druhy izolované jen z půdy: *Lipomyces*, *Schwanniomyces*, *Kluyveromyces*, *Schizoblastosporion*, *Hansenula*, *Cryptococcus*
- většina hub v půdě je oportunistických (zymogenních) – rostou za příznivých podmínek – adekvátní vlhkost, aerace a relativně vysoká koncentrace využitelného substrátu
- mnoho hub metabolizuje C-H (včetně polysacharidů), ale jen málo je schopno degradovat lignin
- typická je dormance; některé houby dormantní i desítky let – a stále „viable“ – často ve formě dormantních struktur; i mycélium může být v půdě metabolicky inaktivní



Protozoa

- významní predátoři sinic, řas a bakterií v půdě
- malé velikostí a i malá diverzita ve srovnání s podmínkami ve vodě
- aby bylo prohlášeno za půdní, musí se zde najít ve vegetativním stádiu (nestačí cysty)
- bičíkatá protozoa dominují půdní habitaty
- všeobecně je zde 10^4 - 10^6 /g půdy, nejvíce ve svrchních 15 cm; vyžadují dost O_2





Prvok - predátor mikrobů - omezuje jejich počet a produkuje exkrementy důležité pro výživu rostlin

-  Hlenovité látky mikrobiálních biofilmů
-  Přisedlé mikroorganismy spolupracující s rostlinou
-  Mikroorganismy závislé na produktech jiných mikrobů
-  Rozkladné enzymy produkované mikroorganismy
-  Minerální a organické formy živin pro výživu mikrobů

5 skupin konzumentů půdních mikroorganismů:

Prvoci


Viry

Volně žijící půdní hlístice

Půdní mikroartropodi

Saprofágní půdní živočichové

První 4 skupiny jsou přímými predátory, zatímco saprofágní půdní živočichové, jako jsou žížaly a stejnonožci, přijímají bakterie a houby současně s půdní organ. hmotou.




Shrnutí

Půdní mikrobiom reguluje důležité funkce ekosystému od primární produkce až po sekvestraci uhlíku v půdě. Struktura a funkce půdního mikrobiomu je závislá na účincích interakcí mezi symbiózou, predací, rostlinnými vstupy a abiotickými proměnnými v půdě.

A na závěr

V práci „ Soil microbiomes and one health“ autorů Banerjee a van der Heijden z roku 2022 je uvedeno, že **lidské zdraví není izolované, ale souvisí se zdravím zvířat, rostlin a prostředí (půdy)**. Autoři poukazují, že půdy jsou základním kamenem jednoho zdraví a slouží jako zdroj a rezervoár jak patogenů, tak i prospěšných mikroorganismů a celkové mikrobiální diverzity v široké škále organismů a ekosystémů. Je uvedeno více než 40 funkcí půdního mikrobiomu, které přímo nebo nepřímo přispívají ke zdraví půdy, rostlin, zvířat a nakonec i lidí.



Jsou zde popsány mikroorganismy, které jsou sdíleny mezi různými složkami zdraví, a ukazujeme, že půdní, rostlinné a lidské mikrobiomy jsou možná propojenější, než se dříve myslelo. Jsou hodnoceny příspěvky půdních mikroorganismů ke zdraví ve světle dysbiózy a globálních změn a ukazuje, že **mikrobiální rozmanitost je obecně pozitivně spojena s jedním zdravím.**


DĚKUJI ZA POZORNOST



Explanation of plate X

1. **Tangle ranker** below germinating *Sarothamnus purgans* on gneiss (Maliciosa, 2000 m., Sierra de Guadarrama, Spain).
2. **Podsol ranker** below *Calluna* heath on quartzite (Cordillera Cantábrica, Asturias, Spain, of 1700 m.).

From W. L. KUBIENA - THE SOILS OF EUROPE
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institute of Soils, Madrid.



Explanation of plate XVI

1. **Typical terra fusca** (limestone brown loam) below beech forest on limestone (Southern Wienerwald).
2. **Siallitic terra rossa** (limestone-red loam) below xerophytic top flora in the picture *Ptilotrichum spinosum* and *Festuca Hystrix* on limestone. Summer aspect (Prov. Valencia, Spain).

From W. L. KUBIENA - THE SOILS OF EUROPE
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas Institute of Soils, Madrid.